UNIV. OF
TORONTO
LIBRARY

Digitized by the Internet Archive
in 2026 with funding from
University of Toronto

https://archive.org/details/joachimbursersho00juel

Bot
J

SYMBOLAE BOTANICAE UPSALIENSES II: 1
ARBETEN FRÅN BOTANISKA INSTITUTIONEN I UPPSALA
UTGIVNA AV PROF. N. SVEDELIUS OCH PROF. E. MELIN

JOACHIM BURSER'S HORTUS SICCUS

MIT ERKLÄRUNGEN HERAUSGEGEBEN

VON

H. O. JUEL

NACH DEM TODE DES VERFASSERS HERAUSGEGEBEN

VON

N. SVEDELIUS

MIT 4 TAFELN

391910
19.4.41

UPPSALA
A.-B. LUNDEQUISTSKA BOKHANDELN
(I DISTRIBUTION)

HERAUSGEGEBEN MIT UNTERSTÜTZUNG DES
»LÄNGMANSKA KULTURFONDEN» UND DES
»CLAES OCH HILDA ANNERSTEDTS FOND»

UPPSALA 1936
ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI-A.-B.
36334

Unter den in Schweden bis auf unsere Tage erhaltenen älteren Herbarien dürfte das am Botanischen Museum zu Uppsala aufbewahrte, von JOACHIM BURSER am Anfang des 17. Jahrhunderts eingesammelte Herbarium, sein »Hortus siccus», unzweifelhaft den ersten Rang einnehmen. Die Schicksale dieses Herbariums und seine wissenschaftliche Bedeutung sind schon wiederholt von mehreren Verfassern in verschiedenem Zusammenhang mehr oder weniger ausführlich gewürdigt worden. Zusammenfassend lässt sich von diesem Herbarium aussagen,

dass es eine der grössten und besten bis auf unsere Tage erhaltenen Pflanzensammlungen aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts darstellt,

dass diese Sammlung nach der besten botanischen Arbeit ihrer Zeit, nämlich nach BAUHIN's »Pinax» geordnet worden war und

dass die führenden schwedischen Botaniker dreier Jahrhunderte, OLOF RUDBECK Vater und Sohn, LINNÉ und ELIAS FRIES, bei ihren Forschungen dieses Herbarium angewandt haben.

Beim fünften skandinavischen Naturforscherkongress in Kopenhagen im Jahre 1847 hielt ELIAS FRIES einen Vortrag über BURSER's Herbarium und führte dabei als besonderen Vorzug — ausser den schon oben genannten — die Genauigkeit der Fundortsaufzeichnungen an, derzufolge man dem Herbarium wertvolle pflanzengeographische Aufschlüsse entnehmen kann, während ältere Pflanzensammlungen sonst in der Regel nur sehr dürftige oder überhaupt keine Angaben über die Fundorte enthalten. Die Exemplare im Herbarium waren auch verhältnismässig vollständig und bestanden nicht nur, wie es sonst in den ältesten Herbarium der Fall zu sein pflegt, aus einzelnen Stücken und Fragmenten. Schliesslich betonte ELIAS FRIES noch den bedeutungsvollen Umstand, dass dieses Herbarium die Quelle unseres Wissens über zahlreiche von LINNÉ aufgestellte Arten bildet, die LINNÉ nicht in seinem eigenen Herbarium besass sondern nur nach BURSER's Herbarium beschrieben hatte.

Die Bedeutung von BURSER's Herbarium für die Kenntnis der Linné'ischen Originalexemplare wurde kürzlich von S. SAVAGE, Bibliothekar bei der Linnean Society of London, wieder nachdrücklich betont.[1] SAVAGE hat in der Bibliothek der genannten Gesellschaft das Manuskript von LINNÉ's Bestimmungen in BURSER's Herbarium aufgefunden, etwa 35 eng beschriebene Folioseiten in Tabellenform, welche an erster Stelle die Nummer in BURSER's Herbarium, an zweiter LINNÉ's eigene Bestimmung, an dritter den Namen in »Pinax» und schliesslich an vierter Stelle die Fundorte der Pflanzen enthalten. Die Veröffentlichung und Bearbeitung dieses Manuskripts wird natürlich weitere Klarheit über die Linné'ischen Originalexemplare in BURSER's Herbarium schenken können.

Schliesslich kann noch angeführt werden, dass der Wert von BURSER's Herbarium nicht zuletzt auch darin zu suchen ist, dass BURSER auch die einheimischen deutschen Pflanzennamen angegeben hat. Das Herbarium bildet dadurch auch eine wichtige

[1] S. SAVAGE, Studies in Linnean Synonymy. 1. CASPAR BAUHINS »Pinax» and BURSERS herbarium. — Proceedings of the Linnean Soc. of London, 23 Dec. 1935.

Quelle für die Sprachforschung, die sich mit den einheimischen Pflanzennamen und deren Etymologie befasst.

Professor O. JUEL interessierte sich insbesondere während der letzten Jahre seines Lehramtes in Uppsala auch für die Geschichte der Botanik und teilte in mehreren Veröffentlichungen die Ergebnisse seiner Forschungen in den älteren Sammlungen des Museums von Uppsala u. a. mit. Eine grössere Arbeit aus seiner Feder über BURSER's Herbarium ist in den »Acta» der Königl. Sozietät der Wissenschaften unter dem Titel »Studien in Burser's Hortus siccus» erschienen (Nova Acta Reg. Societatis Scientiarum Upsaliensis Ser. IV. Vol. 5, N:o 7, Uppsala 1923). Er gab dort eine Übersicht und Bestimmungen ausschliesslich von solchen Pflanzen in BURSER's Herbarium, die irgendwie in der botanischen Litteratur erwähnt worden waren, sowie auch solchen, über die LINNÉ im Herbarium Bemerkungen gemacht hatte oder von denen man damals annehmen konnte, dass sie von LINNÉ bestimmt worden waren. Während seiner letzten Lehramtsjahre in Uppsala nahm Professor JUEL die Studien über das Bursersche Herbarium wieder auf mit der Absicht, sämtliche im Herbarium enthaltenen Arten zu bestimmen und mit moderner Nomenklatur zu verzeichnen, eine umfassende und zeitraubende Aufgabe, die er während seiner Amtsjahre in Uppsala nicht beenden konnte. Nach seinem im Jahre 1928 erfolgten Übertritt in den Ruhestand wohnte Professor JUEL in Djursholm bei Stockholm und setzte seine Arbeit mit dem Burserschen Herbarium an der Botanischen Abteilung des Naturhistorischen Reichsmuseums fort, wohin ihm das Herbarium bandweise von Uppsala übersandt wurde. Die Arbeit scheint schon im Frühling 1931 als druckfertige Reinschrift vorgelegen zu haben. Es blieb jedoch dem Verfasser nicht vergönnt seine vieljährige und umfassende Arbeit im Drucke zu sehen; schon am 3. Juli 1931 endete seine Lebensbahn unvermutet nach kurzer Krankheit.

Am 1. März 1935 übergab Frau INGRID JUEL das Manuskript ihres verstorbenen Mannes als Geschenk an das Botanische Institut der Universität Uppsala. In einem gleichzeitigen Brief an mich als dem Vorstand dieses Instituts richtete Frau JUEL die Bitte an mich, die Arbeit nötigenfalls abzuschliessen und ihre Veröffentlichung im Interesse der Wissenschaft und des Instituts zu ermöglichen. Für den Fall, dass eine baldige Herausgabe der Arbeit nicht möglich sein sollte, erhielt ich die Ermächtigung, das Manuskript an einem wissenschaftlichen Institut in Uppsala zu hinterlegen und dadurch der zukünftigen Forschung zugänglich zu machen.

Mit Rücksicht auf den Umstand, dass diese Arbeit eines der wertvollsten Herbarien des hiesigen Instituts behandelt, schien es am richtigsten, sie in unserer neugegründeten Schriftenreihe »Symbolae Botanicae Upsalienses» zu veröffentlichen. Da jedoch die dieser Schriftenreihe zur Verfügung stehenden Geldmittel noch äusserst spärlich fliessen, war es notwendig, auch um weitere Beiträge von anderer Seite anzusuchen. Ich habe die angenehme Pflicht, dem Vorstande des LÄNGMAN'schen Kulturfondes meinen verbindlichsten Dank auszudrücken für den freikostigen Anschlag, der zur Bestreitung der Druckkosten bewilligt wurde und die unmittelbare Herausgabe der Schrift ermöglichte. Auch der Königl. Sozietät der Wissenschaften zu Uppsala spreche ich meinen verbindlichsten Dank aus für den bewilligten Beitrag aus dem »CLAES och HILDA ANNERSTEDT's fond».

Die Drucklegung der Arbeit erfolgte nach dem von JUEL hinterlassenen deutschsprachigen Manuskripte. Einige kurze Partien im Texte, die im Manuskripte versehentlich in schwedischer Sprache stehen geblieben waren, habe ich übersetzt. Auch der die Arbeit abschliessende Index, der alle behandelten Pflanzen umfasst, stammt von JUEL. Da dieser Index die Pflanzennamen klassen- und familienweise in alpha-

betischer Reihenfolge enthält, bereitet es dem botanisch gebildeten Leser keine Schwierigkeit festzustellen, ob und wo eine gewisse Pflanze behandelt worden ist. Ich erachtete es daher überflüssig, noch ein weiteres allgemeines alphabetischen Register anzufügen.

Ich habe einige Illustrationen beigefügt, von denen eine das gesamte Herbarium zeigt und eine andere die Titelseite des ersten Bandes, schliesslich noch einige Pflanzen aus dem Herbarium, die Linné'ische Originalexemplare darstellen. Für die photographischen Aufnahmen bin ich Herrn Assistenten C. G. Alm zu Dank verbunden.

Wenn durch Savage's Fund der oben erwähnten Handschrift von Linné eine sicherere Kenntnis aller Linné'ischen Arten im Burserschen Herbarium vermittelt werden sollte, wären diese dann wohl in einer besonderen Veröffentlichung mit Photographien sämtlicher Originalexemplare zu behandeln. Ich fand es jedoch nicht angebracht, aus diesem Grunde die Veröffentlichung der vorliegenden Arbeit noch weiter hinauszuschieben.

Uppsala, Botanisches Institut, im August 1936.

Nils E. Svedelius.

JOACHIM BURSER'S HORTUS SICCUS

In Linnés Species plantarum findet man an zahlreichen Stellen Zitate wie dieses: »Burs. VI.5.» Sie beziehen sich auf Pflanzen in dem von Joachim Burser[1] hinterlassenen Herbarium oder Hortus siccus, der im botanischen Museum der Universität Upsala aufbewahrt wird.

Joachim Burser wurde 1583 in der Stadt Kamenz in Sachsen (Oberlausitz) geboren. Er war um 1620 Arzt in Annaberg in Sachsen, wurde aber 1625 nach Dänemark als Professor der Medizin und Botanik an der Ritter-Akademie in Sorö berufen, wo er 1639 starb. Er besass umfassende botanische Kenntnisse und erweiterte diese während seiner Reisen in Deutschland, Österreich, Böhmen, der Schweiz, Norditalien, Südfrankreich und den Pyrenäen. Seine in dieser Weise zusammengebrachten Sammlungen ordnete er zu einem grossen »Hortus siccus», einem Herbar in Buchform, aus 25 Bänden bestehend. Dazu kommt ein Band ohne Nummer, welcher die Pflanzen, die er in Dänemark gesammelt hat, enthält. Diese zwei Herbare, die sich jetzt beide in Upsala befinden, bilden seinen ganzen botanischen Nachlass, denn botanische Schriften hat er selbst nicht veröffentlicht. Dagegen hat der berühmte Baseler Botaniker Caspar Bauhinus in seinem 1620 erschienenen Prodromus Theatri botanici viele neue Arten beschrieben, von denen er angibt, dass er sie von Burser bekommen habe.

Bursers Herbare wurden nach seinem Tode von dem dänischen Reichsrat J. Seefeldt gekauft und seiner Bibliothek einverleibt. Diese wurde ihm aber während des Krieges mit Schweden (1658—60) entwendet und nach Schweden gebracht. Ein paar Jahre später befanden sich die beiden Herbare im Besitz des schwedischen Staatssekretärs J. P. Coijet, und dieser liess sich durch die Bitten Olof Rudbecks d. Ä. dazu bewegen, sie der Universität in Upsala zu schenken.

Rudbeck hatte den Plan gefasst, ein grosses botanisches Bilderwerk herauszugeben, dem vor allem die Pflanzen im Burserschen Hortus siccus zugrunde liegen sollten. Das Werk sollte in Holzschnitt alle damals bekannten Pflanzen wo möglich in natürlicher Grösse vorführen. Die Pflanzen sollten nach C. Bauhins Pinax Theatri botanici geordnet und benannt werden, so dass das Werk, wenn es vollendet worden wäre, als ein Bilderatlas

[1] Sein Familienname war Burscher, wie mir Herr Dr. Kurt Berger in Kamenz mitgeteilt hat. Ich ziehe es jedoch vor, die in der Literatur herkömmliche Schreibweise Burser, eine Rückbildung aus der latinisierten Form Burserus, zu verwenden.

zu jenem Pinax hätte dienen können. Zu diesem Zwecke liess er sowohl lebende Pflanzen, wilde und im Garten wachsende, als die Mehrzahl der Exemplare im Hortus siccus abzeichnen und mit Wasserfarbe malen. Die zwölf Foliobände, die diese Bildersammlung enthalten, sind bis auf den ersten noch erhalten und in der De Geerschen Bibliothek zu Leufsta in Upland verwahrt. Für sein Werk »Campus Elysii» liess er die Bilder in Holz schneiden. Die zwei ersten Bände desselben, von ihm und seinem Sohne Olof Rudbeck d. J. herausgegeben und die Mehrzahl der Monokotyledonen enthaltend, erschienen in den Jahren 1701 und 1702. Im letzteren Jahre entstand aber in Upsala eine grosse Feuerbrunst, die den grössten Teil der Stadt und darunter auch sein Haus vernichtete. Verloren gingen dabei nicht nur mehrere tausend für den Campus Elysii hergestellte Holzschnittstöcke, sondern auch fast die ganze Auflage der fertiggedruckten Bände und endlich, ein noch grösseres Unglück, der 2. und 5. Band des Burserschen Hortus siccus. Die übrigen 23 Bände und der dänische Pflanzen enthaltende Band wurden nach dem Brande in der Universitätsbibliothek aufbewahrt, bis sie im Jahre 1854 dem botanischen Museum der Universität übergeben wurden.

Die Blätter des Hortus siccus haben das Format 20×35 cm und sind in Bänden von Pappe mit Rücken und Ecken aus weissem Leder gebunden. Die Exemplare sind an der ersten Seite eines Blattes festgeleimt, und um ihnen genügenden Raum zu bereiten, ist jedes Blatt längs seiner drei äusseren Ränder mit einem Rahmen von starkem rotgefärbtem Papier umgeben. An jedem Blatte ist ein von Burser geschriebener Zettel festgeklebt. Die Zettel geben den Namen der Pflanze nach Bauhins Pinax an, oft auch Synonyme nach Tabernaemontanus, Lobelius oder anderen Verfassern. Viele Pflanzen sind aber neue Arten und haben von Burser gebildete Namen bekommen. Dann folgen Angaben über Fundorte, die bei den neuen Arten genau angegeben werden, während in anderen Fällen nur das Land oder sogar mehrere Länder angeführt sind, so dass man nicht wissen kann, wo das betreffende Exemplar gesammelt worden ist. Zuletzt steht die Nummer im Bande. Die Handschrift ist bei diesen Angaben überall dieselbe. In einigen Fällen kommen aber spätere Zusätze von Bursers Hand vor, welche sich durch eine schlechtere Schrift auszeichnen. Sie betreffen zuweilen die Bestimmungen, in anderen Fällen die Fundorte, indem neue, z. B. oft »Seelandia», hinzugefügt worden sind. Bei einigen, meist deutschen oder Kulturpflanzen, ist später auch ein deutscher Name auf den Zettel geschrieben worden, ohne Zweifel von Burser selbst.

Die Ordnungsfolge der Arten ist dieselbe wie in Bauhins Pinax. Der Inhalt der einzelnen Bände entspricht den Abteilungen des Pinax in folgender Weise:

Bauhinus, Pinax.				Burserus, Hortus siccus.		
Liber I	Sectio I	entspricht	Vol. I	Nr. 1—130.		
» I	» II—VI	»	» II fehlt.			
» II	» I—VI	»	» III	Nr. 1—158		
» III	» I	»	» IV	» 1—105.		
» III	» II—V	»	» V fehlt.			
» III	» VI	»	» VI	Nr. 1—123.		
» IV	» I—IV	»	» VII	» 1—124 und 1—77.		
» IV	» V, VI	»	» VIII	» 1—123.		
» V	» I—III	»	» IX	» 1—142.		
» V	» IV—VI	»	» X	» 1—161.		
» VI	» I, II	»	» XI	» 1—137.		
» VI	» III, IV	»	» XII	» 1—161.		
» VI	» V, VI	»	» XIII	» 1—164.		
» VII	» I, II	»	» XIV	» 1—103 und 1—81.		
» VII	» III, IV	»	» XV	» 1—70 und 1—88.		
» VII	» V, VI	»	» XVI	» 1—105 und 1—64.		
» VIII	» I—IV	»	» XVII	» 1—107.		
» VIII	» V, VI	»	» XIIX	» 1—100 und 1—87.		
» IX	» I—VI	»	» XIX	» 1—165.		
» X	» I—V	»	» XX	» 1—119.		
» X	» VI	»	» XXI	» 1—84.		
» XI	» I—IV	»	» XXII	» 1—114.		
» XI	» V, VI	»	» XXIII	» 1—76.		
» XII	» I—III	»	» XXIV	» 1—130.		
» XII	» IV—VI	»	» XXV	» 1—91.		

In einigen Bänden ist, wie aus dem Obigen zu ersehen ist, die Nummerfolge abgebrochen, indem eine neue Bauhinsche Sectio wieder mit Nr. 1 anfängt. Die ganze Anzahl der Nummern in den jetzt vorhandenen 23 Bänden beläuft sich auf 3189. Hierzu kommen aber eine Anzahl von Exemplaren, die Burser später eingefügt hat, und die er im allgemeinen mit »post» der vorhergehenden oder »ante» der folgenden Nummer bezeichnet hat.

Wie schon erwähnt, hat Bauhinus in seinem Prodromus zahlreiche damals neue Arten beschrieben nach Exemplaren, die er von Burser bekommen hatte. Auf dem Zettel hat Burser dies bei solchen Arten im allgemeinen durch die Worte »Bauhino attuli» angegeben. Dieselbe Angabe findet sich aber auch bei einer Anzahl von Arten, für welche Bauhin Burser nicht erwähnt, wohl aber dessen Fundort angibt, so dass man annehmen darf, dass er ein Exemplar Bursers für seine Beschreibung benutzt hat. Ich gebe hier ein Verzeichnis von allen diesen Arten mit Angabe der Nummer im Hortus siccus und Anführung der betreffenden Stellen in Bauhins Prodromus und Pinax. Mit einem * bezeichnet sind diejenigen Arten, bei welchen Bauhin sich ausschliesslich auf Bursers Exemplare beruft; bei den übrigen ist Bursers Fundort der einzige von ihm erwähnte.

*Adiantum pedatum XX.13; Pr. 150.
Asplenium marinum Burs. XX.39; Pin. 358.
*Potamogeton pectinatus X.124; Prodr. 101.
*Potamogeton pusillus X.125; Prodr.101.
*Zanichellia palustris X.126; Prodr. 101.
*Arisaema triphyllum X. 137; Prodr. 101.
*Stipa capillata I.44; Prodr. 19.
Allium flavum III.110; Prodr. 27.
*Trillium grandiflorum IX.12; Prodr. 91.
*Uvularia grandiflora XVII.61; Prodr. 136.
*Salix pyrenaica XXIV.120; Prodr. 159.
Arenaria aggregata XI.134; Prodr. 105.
* » montana XI.118; Prodr. 104.
* » purpurascens XI.116; Prodr. 104.
*Arenaria tetraquetra XI.135; Prodr. 105.
*Dianthus alpinus XI.95; Prodr. 104.
*Silene quadridentata XI.117; Prodr. 104.
Anemone silvestris f. IX.79; Pr. 94.
*Aquilegia alpina VII(1)108; Pr. 75.
Thalictrum foetidum XIX.49; Pr. 147.
*Meconopsis cambrica IX.45; Pr. 92.
*Papaver alpinum IX.58; Pr. 93.
*Reseda glauca IV.88; Pr. 42.
*Arabis cebennensis XI.41; Pr. 103.
* » verna IV.47; Pr. 37.
*Hesperis laciniata XI.42; Pr. 103.
Saxifraga aquatica XVI(1)87; Pr. 131.
Potentilla caulescens XVIII(1)93; Pr.139.
Onobrychis viciifolia XIX.138; Pr. 149, Pin. 350.
Linum narbonense XII.34; Pr. 107, Pin. 214.
*Rhus glabra XXII.77; Pr. 158.
*Hypericum Burseri XVI(1)25; Pr. 130.
* » nummularium XVI(1)20; Pr. 130.
*Cornus canadensis X.106; Pr. 100.
*Bupleurum angulosum XVI(1)4; Pr. 129.
*Bupleurum ranunculoides XVI(1)8; Pr. 130.
*Heracleum austriacum VIII.21; Pr. 83.
*Peucedanum alsaticum VII(2)34; Pr. 77.
*Selinum pyrenaeum VIII.36; Pr. 84.
*Seseli spec. VIII.77; Pr. 85.
Anagallis tenella XVII.96; Pr. 136.
*Androsace septentrionalis XIV(1)75; Pr. 118.
*Trientalis americana X.107; Pr. 101.
Gentiana Burseri X.50; Pin. 187.
*Lathraea clandestina III.155; Pr. 31.
Linaria italica XII.17; Pin. 213.
» origanifolia XII.8; Pr. 106.
*Scutellaria alpina XIV(1)35; Pr. 116.
*Stachys alopecuros XIII.119; Pr. 114.
*Myosotis versicolor XIV(2)6; Pr. 119.
*Asperula tinctoria v. pyrenaica XIX.9; Pr. 146.
*Linnaea borealis var. IV.29; Pr. 35.
*Valeriana globulariifolia VIII.113; Pr. 87.
*Campanula pulla IV.22; Pr. 33.
* » rhomboidalis IV.31; Pr. 36.
*Aposeris foetida VI.39; Pr. 62.
*Artemisia glacialis VII(1)64; Pr. 71.
* » scoparia VII(1)39; Pr. 71.
*Bellis annua XIV(2)70; Pr. 121.
*Carduus personata XXI.13; Pr. 155.
*Centaurea axillaris XV(2)29; Pr. 127.
*Crepis Jacquinii VI.87; Pr. 64.
Erigeron alpinus XV(1)33; Pr. 124.
» uniflorus XV(1)34; Pr. 124.
*Inula britannica f. XV(1)41; Pr. 124.
*Senecio doronicum X.29; Pr. 97.
* » provincialis VI.123; Pr. 69.

Ausser den von ihm selbst gesammelten Pflanzen enthält Bursers Hortus siccus auch viele Exemplare, die er von anderen bekommen hat (z. B. »a parente», »a Bauhino», »ex horto Leidensi»). Ein besonderes Interesse beanspruchen eine Anzahl von Pflanzen, die ein Pariser Apotheker aus Amerika mitgebracht und ihm dann geschenkt hatte. Sowohl Burser als Bauhin, der die Mehrzahl derselben im Prodromus beschrieben hat, geben an, dass diese Pflanzen im Küstenlande Brasiliens (»in Brassilia apud Tou-

pinambaultios») gesammelt seien. Nur für eine dieser Pflanzen hat Burser die Angabe »ex Gallia nova», d. h. Canada, dasselbe dürfte aber auch für die übrigen gelten, denn sie sind alle nordamerikanische Arten, wie übrigens schon Linné in Spec. pl. ed. I, p. 305, bemerkt hat. Es sind folgende Arten:

Adiantum pedatum XX.13.
Arisaema triphyllum X.137.
Smilacina racemosa XVII.62.
Trillium grandiflorum IX.12.
Uvularia grandiflora XVII.61.
Sisyrinchium angustifolium XI.98.
Cypripedium parviflorum X.47.
Myrica gale XXII.79.
Actaea rubra X.11.
Anemone dichotoma IX.138.
Thalictrum dioicum XIX.41.
Mitella diphylla XVII.77.
Tiarella cordifolia XVII.76.
Geum rivale XVIII(1)78.
Rhus glabra XXII.77.
Viola canadensis XI.8.
Oenothera spec. XIV(1)4.
Cornus canadensis X.106.
Aralia nudicaulis VIII.8.
Osmorrhiza Claytoni VII(2)57.
Pyrola asarifolia X.100.
» secunda X.102, 103.
Trientalis americana X.107.
Castilleja coccinea XIII.82.
Linnaea borealis IV.29.
Anaphalis margaritacea XV(1)7.

Über die Bearbeitungen, deren Gegenstand Bursers Hortus siccus nach seiner Zeit gewesen ist, habe ich (1928) in der Abhandlung »Studien in Bursers Hortus siccus» ausführlich berichtet, und ich werde mich darüber hier nur kurz fassen.

Olof Rudbeck Vater und Sohn behandelten im 1. Teil ihres Campus Elysius die Gramineen und einen Teil der Cyperaceen, was den ganzen I. und den Anfang des verlorengegangenen II. Bandes vom Hortus siccus ausmacht. Der 2. Teil ihres Werkes enthält die übrigen Monokotyledonen und entspricht dem übrigen Inhalt des II. und dem ganzen des III. Bandes vom Hortus siccus. Von dem gross angelegten Werke, dessen Vollendung durch den grossen Brand in Upsala vereitelt wurde, existieren nur eine kleine Anzahl Exemplare dieser beiden Bände. Einige der Bilder werden von Linné in Flora Suecica zitiert.

Per Martin, ein Schwiegersohn O. Rudbecks d. J., wollte diejenigen Pflanzen im Hortus siccus, die Burser nicht mit Bauhinschen Arten identifiziert, sondern mit eigenen Namen versehen hatte, beschreiben, er musste sich aber darauf beschränken, ein Verzeichnis derselben herauszugeben.

Sein ursprünglicher Plan kam jedoch durch Linné zur Ausführung. Roland Martin, ein Sohn des vorgenannten, gab 1745 unter Linnés Präsidium eine Dissertation heraus, die dann im 1. Band der Amoenitates academicae unter dem Titel »Plantae Martino-Burserianae» abgedruckt wurde. Offenbar ist Linné als der eigentliche Verfasser dieser Schrift anzusehen, und jedenfalls ist er der Auktor der hier neu aufgestellten Arten. Von den 240 hier aufgezählten Arten werden die meisten mit schon bekannten, nach Bauhins Zeit aufgestellten, identifiziert. Etwa 30 werden aber als neue

Arten eingeführt, und sechs von diesen werden in Fussnoten ausführlicher beschrieben. In Spec. Plant. ed. I werden diese Arten mit binären Namen versehen, und die älteren Namen aus Plantae Martino-Burserianae werden mit dem Zitate »Amoen. acad. 1» angeführt.

Ausser diesen Zitaten kommen in Linnés Werken auch zahlreiche direkte Hinweise auf den Hortus siccus vor. In Spec. pl. ed. I fand ich solche Hinweise bei gegen 80 Arten, in ed. II kommen 24 andere hinzu, in Centuria II. plantarum finden sich noch 4, in Mantissa II noch 1.

Ob Exemplare im Hortus siccus die eigentlichen Originale neuer von Linné aufgestellter Arten gewesen sind, ist wohl kaum sicher zu entscheiden. Ich finde es aber wahrscheinlich, dass dies bei den folgenden Arten oder Varietäten der Fall ist. Sie werden hier mit Linnés Nomenklatur angeführt.

Andropogon distachyon I.120.
Anthoxanthum paniculatum I.46.
Arenaria ciliata β. XIV(1)90.
» hispida XI.136.
» striata XI.129.
Cerastium strictum XI.119.
Cucubalus quadrifidus XI.63.
Silene rupestris β. XI.117.
Stellaria graminea γ. XI.116.
Camphorosma glabra XXV.56.
Anemone alpina β. IX.80.
» » γ. IX.81.
» dichotoma IX.138.
» sylvestris var. IX.79.
Aquilegia alpina VII(1)108.
Saxifraga burseriana XVI(1)68.
» geranioides XVI(1)86.
Lotus corniculata γ. XVIII(2)73.
Linum campanulatum XII.38.
Euphorbia exigua γ. XVI(2)55.
Viola canadensis XI.8.
Bupleurum angulosum XVI(1)4.
Bupleurum angulosum β. XVI(1)6.
Seseli pyrenaicum VIII.36.
» saxifragum VIII.51.
Cornus canadensis X.106.
Aretia alpina XVI(1)77.
Primula minima XIII.152.
» vitaliana XIII.154.
Antirrhinum Linaria var. XII.17.
» origanifolium XII. 8, 9.
Asperula pyrenaica XIX.9.
Valeriana tuberosa var. VIII.113.
Artemisia rupestris var. VII(1)63.
Carlina pyrenaica XXI.43.
Chrysanthemum alpinum VII(1)33.
Crepis vesicaria VI.70.
Hieracium chondrilloides VI.87.
» pyrenaicum VI.74.
Inula britannica β. XV(1)41.
» provincialis VI.123.

Tycho Holm, ein Däne, verteidigte unter Linnés Präsidium eine Dissertation, die in Amoen. acad., Bd. V, mit dem Titel »Flora Danica» gedruckt ist. Die Abhandlung ist eine Bearbeitung von Kyllings 1688 gedrucktem »Viridarium Danicum», in welchem Dänemarks Pflanzen mit Bauhinschen Namen in alphabetischer Ordnung aufgezählt werden. Holm hat sie nach Linnés binärer Nomenklatur benannt und nach seinem Systeme geordnet. Er fügt eine Anzahl später gefundene Arten hinzu, sowohl solche, die er selbst gesammelt, als solche Arten, für welche Burser im Hortus siccus angibt, dass er sie in Dänemark gefunden habe. Die letzteren sind im Verzeichnis mit (B) bezeichnet.

Etwa hundert Jahre später wurde noch eine Bearbeitung von Pflanzen

im Hortus siccus vorgenommen. Elias Fries lieferte in seiner Abhandlung »Species Hieraciorum rite cognitae» Bestimmungen der dort enthaltenen Hieracien und einiger anderer Cichorieen. Seine Bestimmungen betreffen die folgenden Nummern: VI.21, 28—44, 46—60, 61—68, 70—91; XV (1) 1—5 und 35.

In meinen Studien in Bursers Hortus siccus (1928) unterwarf ich einer kritischen Untersuchung diejenigen Exemplare desselben, die von den oben zitierten Verfassern behandelt worden sind. Leider war es mir dabei entgangen, dass die Hieracium-Arbeit von E. Fries Bestimmungen einer Anzahl von Bursers Exemplaren enthält.[1]

Die jetzt vorliegende Arbeit soll den Inhalt des Hortus siccus vollständig wiedergeben. Was Burser selbst auf die angeklebten Zettel geschrieben hat, wird zwischen Anführungszeichen gesetzt. Deutsche Pflanzennamen, die er, wie ich vermute, später hinzugefügt hat, sind gesperrt gedruckt. Die Nummer des Exemplares hat Burser zu unterst auf den Zettel geschrieben. Zusätze von anderer Hand, nämlich von den beiden Rudbeck und Linné, kommen fast nur bei den in meinen Studien behandelten Exemplaren vor und werden hier in der Regel nicht aufgenommen.

Bursers Schrift zu lesen bereitete mir in mehreren Fällen Schwierigkeiten. Abkürzungen sind häufig, wie z. B. qdm für quidem, ppe für prope. Ein Zeichen, das einem ρ ähnlich ist und immer am Schluss steht, habe ich mit etc. wiedergegeben. Besonders seine nachträglich gemachten Zusätze sind oft sehr undeutlich geschrieben und schwer zu lesen. Bei dem wiederholten Studium seiner Zettel hat es sich herausgestellt, dass ich in meinen Studien in Bursers Hortus siccus mehrere Stellen unrichtig gelesen habe. Die hier gegebenen Lesarten sind, wie ich hoffe, die richtigen. Ich benutze diese Gelegenheit, eine Liste solcher Berichtigungen mitzuteilen.

I.9.	lies:	Zidern	IV.89 bis.	lies:	Vigant
I.23.	»	Wasserfall montem	VI.18.	»	præcedenti solius natalis
I.89.	»	vfm Schlettnerberge	VI.38.	»	quodam prato.
I.94.	»	Zu fronauw (?) prope	VI.70.	»	rigido, dentato, acuto
I.102.	»	Him(m)eltauw	VI.87.	»	nascebatur
I.103.	»	wildt Panikorn	VI.127	soll	123 sein.
I.117.	»	appellabatur	VII(1)39.	lies:	Linzii
III.97.	»	Hundtsknoblauch	VII(1)108.	»	Pfeffersbadt (soll nach
III.99.	»	descriptum credo.			Fabarias stehen).
III.112.	»	Monspelio	VIII.92.	»	pedicularia
III.133.	»	Kleine	IX.45.	»	Klapper Rosen
IV.72.	»	baulsme	X.123.	»	Michelfelden
IV.88.	»	ad rivum	XI.38.	»	Wintterveijel

[1] Ich verdanke es Herrn K. Wein in Nordhausen, auf diesen Umstand aufmerksam gemacht worden zu sein. Derselbe hat in einer Schrift über die Botaniker Oswald und Fürer, Zeitgenossen Bursers, Notizen über Fundorte einiger Pflanzen im Hortus siccus mitgeteilt.

XI.38.	lies:	Damaschkenblumen
XI.95.	»	Reichenstein
XI.135.	»	Ericæfolius
XIII.82.	»	Liceat interim sic
» »	»	datam Lutetiæ.
XIV(1)88.	»	flosculis albis
XIV(1)91.	»	hasce duas
XIV(2)6.	»	Merues
XIV(2)24.	»	Weckerlinus Argentiensis
XV(1)34.	»	accepit
XVI(1)86.	»	»An Saxifraga
XVI(1)87.	»	Bauh. c(ui)us in
XVIII(1)94.	»	Wittebergæ
XVIII(2) 41 bis	»	Reuchenius
XIX.74 c	»	In arvis Thuringiæ
XIX.93.	»	purpurocæruleis
XIX.112.	»	Monspelio
XX.2.	Das 3. Stück fällt weg, es bezieht sich auf XX.3.	
XX.118.	lies:	Ist Peyssonelia squamaria (Gmel.) Dcne.
XXV.4.	lies:	Weidendorn Sandtdorn
XXV.6, 7.	»	Catharoticus
XXV.13.	»	Deduxit nos ad
XXV.15, 15 bis	»	Chamærubus
XXV.15 bis	»	Molttebeer allatam
XXV.16.	»	minore
XXV20.	»	centifolia Batavica
XXV.20,21	»	Rosen
XXV.26.	»	Cannel Rosen
XXV.28.	»	Provintz
XXV.29.	»	geele
XXV.35.	»	simplici flore
XXV.53.	»	Antz hærrit
XXV.54.	»	potius e(st) Erica
XXV.54.	»	Schweitz
XXV.58.	»	Tamarisci Dioscoridis
XXV.59.	»	arborescebat
XXV.61.	»	altera etc. Lob.
XXV.80.	»	pann.?
XXV.82.	»	Tyrolensi
XXV.86.	»	Eybenbaum

ZITIERTE LITERATUR.

Bauhinius, C., Prodromos Theatri botanici etc. Frankf. 1620, 2. Ed. Basel 1671.

——, Pinax Theatri botanici etc. Basel 1623, 2. Ed. 1671.

Fries, E., Species Hieraciorum rite cognitae. Nova Acta R. Soc. Scient. Upsal., vol. XIV, 1850.

Holm, G. T., Prodromus Florae Danicae, quem praes. C. Linnaeo etc. Upsaliae 1757.

Juel, H. O., Studien in Burser's Hortus siccus. Nova Acta R. Soc. Scient. Upsal., Ser. IV. Vol. 5, 1928.

Linnaeus, C., Plantae Martino-Burserianae. Amoen. acad., vol. I., 1749.

——, Species plantarum, 1753. Ed. 2. 1762—63.

——, Flora Suecica. Ed. 2. 1755.

——, Centuria II. plantarum. Upsaliae 1756 (Diss.); Amoen. acad., vol. IV.

——, Flora Danica. Amoen. acad., vol. V.

——, Mantissa plantarum altera. Holmiae 1771.

Martin, P., Catalogus plantarum novarum Joachimi Burseri etc. Acta Literaria Sueciae. Stockh. et Upsal. 1724.

Martin, R., Dissertatio botanica, qua Plantae Martino-Burserianae etc. praes. C. Linnaeo. Upsalae 1745.

Rudbeck, O., pater et filius. Campi Elysii Liber primus Upsalae 1702. D:o Liber secundus. Upsalae 1701.

Wein, K., Johannes Oswald und Johann Ludwig Fürer. Der Roland von Nordhausen. Heimatgeschichtliche Forschungen hrsg. von der Verw. des Nordhäuser Museums. Nr. 4, 1927.

VOLUMEN I.

Horti sicci seu stirpium, studio et labore D. Ioachimi Burseri Camentio-Lusati, in Regia Nobilium Academia Sorana Medici, et Physices Professoris publici, per diversas regiones et loca collectarum, et iuxta seriem Pinacis Bauhiniani (Ao 1623. Basileæ editi) digestarum, Volumen I continens Sectionem primam libri primi illius Pinacis.

I.1. »I. Gramen caninum arvense sive Gramen Dioscor. Gramen caninum medicatum Lob. Hundsgrass. Queckengrass. In Misnia, Bohemia, Helvetia etc.» *Holcus mollis L.* und *Koeleria cristata* (L.) Pers.

I.2. »An Gramen caninum vineale Bauh. Lipsiæ.» *Agrostis alba* L.

I.3. »Gramen caninum supinum paniculatum foliis varians Bauh. Graminis primi Dioscoridis species minima Thalio. Lipsiæ.» Kaum bestimmbares Gras.

I.4. »An IIX. Gramen caninum maritimum spicatum Bauh. q(ui)a videtur quadrare cum figura in Prodromo posita. Gramen junceum reptans. In Italia.» *Juncus articulatus* L.(?)

I.5. »X. Gramen caninum maritimum spica echinata Bauh. Monspelii ad littus maris et in Valle Augusta dicta, loco montoso: unde colligetur, non esse mere maritimum.» *Tragus racemosus* (L.) Desf.

I.6. »Gramen nodosum avenacea panicula Bauh. pingitur in Prodromo. Accepi a M. Miano Basileæ.» *Arrhenaterum elatius* L.) M. & K. var. *bulbosum* (Schlechtd.).

I.7. »Gramen nodosum pratense panicula fusca nigricante. In Lusatia, Bohemia, et præcipue ad oppidum Gottesgab in montibus Bohemiæ prope piscinam. Item in Seelandia.» *Molinia caerulea* (L.) Mnch.

I.8. »Gramen tremulum maximum Bauh. Pingitur in Prodromo. Monspelii sponte.» *Briza maxima* L.

I.9. »Gramen tremulum maius Bauh. Aegylops Plinii Trago. Gramen leporinum Tabern. Hasengrass, Ziden, Ich achte sein nicht. In Lusatia, Helvetia &c.» *Briza media* L.

I.10. »Gramen paniculis elegantissimis sive ἐραγρωζις, maius Bauh. Gramen paniculatum sativum Tab. liebgrass. Monspelii sponte, ut et Florentiæ.» *Eragrostis major* Host.

I.11. »A præcedente non multum differt. In Lusatia.» *Eragrostis major* Host, kleinere Form.

I.12. »Gramen minimum paniculis elegantissimis Bauh. Gramen minimum Dalechampii. Monspelii et Lutetiæ.» *Mibora minima* (L.) Desv.

I.13. »Gramen pratense paniculatum molle Bauh. Gramen lanatum Dalechampii. Figura e(st) in Prodromo. In Misnia, Bohemia, Helvetia, Dania &c.» *Holcus lanatus* L.

I.14. »Gramen pratense paniculatum maius, latiore folio, Theoph. Bauh. Gramen vulgare Tab. gemein grass. in Lusatia &c.» *Poa annua* L. und *P. palustris* L.

I.15. »Gramen pratense paniculatum medium Bauh. In Lusatia.» *Poa angustifolia* L.

I.16. »An Gramen panicula multiplici Bauh. An vero idem cum præcedente? prope Annæbergam in via Schlettaviensi.» *Festuca rubra* L.

I.17. »Gramen arvense panicula crispa Bauh. Gramen minimum xerampelinum Lob. Basileæ, Monspelii &c.» *Poa bulbosa* L.

I.18. »Gramen segetum altissimum panicula sparsa Bauh. Gramen segetale sive arvense paniculatum Tab. Ackerstraussgrass, Kornstraussgrass. In Lusatia &c.» *Agrostis vulgaris* With.

I.19. »Idem cum præcedente, nisi quod panicula albicet. in Misnia.» *Aira caespitosa* L. und *Agrostis alba* L.(?).

I.20. »Gramen segetum panicula arundinacea Bauh. Gramen harundinaceum arvense Tab. Acker-Riedtgrass. In Lusatia.» *Poa pratensis* L.

I.21. »Gramen paniculatum sylvaticum procerum. In sylvæ Harcyniæ Bohemorum montibus umbrosis.» *Poa remota* Forselles.

I.22. »Gramen paniculatum folio variegato Bauh. Gramen sulcatum, pictum, Hispanicum Tab. Spanisch grass, Welschgrass. gemahlt grass. In hortis Lusatiæ, Misnæ &c.» *Phalaris arundinacea* L. β *picta* L.

I.23. »An Gramen sylvaticum paniculatum altissimum Bauh.? In montibus non ita procul ab urbe Basileensi p(rae)cipue versus Wasserfall montem.» *Molinia caerulea* L. var., vielleicht *arundinacea* (Schrank).

I.24. »An Gramen palustre paniculatum altissimum Bauh.? Wasser riedtgrass. In Lusatia.» *Glyceria aquatica* L.

I. »inter 24 et 25.» »Gramen aquaticum paniculatum latifolium Bauh. Gramen harundinaceum paniculatum Tab. Riedt Straussgrass. In Bohemia, Dania &c.» *Phalaris arundinacea* L.

I.25. »Gramen aquaticum fluitans multiplici spica Bauh. Gramen fluviatile Tab. Fluttgrass. Enttengrass. In Lusatia, Dania &c.» *Glyceria fluitans* L.

I.26. »Gramen aquaticum geniculatum spicatum Bauh. Gramen fluviatile album Tab. Weiss Fluthgrass. In Bohemia, Lusatia, Dania &c.» *Alopecurus aequalis* Sobol.

I.27. »Graminis quædam species in aquis fluitans. Nisi sit Potamogeton tenuissimum, de quo suo loco. In Lusatia.» *Zanichellia palustris* L.

I.28. »Gramen pratense cristatum, sive Gramen spica cristata læve Bauh. Pingit in Prodromo. Kammgrass. In Lusatia, Bohemia, Helvetia, Dania &c.» *Cynosurus cristatus* L.

I.29. »An Gramen spica cristata subhirsutum Bauh. In pratis Scheibenbergensibus, primo ab Annæberga milliari.» *Cynosurus cristatus* L.

I.30. »An Gramen pratense spica flavescente Bauh? In Lusatia et præcipue ad Pelorum Annæbergensem.» *Anthoxanthum odoratum* L.

I.31. »A præcedente differens exilitate. Monspelii.» *Poa alpina* L. **badensis* Haenke.

I.32. »Gramen spicatum folio aspero Bauh. Pingit in Prodromo. In Lusatia, Dania &c.» *Dactylis glomerata* L.

I.33. »Gramen cariophyllatæ foliis spica divulsa Bauh. Gramen caryophyllatum Tab. Neglingrass. In Misnia.» *Carex hirta* L. (+ *C. glauca* Scop.).

I.34. »Gramen typhoides molle Bauh. Gramen alopecurinum I. Tab. Fuchsschwantzgrass. Lipsiæ &c.» *Alopecurus pratensis* L.

I.35. »Gramen typhoides asperum primum Bauh. Lieshgrass. Kolbengrass. Passim.» *Alopecurus aequalis* Sobol. + *Phleum pratense* L.

I.36. »Gramen typhoideum asperum alterum Bauh. In Lusatia &c.» *Phleum pratense* L.

I.37. »Gramen typhoides parvum. Monspelii.» *Koeleria pubescens* (Lam.) Beauv.

I.38. »Gramen typhoides alpinum spica nigra, brevi. In Schneebergk Austriæ inferioris.» *Phleum alpinum* L.

I.39. »Gramen alopecuroides spica rotundiore Bauh. Alopecurus, cauda vulpina Tab. Fuchsschwantzkrautt. Lipsiæ in horto. Monspelii sponte.» *Lagurus ovatus* L.

I.40. »Graminis alopecuroidis species. Monspelii.» *Lamarckia aurea* (L.) Mnch.

I.41. »Gramen Alopecuroides spica aspera Bauh. Pingit in Prodromo. Monspelii sponte.» *Polypogon maritimus* Willd. und *Cynosurus echinatus* L.

I.42. »Gramen pratense tomentosum panicula sparsa Bauh. Gramen tomentosum, Linum pratense Tab. Flahsgrass, Wisenflachs, Mattenflachs. In Lusatia, Dania &c.» *Eriophorum latifolium* Hoppe (+ *E. angustifolium* Roth).

I.43. »Gramen tomentosum alpinum et minus Bauh. In Bohemiæ sylvis paludosis, Rhætia, et monte S. Bernhardi Helvetior. item in Fionia copiose et Seelandia.» *Eriophorum vaginatum* L.

I.44. »Gramen sparteum I. panicula comosa Bauh. Spartum Plinii Clusio. Est illa planta quam Festucam iunceo folio appellat Bauhinus, quamque a me accepisse in Prodromo Theatri affirmat. Prope Sedunum (Sitten) Vallesiæ.» *Stipa capillata* L.

I.45. »An Gramen sparteum spicatum 3. Bauh? Gramen durum angustifolium, acuminatum, spica simplici utplurimum. Monspelii in dumetis.» *Brachypodium ramosum* (L.) R. et Sch.

I.46. »Graminis spartei species. In horto Dei dicto GalloProvinciæ.» *Festuca spadicea* L. Originalexemplar von Linnés *Anthocanthum paniculatum*. Taf. I.

I.47. »Gramen sparteum iuncifolium Bauh. Spartum nostras parvum Lob. In horto Dei Languedociæ. Item in Bohemia, Misnia, Pyrenæis &c. Dania.» *Nardus stricta* L.

I.48. »Gramen sparteum aliud, præcedenti affine. In Lusatia et Bohemia.» *Festuca myuros* L.

I.49. »An Gramen sparteum Basileense, capillaceo folio Bauh. P.? in Bavaria.» Steril, wahrscheinlich *Festuca heterophylla* Lam.

I.50. 1) »Gramen sparteum setas equinas referens Bauh. Dedit mihi Bauhinus, ex Java Insula allatum.»
2) »Filamentum corticis cuiusdam arboris ex Virginia, ubi telam inde texunt. Communicavit Bauhinus, qui illius in Prodromo meminit sub Gramine sparteo.»
Beide scheinen Pflanzenfasern zu sein.

I.51. »Gramen sparteum pennatum Bauh. Spartum Austriacum Clus. Prope oppidum Merues in montibus GalloProvinciæ sponte.» *Stipa pennata* L.

I.52. »Spartum quoddam. Aut Gramen arundinaceum. Accepi a parente.» *Calamagrostis lanceolata* Roth (oder *lanceolata* × *epigeios* ?).

I.53. »Graminis spartei species. Via, qua Monspelio ad mare tenditur, in dumetis alte excrescit. Florem non vidi.» Steril, kaum bestimmbar.

I.54. »An Gramen foliolis iunceis oblongis radice alba Bauh. In Lusatia, Bohemia &c.» *Aira flexuosa* L.

I.55. »Gramen foliolis iunceis brevibus minus Bauh. Gramen exile durius Lob. Gra-

men minus duriusculum Tab. Klein harttgrass. In Lusatia, Suevia.» *Weingaertneria canescens* (L.) Bernh.

I.56. »Gramen foliolis duris iunceis, spica multiplici aspera. Quære supra Gramen panicula multiplici Bauh. cui hoc videtur prorsus simile. In collibus Bohemiæ et Misniæ.» *Festuca ovina* L.

I.57. »Gramen angustifolium durius, multiplici spica. Francofurti ad Mænum in collibus arenosis.» *Festuca rubra* L., forma.

I.58. »Gramen iunceum folio articulata sylvaticum Bauh. Gramen iunceum sylvaticum Tab. Waldt-Bintzengrass. In Lusatia, Misnia &c.» *Juncus compressus* Jacq.

I.59. »Gramen iunceum folio articulato aquaticum Bauh. Gramen junceum aquaticum maius Tab. gross Wasser-bintzengrass. In Lusatia, Misnia, Bohemia &c. Egregie descriptum e(st) in Prodromo Bauh.» *Juncus acutiflorus* Ehrh. (?).

I.60. »Gramen iunceum folio articulato cum utriculis Bauh. quod in Prodromo pingit. In Lusatia &c.» *Juncus* vom Typus *articulatus* L. mit Livia juncorum-Gallen.

I.61. »Gramen iunceum foliis et spica iunci Bauh. Gramen iunceum III. Tab. Bintzengrass, Biessgrass. In Lusatia.» *Juncus squarrosus* L.

I.Inter 61 et 62. »An gramen iunceum foliis et spica iunci minus Bauh? Gramen iunceum aquat. minus Tab? Monspelii in nemore Rovego.» *Scirpus palustris* L.

I.62. »Gramen iunceum montanum capitulo squamoso Bauh. Pingit(ur) in Prodromo. In Lusatia.» *Juncus capitatus* Weig.

I.63. »Gramen iunceum minimum capitulo squamoso Bauh. Lipsiæ.» *Scirpus setaceus* L.

I.64. »Gramen minimum iunceum alterum Bauh. Iuncellus monospermos. Prope oppidum Einsidel Helvetiorum in palustribus.» *Juncus stygius* L.

I.65. »Simile præcedentibus. In Lusatia.» *Scirpus carniolicus* (Koch) Neilr.

I.66. »Gramen iunceum spicatum seu triglochin Bauh. Gramen iunceum spicatum Tab. geähret Wassergrass. In alpibus passim. Item in Misnia, Dania &c.» *Triglochin palustre* L.

I.67. »Gramen spicatum alterum Bauh. Gramen aquaticum spicatum Tab. geährt Wassergrass. In paludibus salsis Halæ Saxonum, et ad mare Balticum passim, ut et aliis pratis bituminosis Seelandiæ.» *Triglochin maritimum* L.

I.68. »Gramen cyperoides latifolium spica rufa, sive caule triangulo Bauh. Gramen cyperoides Tab. Cypergrass. In Gallia, Bohemia &c.» *Carex hispida* Willd.

I.69. »Gramen cyperoides latifolium spica spadiceo viridi maius Bauh. In Lusatia inferiori.» *Carex pendula* Huds.

I.70. »Gramen cyperoides angustifolium spica spadiceoviridi minus Bauh. In Lusatia.» *Carex acuta* L. (*gracilis* Curt.).

I.71. »Gramen cyperoides angustifolium spicis longis erectis Bauh. Ad pagum Cette neufe non longe ab urbe Monspeliensi.» Unbestimmbare *Carex* distigmatica.

I.72. »Gramen cyperoides angustifolium minus. In montibus Helvetiæ.» *Carex Goodenowii* Gay.

I.73. »Gramen cyperoides foliis angustissimis. In alpibus Helvetiæ.» *Carex ferruginea* Scop.

I.post 73. »Præcedentibus affine. Ex Belgio.» *Carex praecox* Schreb.?

I.74. »An Gramen cyperoides spica pendula longiore et angustiore Bauh. In sylva Bohemica.» *Carex silvatica* Huds.

I.post 74. »Gramen cyperoides pusillum.» *Carex capillaris* L.

I.75. »Gramen cyperoides alpinum majus spicis atris. In monte quodam prope thermas Piperinas Helvetiorum.» *Carex atrata* L. var. *aterrima* (Hoppe).

I.76. »Gramen cyperoides alpinum minus, spicis atris. In Pyrenæis.» *Carex nigra* Bell.

I.77. »Gramen cyperoides panicula sparsa maius Bauhini. Gramen cyperinum maius Tab. gross Cypergrass. In Lusatia.» *Scirpus maritimus* L.

I.78. »Gramen cyperoides palustre maius spica compacta Bauh. Gramen cyperinum palustre Tab. Wasser-Cypergrass. In Lusatia &c.» Wahrscheinlich *Carex vulpina* L.

I.79. »Gramen cyperoides maius montanum. In monte Bohemiae Hassbergk prope oppidum Pressnitz.» *Phalaris arundinacea* L.

I.80. »Gramen cyperoides palustre maius spica divisa Bauh. Gramen cyperinum palustre minus Tab. Klein Wasser-Cypergrass. In Bavaria.» *Carex muricata* L.

I.Inter 80. et 81. »Præcedenti affine. an Gramen cyperoides maritimum Bauh. Non procul ab urbe Hafniensi in littore.» *Carex arenaria* L.

I.81. »Gramen cyperoides minus panicula sparsa subflavescente Bauh. Calamagrosteos 2dæ species Trago in icon. Lipsiæ &c.» *Cyperus flavescens* L.

I.82. »Gramen cyperoides minus, panicula sparsa, nigricante Bauh. Monspelii. Lipsiæ; item in ipsa scaturigine thermarum Vallesianarum.» *Cyperus fuscus* L.

I.83. »Graminis cyperoidis alia species. In paludibus non ita procul ab urbe Lipsiensi.» *Rhynchospora alb* (L.) Vahl.

I.84. »Gramen cyperoides miliaceum Bauh. Cyperus graminea sive miliacea Advers. In Lusatia, Misnia &c.» *Scirpus silvaticus* L.

I.85. »Gramen cyperoides maximum, ad hominis altitudinem excrescens. In Castelnouveau non longe Monspelio, loco palustri.» *Cladium mariscus* (L.) R.Br.

I.86. »Gramen cyperoides maritimum Bauh. Iuncus maritimus Advers. Monspelii ad littus maris.» Wahrscheinlich *Cyperus mucronatus* (L.) Mab.

I.87. »Gramen cyperoides alpinum radice Nardi Indicæ. In Pyrenæis.» Unbestimmbar.

I.88. »Gramen arundinaceum spica multiplici Bauh. Gramen arundinaceum maius Tab. gross Riedtgrass. Ad Egram, Bohemiæ fluvium. in Seelandia.» *Phalaris arundinacea* L.

I.89. »An gramen nemorosum spica rufescente molli Bauh.? Gramen nemorosum I. Tab.? vfm Schlettnerberge prope Annæ bergam ubi integros cespites constituit.» *Carex leporina* L.

I.90. »Gramen nemorosum caliculis paleaceis Bauh. Gramen (iunceum) bufonium Tab. Kröttengrass. In Lusatia, Misnia, Dania &c.» *Juncus bufonius* L.

I.91. »Gramen hirsutum latifolium maius Bauh. haarechtig Waldt- oder Buschgrass. Licet glabrum videatur, tamen in foliorum margine passim apparent pili. In montibus Bohemicis et Pyrenæis.» *Luzula silvatica* (Huds.) Gaud.

I.92. »Præcedenti simile, sed folia minora et prorsus glabra. Considera figuram in Prodromo Bauh. Vfm Käsebergk, monte superioris Austriæ, 3. oder 4. meil von Wels nec non in Taurero Rastadiensi.» *Luzula glabrata* (Hoppe) Desv.

I.93. »Gramen hirsutum latifolium minus Bauh. In Misnia &c.» *Luzula pilosa* (L.) Willd.

I.94. »Gramen hirsutum capitulis Psyllii Bauh. Gramen cyperinum pilosum Tab. haarechtig Cypergrass. Zu fronauw (?) prope Annæ bergam. Figuram exhibet Bauhinus in Prodr.» (In »Studien» (1928) steht unrichtig »In planitie prope etc.»). *Luzula multiflora* (Ehrh.) Lej.

I.95. »Gramen hirsutum angustifolium maius Bauh. Minus quod simul agglutinatum est folia habet lata, glabra. In Gothardo Rhætiæ, et Hassbergk Bohemiæ. Elegans pictura in Prodromo.» *Luzula nivea* (L.) DC. Das kleine Exemplar ist nicht mehr vorhanden.

I.post 95. »Gramen spica subrotunda echinata vel Gramen echinato capitulo Bauh. Dedit Bauhinus. Figuram exhibet in Prodromo.» *Echinaria capitata* (L.) Desf.

I.96. »Gramen palustre aculeatum Germanicum, vel minus Bauh. In Lusatia, Dania &c.» *Carex flava* L.

I.97. »Simile præcedenti, spicam extra folia in summitate caulis gerens. In Lusatia. Misnia.» *Carex stellulata* Good.

I.98. »Gramen dactylon folio arundinaceo maius: aculeatum forte Plinii Bauhino cum appendice. Gramen canarium alterum Lob. Monspelii.» *Cynodon dactylon* (L.) Pers. Die »appendix» ist ein unterirdischer Verjüngungsspross.

I.99. »Cum præcedente convenit, nisi quod magis erectum sit. Monspelii.» *Cynodon dactylon* (L.) Pers.

I.100. »Gramen dactylon folio latiore Bauh. Ischæmon Lob. Bluttgrass. Basileæ et in Bohemia.» *Panicum sanguinale* L.

I.101. »Gramen dactylon angustifolium spicis villosis Bauh. Ischæmon 2. Tab. In Vallesia, Helvetia, Bohemia, Gallia.» *Andropogon Ischaemum* L.

I.102. »Gramen dactylon esculentum Bauh. Gramen mannæ Matth. Manngrass, Himmeltauw. Inter plantas siccas parentis.» *Panicum sanguinale* L.

I.103. »Gramen paniceum spica divisa Bauh. Panicum sylvestre Matth. Wilder fench, wildt Panikorn. Ingolstadii et in Bohemia, Helvetia, Dania.» *Panicum crus galli* L.

I.104. »Gramen paniceum spica simplici Bauh. fenchgrass. In Lusatia &c.» *Setaria viridis* (L.) Beauv.

I.105. »Gramen paniceum spicis nigris Bauh. In Misnia.» *Setaria viridis* (L.) Beauv.

I.106. »Gramen sylvaticum panicula miliacea sparsa Bauh. Hirsengrass. In sylva Bohemica.» *Milium effusum* L.

I.107. »Graminis miliacei species. In Lusatia.» *Catabrosa aquatica* (L.) Beauv.

I.108. »An Gramen latifolium spica triticea latiore compacta Bauh. Figura est in Prodromo. Prope Viennam Austriæ in aggeribus.» *Triticum glaucum* Desf.

I.109. »An Gramen angustifolium spica triticea compacta Bauh. Annæbergae ad patibulum.» *Triticum repens* L.

I.110. »Gramen spica brizæ maius Bauh. Pingitur in Prodromo. Basileæ, et in Thuringia.» *Brachypodium pinnatum* (L.) Beauv.

I.111. »Gramen hordeaceum montanum sive maius Bauh. Parisiis.» *Hordeum secalinum* Schreb.

I.112. »Gramen hordeaceum minus et vulgare Bauh. Hordeum spurium, Aristidia Tab. Gerstenthwalch, Bastardtgersten. In Lusatia.» *Hordeum murinum* L.

I.113. »Gramen loliaceum spica longiore Bauh. Lolium Matth. Twalchweitzen, Dortt, Trespe. In Lusatia, Bohemia &c.» *Lolium temulentum* L.

I.114. »An Gramen loliaceum minus supinum spica multiplici Bauh. Basileæ.» *Narduros tenellus* (L.) Duv. Jouve.

I.115. »Gramen loliaceum angustiore folio et spica Bauh. Hordeum murinum, Lolium syl. Tab. Meusegerste, Meusekorn, Taubkorn. Lipsiæ.» *Bromus mollis* L.

I.116. »Festuca graminea glumis hirsutis Bauh. Bromos sterilis altera Lob. Haberkraut, Habertwalch. In Lusatia, Misnia &c.» *Bromus secalinus* L.

I.116 (bis). »Festuca graminea glumis vacuis Bauh. Monspelii.» *Andropogon gryllus* L.

I.117. »A præcedente non multum differt. Lipsiæ appellatur Festuca nemoralis Thalii. Festuca graminea nemoralis latifolia mollis Bauh. In Thuringia, Bohemia.» *Arrhenaterum elatius* (L.) M. et K.

I.118. »An Festuca graminea juba effusa Bauh. Lipsiæ.» *Festuca gigantea* (L.) Vill.

I.119. »Festuca iunceo folio spica gemina Bauh. In Italia.» *Andropogon hirtum* L.

I.120. »Festuca spica gemina majori et longiori ramis et pediculis carens, quia spicæ summitati caulis immediate insident. Basileæ.» *Andropogon distachyon* L. Wahrscheinlich Linnés Original dieser Art.

I.121. »Festuca avenacea sterilis elatior Bauh. Aegylops, Avena fatua Tab. Gerstentwalch, Gauchhaber. In Lusatia, Bohemia, Dania &c.» *Bromus arvensis* L.

I.122. »Festuca avenacea sterilis humilior Bauh. In Misnia &c.» Kaum bestimmbar.

I.123. »An sit eadem cum præcedente? In Bohemia.» *Ventenata dubia* (Leers) Schultz.

I.124. »An Festuca graminea arvensis minor Bauh. In Lusatia.» *Bromus tectorum* L.

I.125. »Festuca altera capitulis duris Bauh. Aegylops Narbonensis. Lob. frembd Twalch. Italianisch Twalch. In Italia.» *Aegilops ovata* L.

I.126. »Estne eadem cum præcedente? Capitula habet oblongiora, magis dissita, aristae quoque longiores. An ob maturitatem? Monspelii.» *Aegilops triuncialis* L.

I.127. »Festuca longissimis aristis glumis vacuis spadicei coloris Bauh. Nadeltwalch. In Bohemia.» *Stipa capillata* L.

I.127 (bis). »Festuca longissimis aristis glumis vacuis Bauh. Aegylops bromoides Tab. q(uam)vis non sint spadicei coloris glumæ t(ame)n non videtur differre a præcedente. In Lusatia, Bohemia.» *Stipa capillata* L.

I.128. »Gramen avenaceum locustis rubris Bauh. Pingit in Prodromo. In Bavaria, Helvetia.» *Melica nutans* L.

I.129. »Gramen avenaceum montanum lanuginosum Bauh. Gramen montanum avenae semine Clus. habergrass. In Thuringia.» *Melica ciliata* L.

I.130. »Gramen avenaceum montanum latifolium leviter villosum. An sit Festuca avenacea? vfm Hassbergk prope Presnizium Bohemiæ. *Bromus ramosus* Huds. (*B. asper* Murr.)

VOLUMEN II.

Der verlorengegangene II. Band enthielt Juncaceen, Cyperaceen, Typhaceen und Equisetum, und von diesen zeigt Rudbecks Campus Elysius Bd. I eine Anzahl Abbildungen mit Wiedergaben von Bursers Zetteln. Von einigen dieser Arten gibt Bauhin an, dass er sie von Burser bekommen habe. Eine Liste der von Rudbeck zitierten Exemplare wird hier mitgeteilt, mit Angaben der betreffenden Stellen in Bauhins Prodromus. Ausführlicher habe ich hierüber in »Studien», S. 32—37, berichtet. Hinsichtlich des übrigen Inhalts können wir nur vermuten, dass er aus Getreidepflanzen und nicht zwiebelführenden Liliifloren bestand.

II.1. »Juncus odoratus sive aromaticus Bauh.» Bezeichnet nach Linné *Andropogon schoenanthus* L., das Bild stellt aber kaum diese Art vor.

II.2. »Juncus acutus capitulis sorghi Bauh.» *Juncus acutus* L.

II.3. »Juncus acutus maritimus capitulis rotundis Bauh.» *Scirpus holoschoenus* L.

II.4. »Juncus lævis panicula sparsa major Bauh.» *Juncus effusus* L.

II.5. »An hic potius sit Juncus maritimus capitulis rotundis Bauh.?» *Scirpus holoschoenus* var. *romanus* (L.).

II.6. »Juncus acutus maritimus caule triangulo Bauh.» Bauh. Prodr., 22. *Scirpus triqueter* L. oder *americanus* Pers.

II.7. »Juncus acutus panicula sparsa Bauh.» Dürfte *Juncus glaucus* Ehrh. sein.

II.8. »Juncus maximus, sive Scirpus major Bauh.» *Scirpus lacustris* L.

II.10. »Juncus lævis panicula non sparsa Bauh.» *Juncus conglomeratus* L.

II.11. »Juncus exiguus montanus mucrone carens Bauh.» Bauh. Prodr., 22. *Juncus triglumis* L.

II.12. »An Juncus acumine reflexo alter Bauh?» *Schoenus nigricans* L.

II. ohne Nummer. »Juncus acumine reflexo minor vel trifidus Bauh.» *Juncus trifidus* L.

II.14. »Juncus capitulis equiseti major Bauh. Juncus Lychnanthemus major Thalii.» *Scirpus palustris* L.

II.15. »Juncus Lychnanthemus tenuis Thalii.» *Scirpus pauciflorus* L. oder *Sc. ovatus* Roth.

II.16. »Juncus floridus major Bauh.» *Butomus umbellatus* L.

II.17. »Juncus floridus minor Bauh.» Bauh. Prodr., 23. *Scheuchzeria palustris* L.

II.18. »Nardus Indica Matth.» *Nardostachys jatamansi* DC.

II.20. »Cyperus rotundus inodorus Germanicus Bauh.» Wahrscheinlich *Scirpus maritimus* L.

II.21. »Cyperus odoratus radice longa Bauh.» *Cyperus longus* L.

II.22. »Cyperus rotundus inodorus Germanicus Bauh.?» Dürfte *Scirpus maritimus* var. *compactus* (Hoffm.) sein.

II.23. »Cyperus longus odorus Peruanus Bauh.» Wahrscheinlich Rhizomknollen von *Dorstenia contrajerva* L.

II.24. »An Cyperus inodorus Germanicus?» Dürfte *Cyperus longus* L. sein.

II.25. »Cyperus rotundus esculentus angustifolius Bauh.» *Cyperus esculentus* L. oder *Scirpus silvaticus* L.

II.26. »Sparganium ramosum Bauh.» *Sparganium ramosum* Huds.

II.27. »Sparganium non ramosum Bauh.» *Sparganium simplex* Huds.

II. ohne Nr. »Polygonum maritimum minus baccis majoribus.» *Ephedra* spec.

II. ohne Nr. »Equisetum longissimis foliis nodosis.» Wahrscheinlich *Equisetum palustre* L.

II.74. »Phalangium non ramosum minus.» Dürfte *Anthericum liliago* L. sein.

VOLUMEN III.

Horti sicci seu stirpivm studio et labore D. Ioachimi Burseri Camentio-Lusati, in Regia Nobilium Academia Sorana Medici, et Phys. Prof. publ. per diversas regiones et loca collectarum et iuxta seriem Pinacis Bauhiniani digestarum Volumen III. continens Sectiones sex libri secundi illius Pinacis.

III.1. »Iris bulbosa latifolia acaulos odora Bauh. Hyacinthus Poëtarum latifolius Lob. An potius illa e(st) quam caule donatam appellat, q(ui)a revera habebat caulem, cum illam legerem, eamque ulnæ longitudine. In Pyrenæis sponte.» Blüten von *Iris xiphioides* Ehrh.

III.2. »Iris bulbosa angustifolia tricolor, odore Coriandri Bauh. Florentiæ in horto Monachorum.» *Iris xiphium* L.

III.2 (bis). »Iris bulbosa angustifolia alba. Accepi Basileæ a M. Miano.» *Iris xiphium* L.

III.3. »Iris tuberosa folio anguloso Bauh. Hermodactylus verus Matth. In Italiæ hortis.» *Hermodactylus tuberosus* (L.) Mill.

III.4. »Gladiolus floribus uno versu dispositis major Bauh. Gladiolus Germanicus Tab. braun Schwertel. In Lusatia sponte.» *Gladiolus communis* L.

III.5. »Gladiolus utrinque floridus Bauh. Gladiolus Italicus Tab. Welscher Schwertel. Florentiæ et Monspelii sponte.» Dürfte *Gladiolus byzantinus* Mill. sein.

III.6. »Gladiolus utrinque floridus incarnatus. Basileæ in horto Heinzmanni.» Wahrscheinlich *Gladiolus byzantinus* Mill.

III.7. »Hyacinthus comosus major purpureus Bauh. Hyacinthus major Tragi, Tab. Lob. grosser Hyacinth, grosse Mertzenblumen. Monspelii et Florentiæ sponte.» *Muscari comosum* (L.) Mill.

III.8. »Hyacinthus comosus albus. Monspelii sponte.» *Muscari comosum* (L.) Mill.

III.9. »Hyacinthus panicula cærulea Bauh. Hyacinthus comosus ramosus. Lipsiæ in horto Deurlingi, et hic Soræ in horto Genensi Dni Præsidis.» *Muscari comosum* f. monstrosa (*Hyacinthus monstrosus* L.).

III.10. »Hyacinthus racemosus cæruleus major Bauh. gross Veijelkraut(?) Traubenhyacinth. Florentiæ sponte.» *Muscari racemosum* (L.) Mill.

III.11. »Hyacinthus racemosus cæruleus minor latifolius Bauh. Hyacinthus cæruleus minor Tab. Kleine blauwe Mertzenblumen. Florentiæ sponte.» *Muscari botryoides* (L.) Mill.

III.12. »Hyacinthus racemosus minor latifolius albo flore. Hyacinthus botryoides lacteus Tab. Erphordiæ.» *Muscari botryoides* (L.) Mill.

III.13. »Hyacinthus racemosus cæruleus minor iuncifolius Bauh. Basileæ, Erfordiæ sponte.» *Muscari racemosum* (L.) Mill.

III.14. »Hyacinthus racemosus moschatus Bauh. Dipcadi Chalcedonicum Lob. Muscari Clus. Bulbus vomitorius Matth. Basileæ et Lipsiæ in hortis.» *Muscari moschatum* Willd.

III.15. »Hyacinthus oblongo flore cæruleus major Bauh. Hyacinthus Anglicus et Belgicus Lob. Non longe Parisiis sponte.» *Scilla non scripta* (L.) Hffgg. et Lk.

III.16. »Hyacinthus Anglicus flore incarnato. Basileæ in hortis.» *Scilla non scripta* (L.) Hffgg. et Lk.

III.17. »Hyacinthus Anglicus albo flore. Basileæ in hortis.» D:o.

III.18. »Hyacinthus obsoleto flore Bauh. aut Hyacinthus oblongo flavo flore eiusdem. Non procul Monspelio in triplici ponte supra Gardam sponte. (au pont du Gard.)» *Dipcadi serotinum* (L.) Med.

III.19. »Hyacinthus orientalis caule maculato Bauh. Florentiæ et Basileæ in hortis.» *Hyacinthus orientalis* L.

III.20. »Hyacinthus orientalis albus Bauh. Basileæ in horto Heinzmanni.» D:o.

III.21. »Hyacinthus orientals albus minor Bauh. Florentiæ in hortis.» D:o.

III.22. »Hyacinthus orientalis maximus Bauh. Hyacinthus orientalis major polyanthos Lob. Tab. Basileæ in hortis.» D:o, mit verzweigtem Stengel.

III.23. »Hyacinthus stellaris bifolius Germanicus Bauh. Basileæ et Ingolstadii sponte.» *Scilla bifolia* L.

III.24. »Hyacinthus stellaris bifolius albo flore. In Lotharingia sponte.» D:o. (Studien, p. 37.)

III.25. »Hyacinthus stellaris spicatus cinereus Bauh. Florentiæ in hortis. Basileæ in horto Bauhini.» *Scilla italica* L.

III.26. »Hyacinthus stellaris cæruleus amænus Bauh. Basileæ in horto Bauhini.» *Scilla amoena* L. (Studien, p. 37.)

(Nr. 27 ist übersprungen.)

III.28. »Hyacinthus stellaris autumnalis minor Bauh. Florentiæ, Monspelii, et Parisiis sponte.» *Scilla autumnalis* L.

III.29. »Hyacinthus minimus maritimus Bauh. Monspelii in littore maris.» Den folgenden Zusatz hat er z. T. ausradiert: ». . . . . figuram et descriptionem in Prodromo Bauh sub Moly moschato.» *Triglochin Barrelieri* Lois.

III.30. »Hyacinthus Indicus bulbosus stellatus Bauh. Hyacinthus stellatus Peruanus Clus. Monspelii in horto D. Dureng.» *Scilla peruviana* L.

III.31. »Narcissus albus circulo croceo vel luteo Bauh. Narcissus veterum Tragi. Narcissenrösslin. In hortis Misniae &c.» *Narcissus poëticus* L.

III.32. »Narcissus albus circulo croceo serotinus. An differat a p(ræ)cedente. In GalloProvincia sponte, ubi media æstate colligebam.» D:o.

III.33. »Narcissus totus albus major Bauh. Narcissu albus Tab. Weiss Narcissenrösslin. Monspelii et Florentiæ in hortis.» Dürfte *Narcissus polyanthos* Lois. sein.

III.34. »Narcissus pallidus circulo luteo Bauh. Narcissus medioluteus I. Tab. Basileæ in horto Heinzmanni.» *Narcissus biflorus* Curt.

III.35. »Narcissus medioluteus copioso flore, odore gravi Bauh. Narcissus medioluteus II. Tab. Donax Narbonensium Lob. Monspelii sponte.» *Narcissus Tazzetta* L. (Studien, p. 37.)

III.36. »Narcissus medioluteus Majoribus floribus Bauh. Basileæ in hortis.» Scheint *N. poëticus* L. zu sein.

III.37. »Narcissus angustifolius flavus magno calyce Bauh. Basileæ in horto Heinzmanni.» *Narcissus calathinus* L. (Studien, p. 37.)

III.38. »Narcissus angustifolius albus minor Bauh. Figuram exhibet in Prodromo. Non longe Monspelio sponte, unde Bauhino bulbos primo(?) transmisi.» *Narcissus dubius* Guss.

III.39. »Narcissus iuncifolius oblongo calyce luteus major Bauh. Basileæ in horto Heinzmanni.» Nur eine Blüte, nicht bestimmbar.

III.40. »Narcissus iuncifolius luteus minor Bauh. Narcissus iuncifolius serotinus Lob. Monspelii sponte.» Ein Exemplar *Narcissus Jonquilla* L., zwei wahrscheinlich *N. juncifolius* Lag.

III.41. »Pseudonarcissus gramineo folio, sive Leuconarcissus æstivus Bauh. In Vallesia in altissimo monte prope thermas Piperinas Helvetiorum: et in Taurero Rastadiensi.» *Lloydia serotina* (L.) Sweet. (Studien, p. 38.)

III.42. »Narcissus sylvestris pallidus calice luteo Bauh. Pseudonarcissus luteus Tab. Josephsstäblin, gelb Hornungsblumen Paasklilien. In Pyrenæis sponte.» *Narcissus pseudo-narcissus* L.

III.43. »Narcissus maior totus luteus calice prælongo Bauh. Florentiæ et Basileæ in hortis.» *Narcissus bicolor* L. (Studien, p. 38.)

III.44. »Narcissus montanus coronatus Bauh. Basileæ dedit M. Mianus cum nomine.» Nur Blüten, schlecht und nicht bestimmbar.

III.45. »Narcissus latifolius albus medioluteus Bauh. Narcissus albus polyanthos Lob. Narcissus flore multiplici Clus. gefüllt Narcissenrösslin. Basileæ et Hafniæ in hortis.» *Narcissus poëticus* L. fl. pleno.

III.46. »Narcissus sylvestris multiplex calyce carens Bauh. Narcissus luteus multiplici flore Lob. Pseudonarcissus luteus polyanthos Tab. gefüllt Josephsstäblin. Basileæ dedit Mianus.» Blüte von *N. pseudo-narcissus* fl. pleno.

III.47. »Narcissus maritimus Bauh. Lilium marinum album, Hemerocallis Valentina Tab. Pancratium marinum Advers. Meerlilien. Florentiæ nel giardino del Signor Gallo al Campaccio.» *Pancratium illyricum* L.

III.48. »Pancratium marinum appellabatur Monspelii, cum ibi in littore, et prope Aquas mortuas (Aigues mortes) legissem.» Nur steril, kann *Pancratium maritimum* L. sein.

III.49. »Leucoium bulbosum vulgare Bauh. Viola alba Theophrasti Trago. Leuconarcissolirion paucioribus floribus Lob. Weisse Hornungsblumen. Monspelii sponte.» *Leucojum vernum* L. (Studien, p. 38.)

III.50. »Leucoium bulbosum maius sive multiflorum Bauh. Leuconarcissolirion pratense vernum Lob. Basileæ in hortis.» *Leucojum aestivum* L.

III.51. »Leucoium trifolium bulbosum minus Bauh. Leuconarcissolirion minimum Lob. Basileæ in horto Fel. Plateri. Florentiæ in hortis.» *Galanthus nivalis* L.

III.post 51. »Leucoium bulbosum autumnale latifolium Bauh. Hoc nomine accepi ex horto Lugdunensi.» *Leucojum aestivum* L.

III.52. »Leucoium bulbosum autumnale Bauh. Leuconarcissolirion minimum autumnale Lob. Basileæ co(mmun)icavit M. Mianus.» Villeicht *Leucojum autumnale* L.

III.53. »Tulipa præcox lutea Bauh. gelb narcissenlilien. Basileæ in hortis.» Eine Blüte von *Tulipa Gesneriana* L.

III.54. »Tulipa præcox rubra Bauh. Basileæ in hortis &c.» D:o.

III.55. »Tulipa præcox obsoleto flore. Basileæ in hortis.» D:o.

III.56. »Tulipa præcox purpurea Bauh. Parisiis in horto du Monsieur de Vendausme.» D:o.

III.57. »Tulipa præcox alba Bauh. Basileæ in horto Heinzmanni.» D:o.

III.(57 b). »Tulipa præcox varia et elegantiss. In horto meo Sorano.» D:o.

III.58. »Tulipa præcox πολυκλωνος Clus. Tulipa serotina ramosa Bauh. Basileæ in horto Eckenstenii.» D:o, monströse Form.

III.post 58. »Tulipa viridis altera Bauh. Ex horto Leidensi.» D:o d:o.

III.59. »Tulipa minor lutea Gallica Bauh. In GalloProvincia A saincte baulsme ad speluncam Magdalenæ sponte.» Vielleicht *Tulipa australis* Lk.

III.60. »Fritillaria præcox purpurea variegata Bauh. Basileæ in horto Eckenstenii.» *Fritillaria meleagris* L.

III.post 60. »Fritillaria polyanthos. Ex horto Lugdunensi.» Dürfte eine mehrblütige Form der vorhergehenden sein.

III.61. »Fritillaria alba præcox Bauh. Basileæ in horto Eckenstenii.» Dieselbe, flore albo.

III.post 61. »Fritillaria polyanthos nivea. Ex horto Lugdunensi.» Vielleicht *Fritillaria meleagris* var. *praecox* Pers.

III.62. »Fritillaria flore minore Bauh. Fritillaria Pyrenæa Clus. Basileæ in horto Eckenstenii.» *Fritillaria pyrenaica* L.

III.63. »Crocus sativus Bauh. Saffran. Florentiæ in hortis.» Zwei Arten, die eine vielleicht *Crocus sativus* L. (α. *officinalis* L.)

III.post 63. »An Crocus vernus latifolius flore purpureo magno Bauh? Ex horto Leydensi.» Scheint *Crocus vernus* (L.) Wulf. zu sein.

III.64. »Crocus vernus latifolius purpuroviolaceus Bauh. In Gothardo Rhætorum.» Wahrscheinlich dieselbe Art.

III.65. »An sit idem cum præcedente? Romæ sponte in Februario.» Wohl auch *Crocus vernus.*

III.post 65. »Crocus vernus flore pleno Bauh. Ex horto Leydensi.» Dieselbe, f. fl. pleno.

III.66. »Crocus vernus minor albicans Bauh. In monte Gothardi Rhætorum sponte. Basileæ in horto Plateri.» Vielleicht *Crocus biflorus* Mill.

III.67. »Crocus vernus latifolius aureus Bauh. Crocum vernum Mæsiacum Clus. Basileæ in horto Heinzmanni.» Nur Blüten, wahrscheinlich von *Crocus moesiacus* Ker.

III.68. »Crocus vernus latifolius flavovarius Bauh. Annæbergæ in horto meo. Sed bulbum acceperam a D. Lud. Iungermanno.» Vielleicht *Crocus susianus* Ker.

III.post 68. »Crocus vernus latifolius flavovarius flore duplici Bauh. Ex horto Leydensi.» Dürfte f. fl. pleno derselben Art sein.

III.69. »Crocus vernus angustifolius magno flore Bauh. Crocus syl. minor Hispanicus flore patulo Lob. Non p(ro)cul Roma sponte. A la Cesarina sexto miliari latino ab urbe Romæ.» *Romulea bulbocodium* (L.) Seb. et M.

III.70. »Colchicum commune Bauh. Zeittlosen. In Lusatia, Bohemia, Helvetia &c.» *Colchicum autumnale* L.

III.71. »Colchici co(mmun)is folia et semen.» D:o.

III.72. »Colchicum radice siccata alba Bauh. Hermodactylus officinar, Dedit Bauhinus.» Nur eine Blüte, wahrscheinlich eines Colchicum.

III.73. »Hermodactyli radices. In officina pharmaceutica.» Knollen eines Colchicum.

III.74. »Videtur minus vulgari. Prope Monspelium à Castelnau.» Auf einem Zettel: »Colchicum album.» Dürfte *Colchicum neapolitanum* Ten. sein.

III.75. »Colchicum montanum angustifolium Bauh. In itinere versus Massiliam.» Steril. Wahrscheinlich *C. neapolitanum* (nicht Merendera montana (L.) Lge).

III.76. »Colchicum pleno flore Bauh. Doppelte Zeitlosen. Basileæ in horto.» Gefüllte Blüte eines Colchicum.

III.77. »Colchicum vernum. In GalloProvincia supra oppidum Lunel sponte.» *Bulbocodium vernum* L. (Studien, p. 38.)

III.78. »Colchicum luteum maius Bauh. Narcissus autumnalis quorundam Clus. Basileæ in horto Eckenstenii.» *Sternbergia lutea* (L.) Ker.

III.79. »Ornithogalum umbellatum medium angustifolium Bauh. Ornithogalum candidum vulgare Lob. Weisse Feldtzwibel. Florentiæ et in Bohemia sponte.» *Ornithogalum umbellatum* L.

III.80. »Ornithogalum latifolium et maximum Bauh. Basileæ in horto Heinzmanni.» *O. latifolium* L. oder *caudatum* Ait.?

III.81. »Ornithogalum angustifolium maius, floribus ex albo virescentibus Bauh. Asphodelus hyacinthinus forte Galeni Lob. Lipsiæ in hortis.» Das Exemplar ist zerstört, es dürfte *O. pyrenaicum* L. gewesen sein. (Studien, p. 38.)

III.82. »Ornithogalum maius spicatum flore albo Bauh. Ornithogalum spicatum Monspeliensium flore lacteo Lob. In GalloProvincia et Florentiæ sponte.» *O. narbonense* L.

III.83. »Ornithogalum spicatum flore viridi lactescente Bauh. Ornithogalum Pannonicum Tab. Ungrisch erdtnüss oder feldzwiebel. A parente. In horto etiam meo.» *O. nutans* L.

III.84. »Ornithogalum luteum Bauh. Bulbus agrestis Trago. geel Feldtzwibel. In Lusatia, Misnia, Dania.» *Gagea lutea* Aut. und *G. arvensis* R. et Sch.

III.85. »Cepa vulgaris Bauh. Zwibel. In hortis passim.» *Allium cepa* L.

III.86. »An Cepa sterilis Trago Bauh.? Cepa Ascalonica Matth? A parente.» Rudb. sen.: »S. Johans lök» Steril, *Allium ascalonicum* L.?

III.87. »Porrum sectivum iuncifolium Bauh. Schoenoprasum Tab. Brisslauc. In hortis Misniæ, Daniæ &c.» *Allium schoenoprasum* L. und *A. sibiricum* L.

III.88. »Porrum sylvestre vinearum Bauh. Ingolstadii sponte.» Zu wenig entwickelt, hat flache Blätter, also nicht Allium vineale L.

III.89. »Scilla radice alba Bauh. Scilla sive Cepa marina Hispanica Lob. meerzwibel. Monspelii in horto Regio.» Nur Blätter, wahrscheinlich von *Urginea maritima* (L.)

III.90. »Allium sativum Bauh. Knoblauch. In hortis passim.» Steril, wahrscheinlich *Allium sativum* L.

III.91. »Allium sativum alterum, sive Allioprasum caulis summo circumvoluto Bauh. Scorodoprasum II. Clus. Lipsiæ in horto Deurlingii.» *Allium sativum* var. *ophioscordon* (Lk).

III.92. »An Allium sphæriceo capite folio angustiore Bauh. Dedit Basileæ M. Mianus, Aureliis in campis collectum, nominavitque Scorodoprason.» Dürfte *Allium sphaerocephalum* L. sein.

III.93. »Scorodoprasum albo flore. Florentiæ sponte.» Scheint *Allium ericetorum* Thore zu sein. (Studien, p. 39.)

III.94. »Allium sylvestre latifolium Bauh. Allium ursinum Matth. Waldt Knoblauch. Ramssen. In sylvis Misniæ. Prope Draxholm Seelandiæ. In Gallo-Provincia.» *A. ursinum* L.

III.95. »Allium montanum latifolium maculatum Bauh. Allium alpinum Tab. Siglwurtz. Basileæ in horto Heinzmanni.» *A. victorialis* L.

III.96. »Allium montanum angustioribus foliis. Forte præcedens ab hac cultura sola differt? In monte Reichenstein Austriæ sup(er)ioris sponte.» Steriles Exemplar derselben Art.

III.97. »Allium sylvestre bicorne flore obsoleto Bauh. Hundtsknoblauch. In Lusatia &c. Dania.» Dürfte *A. oleraceum* L. sein. (Studien, p. 39.)

III.98. »Allium sylvestre minus, primo vere in hortis acervatim prosiliens Ioh. Franco in $^1/_2$ ort. Lus. Allium sylvestre minus, sterile, iuncifolium. In pratis Lusatiæ, Misniæ.» Nicht bestimmbar. (Studien, p. 39.)

III.99. »Allium pratense folio gramineo, flore maiusculo prorsus albo, radice oblonga. Vix esse descriptum credo. Prope Genuam locis palustribus.» *A. triquetrum* L. (Studien, p. 39.)

III.100. »Allium pratense angustifolium. Ingolstadii.» Schlecht, kaum bestimmbar. (Studien, p. 39.)

III.101. »An Allium montanum bicorne latifolium flore dilute purpurascente Bauh. In GalloProvincia copiosissime. sed cornua non habet, flores carnei sunt.» *Allium roseum* L. (Studien, p. 40.)

III.102. »Allium montanum pumilum gramineo folio, floribus purpureis &c. Dubito an sit descriptum. Florentiæ sponte.» *A. roseum* var. *bulbiferum* Kunth. (Studien, p. 40.)

III.103. »Allium iuncifolium bicorne luteum Bauh. Prope Cremsam et Badenam Austriæ in collibus.» *A. flavum* L. (Studien, p. 40.)

III.104. »Allium montanum capite rotundo Bauh. Prope Curiam Rhætorum sponte.» Nicht A. sphaerocephalon L., sondern *A. schoenoprasum* L. (Studien, p. 40.)

III.(104 bis). »Allium sive Moly Virgi(ni)anum Bauh. in append. Phalangium Vir-

ginianum hortulani Leidensis. Hafniæ in horto Clariss. Dn. D. Georgii Fürenii.» *Tradescantia virginiana* L. (Studien, p. 40.)

III.105. »Allium montanum foliis Narcissi maius Bauh. In Thuringia, Austria.» *Allium montanum* Schmidt, und ein Blütenstand von *A. angulosum* L.

III.post 105. »Allium montanum foliis Narcissi minus Bauh. In Pyrenæis, alpibus Styriæ &c.» *A. montanum* Schmidt.

III.106. »Moly latifolium liliiflorum Bauh. Moly Theophrasti Clus. Basileæ in horto Heinzmanni.» Nicht Allium magicum L. oder A. multibulbosum Jacq., sondern *Agapanthus africanus* (L.) Hffgg.

III.107. »An Moly latifolium Indicum Bauh.? Moly Indicum II. Tab? Theca seminis adnascebatur statim radici sine interveniente caule, ut in Colchico, si bene memini. Ratisbonæ in horto D. Oberndorfferi.» Nur ein grosses Blatt.

III.108. »Moly latifolium luteum odore allii I. Bauh. Moly montanum latifolium flavo flore Clus. In hortis Helvetiæ. Misniæ &c.» *Allium moly* L.

III.109. »Moly angustifolium umbellatum Bauh. Moly Matth. Parisiis in horto de M. Niclar. Rhizotomi. Basileæ in horto Heinzmanni.» Dürfte *Allium subhirsutum* L. sein.

III.110. »Moly humile folio gramineo Bauh. Romæ in monte qui appellatur La vinea della Madonna.» *Allium chamæmoly* L. (Studien, p. 41.)

III.111. »Moly moschatum capillaceo folio Bauh. Moly zibethinum Richerii de Belleval. Figura extat in Prodromo. Monspelii sponte.» *Allium moschatum* L. (Studien, p. 41.)

III.112. »Videtur esse idem cum præcedente. Non procul Monspelio in saxis.» Kleine sterile Exemplare, vielleicht der vorhergehenden Art. (Studien, p. 41.)

III.113. »Lilium album flore erecto et vulgare Bauh. Weisse lilien. In hortis passim.» Sehr beschädigt, ist wohl *Lilium candidum* L.

III.114. »Lilium album floribus dependentibus Bauh. Sultan Zambach Clus. Basileæ in horto Heinzmanni.» *L. candidum* L.

III.115. »Lilium purpurocroceum maius Bauh. Lilium aureum maius Tab. grosse goldtlilien. In hortis Lusatiæ, Misniæ, Daniæ &c.» Wahrscheinlich *L. croceum* Chaix.

III.116. »Lilium bulbiferum maius Bauh. In hortis passim.» *L. bulbiferum* L.

III.117. »Lilium floribus reflexis montanum Bauh. Bercklilien. goldtwurtzel. In montosis Misniæ sponte q(ui)d(e)m et in Rhætia prope Schorneck oppidum.» *L. martagon* L.

III. post 117. »Lilium floribus reflexis albis non punctatis Bauh. Ex horto Leidensi.» D:o.

III.118. »Lilium purpurosanguineum flore reflexo Bauh. Hemerocallis Chalcedonica purpurosanguinea polyanthos Lob. In hortis Misniæ &c.» *L. chalcedonicum* L.

III.119. »Lilium miniatum odorum angustifolium Bauh. Martagon Pomponii. In hortis Misniæ &c.» Dürfte *L. pomponium* L. sein. (Studien, p. 41.)

III.120. »Lilium flavum angustifolium Bauh. Lilium montanum flavo flore Clus. Zufiniare flavo flore Eid. In Pyrenæis sponte, p(ræ)sertim in quodam monte copiosissime, quem p(ro)p(ter)ea appellabant La montagne des Lyls.» *Lilium pyrenaicum* Gouan.

III.121. »Lilium sive Corona Imperialis Bauh. Königskron, Königslilien. Basileae, Lipsiæ, et alibi in hortis.» *Fritillaria imperialis* L.

III.121 (bis). »Lilium Persicum Bauh. &c. Lilium Susianum Clus. Persische Lilien. Florentiæ in horto Magni Ducis.» Von dem jetzt verschwundenen Exem-

plare sind am Papier deutliche Spuren geblieben, welche zeigen, dass es gewiss *Fritillaria persica* L. gewesen ist. (Studien, p. 41.)

III.122. »Lilium luteum Asphodeli radice Bauh. Lilio asphodelus luteus liliflorus Lob. Asphodelus liliaceus luteus Tab. geel Affodill lilien. Ingolstadii in hortis.» *Hemerocallis flava* L.

III.123. »Lilium rubrum Asphodeli radice Bauh. Asphodelus liliaceus rubens Tab. Rot Affodill lilien. In hortis Lusatiæ, Misniæ &c.» *Hemerocallis fulva* L.

III.130. Ist zwischen 123 und 124 plaziert. Sieh unten.

III.124. »Cynosorchis latifolia maxima. An Orchis latifolia I. Clus. hist. p. 267 sine icone. Florem non vidi. In Lotharingia.»

III.125. »Cynosorchis latifolia hiante cucullo altera Bauh. Cynosorchis major III Tab. Cynosorchis nostra major Lob. gross Knabenkrautt. In Lusatia &c.» Ein Exemplar von *Orchis mascula* L. und ein anderes, das zu wenig entwickelt ist.

III.126. »An Cynosorchis latifolia apica compacta Bauh.? Cynosorchis major altera nostra Lob.? In Lusatia.» Die Blüten sind zerstört.

III.127. »Cynosorchis latifolia hiante cucullo minor Bauh. Cynosorchis majoris 2da species Lob. In Misnia &c.» *Orchis militaris* L. (Studien, p. 42.)

III.128. »An Cynosorchis militaris media Bauh? In Lusatia.» *Orchis ustulata* L. (Studien, p. 42.)

III.129. »An Cynosorchis militaris minor Bauh.? Testiculus strateumaticus minor X Tab.? Stendelwurtz. Florentiæ.» *Orchis sambucina* L. (Studien, p. 42.)

III.130 (vor 124). »Chamaeorchis alpina folio gramineo Bauh. In Gothardo, Rhætorum monte, ubi collectam Bauhino attuli.» *Chamorchis alpina* (L.) Rich.

III.131. »Orchis morio mas foliis maculatis Bauh. Cynosorchis morio Lob. In Lusatia.» *Orchis morio* L. (nicht mascula L.).

III.132. »Orchis odore hirci longiore angustioreque folio Bauh. Testiculus hircinus II Tab. Bockshödle. Prope Florentiam in monte olivarum seu oliveto: et Parisiis.» *Himantoglossum hircinum* (L.) Spreng.

III.133. »Orchis odore hirci minor Bauh. Kleine bockshödle. In Misnia.» *Orchis coriophora* L. (Studien, p. 42.)

III.134. »Orchis alba bifolia minor calcare oblongo Bauh. In Lusatia, Misnia, Dania &c.» *Platanthera bifolia* (L.) Rchb.

III.135. »Orchis fucum referens major, foliolis superioribus candidis et purpurascentibus Bauh. Testiculus 7. sphegodes Tab. Florentiæ, Genuæ, et Basileæ.» Dürfte *Ophrys arachnites* (L.) Lam. sein. (Studien, p. 42.)

Nr. 136 ist übersprungen.

III.137. »Orchis fucum referens colore rubiginoso Bauh. Florentiæ.» Scheint *Ophrys Bertolonii* Mor. zu sein.

III.138. »An Orchis muscæ corpus referens Bauh.? In Misnia.» Scheint mir eine kleinblütige Form von *Orchis palustris* Jacq. zu sein.

III.139. »Orchis montana Italica flore ferrugineo lingua oblonga Bauh. Orchis macrophylla Columnæ testante D. Sperlingio. Genuæ sponte.» Ziemlich beschädigt, dürfte *Serapias lingua* L. sein.

III.140. »An Orchis montana Italica lingua oblonga altera Bauh. Testiculus XIII Tabern. Prope Olbyam GalloProvinciæ sponte.» *Serapias cordigera* L. (Studien, p. 42.)

III.141. »Orchis odorata moschata sive Monorchis Bauh. In Carynthia, Alpibus Helvetiæ, prope Basileam, nec non in Seelandia.» *Herminium monorchis* (L.) R. Br.

III.142. »Triorchis alba odorata minor Bauh. Testiculus odoratus Lob. Wohlrichendt Knabenkrautt. In Lusatia, Misnia &c.» *Spiranthes autumnalis* Rich.

III.143. »Pseudoorchis Bauh. Orchis radice repente Camer. In Austria superiori, et Helvetia prope Bruck.» *Goodyera repens* (L.) R. Br.

III.144. »Orchis palmata pratensis angustifolia major Bauh. flore candido. Basileæ.» *Gymnadenia odoratissima* (L.) Rich.

III.145. »Orchis palmata pratensis maculata Bauh. Palma Christi Serapias fæmina Lob. In Lusatia &c.» *Orchis maculata* L.

III.146. »Orchis palmata angustifolia minor odoratissima Bauh. Figuram habet in Prodromo. In Lusatia, Misnia, Helvetia &c.» *Gymnadenia conopsea* (L.) R. Br.

III.147. »Orchis castrata Bauh. Satyrium castratum vel Eunuchum Lob. In Misnia &c.» *Habenaria viridis* (L.) R. Br.

III.148. »Orchis palmata montana maculata Bauh. Serapis candido flore montana maculatis foliis Lob. In Lusatia &c.» *O. maculata* L.

III.149. (befindet sich auf demselben Bogen wie Nr. 151).

III.150. »Orchis abortiva fusca Bauh. Pseudolimodoron Clus. Neottia Dodonæi Franco. Vogelnest, Wurmkrautt. In Lusatia, Misnia, Selandia.» *Neottia nidus avis* (L.) Rich.

III.151. »Orchis abortiva violacea Bauh. In GalloProvincia et Florentiæ.» *Limodorum abortivum* (L.) Sw. Auf demselben Bogen auch.

III.149. »Orchis palmata angustifolia alpina nigro flore Bauh. Palma Christi minor fæmina Tab. Klein Händlinswurtz. In alpibus Rhæticis et Pyrenæis.» Vom Exemplar ist sehr wenig übrig, es scheint *Nigritella nigra* (L.) Rchb. gewesen zu sein.

III.152. »Ophris bifolia Bauh. Bifolium Lob. Zweybladt. In Lusatia, Helvetia, Dania.» *Listera ovata* (L.) R. Br.

III.153. »Dens canis latiore rotundioreque folio Bauh. Satyrion et dens caninus Belgarum Lob. In Pyrenæis.» *Erythronium dens canis* L.

III.153 (bis) auf demselben Bogen wie vorige. »Dens canis angustiore longioreque folio Bauh. In Pyrenæis.» D:o var. *longifolium* (Mill.).

III.154. »Orobanche major garyophyllum olens Bauh. Orobanche II Tab. Sommerwurtz. In Bavaria.» Ist *Orobanche caryophyllacea* Sm. ähnlich, jedoch kaum diese Art. (Studien, p. 43.)

III.155. »Orobanche flore majore, ex cæruleo purpurascente Bauh. In Pyrenæis colore cæruleo saturatissimo. Flores in hoc exemplari amissi.» *Lathraea clandestina* L. (Studien, p. 43.)

III.156. »Orobanche quæ Hypopytis dici potest Bauh. In Lusatia, Dania.» *Monotropa hypopitys* L.

III.157. »Orobanche ramosa Bauh. Orobanche 3. πολυκλωνος Clus. Monspelii et in Bavaria.» *Phelipaea ramosa* (L.) C. A. Mey.

III.158. »Orobanche radice dentata major Bauh. Dentaria major Matth. Schuppenwurtz. In Misnia, Lusatia &c.» *Lathraea squamaria* L.

VOLUMEN IV.

Horti sicci seu stirpivm studio et labore D. Ioachimi Burseri Camentio-Lusati, in Regia Nobilium Academia Sorana Medici et Physices professoris

publ. per diversas regiones et loca collectarum, et iuxta seriem Pinacis Bauhiniani digestarum Volumen IV. continens Sectionem I. libri tertii illius Pinacis.

IV.1. »Rapa sativa rotunda Bauh. Rübe. In Misnia, Lusatia &c.» *Brassica.*

IV.2. »Rapa sativa oblonga seu fæmina Bauh. lange Rübe. In Lusatia &c.» *Brassica.*

IV.3. »Yucca foliis Aloës Bauh. Parisiis in horto Robini legi folium, florem v. dedit Bauhinus.» *Yucca gloriosa* L.

IV.4. »Rapunculus esculentus Bauh. Rapuntzlichen. In Helvetia sponte.» *Campanula rapunculus* L.

IV.5. »Rapunculus minor foliis incisis Bauh. Erinus sive Rapunculi minimum genus Columnæ. In GalloProvincia et Florentiæ.» *Campanula erinus* L.

IV.6. »Rapunculus spicatus Bauh. Rapunculus nemorosus primus Tab. Waldt Rapuntzel. In Misnia, Rætia, Helvetia.» Vom Exemplar ist wenig übrig, es dürfte *Phyteuma spicatum* L. gewesen sein.

IV.7. »Rapunculus syl. spicatus cæruleus Thalii cuius meminit Bauhinus. Figura est in Prodromo. Non procul Herbipoli in sylva. Prope Kupfferbergam Bohemiæ.» *Phyteuma betonicifolium* Vill.

IV.8. »Idem cum præcedente, sed florem habebat album. Prope Herbipolim in sylva.» Fast nichts übrig.

IV. post 8. »Rapunculus spicatus alpinus cæruleus angustifolius. In alpibus.» *Phyteuma betonicifolium* Vill. (nicht Ph. spicatum L., wie ich in Studien, p. 43, angegeben habe).

IV.9. »Rapunculus Scabiosæ capitulo cæruleo Bauh. Scabiosa minor V. Tab. In Lusatia, Helvetia, Dania &c.» *Jasione montana* L.

IV.10. »Rapunculus umbellatus latifolius Bauh. Ingolstadii in pratis.» *Phyteuma orbiculare* L.

IV.11. »Rapunculus umbellatus angustifolius Bauh. In alpibus Helveticis, Austriacis &c.» Fast nichts übrig.

IV.12. »An Rapunculus sylvestris umbellatus minor Thalii. Lege ipsum autorem et admonitionem Camerarii. In alpibus.» Sehr beschädigt, vielleicht *Phyteuma orbiculare* L.

IV.13. »Rapunculus umbellatus folio gramineo Bauh. In alpibus Helveticis, Pyrenæis &c.» *Phyteuma hemisphaericum* L.

IV.14. »Rapunculus persicifolius magno flore Bauh. Campanula angustifolia Tab. Kleine glöcklin. Basileæ in hortis.» *Campanula persicifolia* L.

IV.15. »Rapunculus persicifolius albo flore. Basileæ.» D:o.

IV.16. »Rapunculus nemorosus angustifolius magno flore major Bauh. Waldt Rapuntzel. In Lusatia, Dania &c.» D:o.

IV.17. »Rapunculus nemorosus magno flore eoque albo. In Lusatia.» Zerstört, scheint dieselbe gewesen zu sein.

IV.18. »Rapunculus nemorosus angustifolius parvo flore Bauh. In Lusatia.» Auch *Camp. persicifolia* L. (nicht Linum campanulatum L., womit Linné, Sp. pl. II, Bauh:s Art identifiziert).

IV.19. »Rapunculus hortensis latiore folio seu Pyramidalis Bauh. Lactescens Campanula major Lob. Veronæ in horto. Hafniæ in horto Regio.» *Camp. pyramidalis* L.

IV.20. »Rapunculus alpinus corniculatus Bauh. Trachelium petræum minus Ponæ

ap(ud) Clus. In Prodromo figura habetur. In montibus Tyrolensibus.» *Phyteuma comosum* L.

IV.21. »Campanula alpina latifolia, flore pullo Bauh. In Sneberg Austriæ inferioris.» *Campanula pulla* var. β L. (Studien. p. 44.)

IV.22. »Foliis plurimum differt a præcedente, quamvis in eodem cum illa loco invenerim.» *Campanula pulla* L. (Studien, p. 44.)

IV.23. »Campanula alpina linifolia cærulea Bauh. In alpibus Helveticis.» *Campanula pusilla* Haenke.

IV.24. »Campanula minor rotundifolia vulgaris Bauh. Klein wildt Rapuntzel. In pratis Misniæ, Lusatiæ &c.» *Campanula rotundifolia* L.

IV.25. »Campanula minor rotundifolia vulgaris albo flore. In Bohemia.» D:o.

IV.26. »Campanula minor rotundifolia flore in summis cauliculis Bauh. Rapunculus sylvestris flore ex purpureo candicante Tab. Campanula major angustifolia Franco. grosse glöcklin. In pratis Lusatiæ, Misniæ, Bohemiæ &c.» *Campanula patula* L.

IV.27. »Campanula minor rotundifolia alpina Bauh. Vide figuram in Prodromo. In alpibus Austriacis et Helveticis.» *Campanula pusilla* Haenke.

IV.28. »Campanula Cymbalariae foliis vel folio hederaceo Bauh. Supra Tolosam versus Pyrenæos.» *Wahlenbergia hederacea* (L.) Reich.

IV.29. »Campanula serpillifolia Bauh. Figura est in Prodromo. Accepi Parisiis a Pharmacopæo, ex Toupinambault allatam.» *Linnaea borealis* L. (Studien, p. 44.)

IV.(29 b). »An Campanula maxima foliis latissimis Bauh.? Nisi sit peculiaris? q(ui)a folia non adeo lata sunt. Prope Roschildiam in colle umbroso, ad tres et amplius cubitos assurgens.» *Campanula latifolia* L.

IV.30. »Campanula hortensis folio et flore oblongo Bauh. Viola Mariana Tab. Lob. Marienglöcklin. Lipsiæ et alibi in hortis.» *Campanula medium* L.

IV.31. »Campanula Drabæ minoris foliis Bauh. In Vallesia prope Thermas.» *Campanula rhomboidalis* L. (Studien, p. 44.)

IV.32. »Campanula vulgaris foliis urticæ vel major et asperior Bauh. Cervicaria major Tab. Halsskrautt. In Lusatia &c.» *Campanula trachelium* L.

IV.33. »Cervicaria alba Tab. In Lusatia.» D:o.

IV.34. »Campanula urticæ foliis oblongis minus asperis Bauh. In Lusatia.» *Campanula rapunculoides* L.

IV(34 b). »Cervicaria quædam perfoliata ex horto Leidensi.» Soweit ich finden kann, muss dies *Campanula Jacobaea* Chr. Sm. sein. Dies ist eine auf den Capverdischen Inseln endemische Art. Sie wurde im Jahre 1816 von Chr. Smith, Professor der Botanik in Christiania, dort gefunden und in seinem Tagebuche (in Tuckeys Narrative, London 1816, p. 251) mit jenem Namen, aber ohne Beschreibung erwähnt. Sie wurde dann von Webb in Hookers Niger Expedition (London 1849, p. 148) unter dem von Smith verwendeten Namen zum ersten mal beschrieben. Es ist sehr merkwürdig, dass diese Pflanze schon in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts im botanischen Garten zu Leiden vorhanden sein konnte. In den von Hermann, Boerhave und Van Royen herausgegebenen Katalogen dieses Gartens wird sie nicht erwähnt.

IV.35. »Campanula foliis Echii Bauh. Trachelium θυρσοειδες Clus. Figura e(st) in Prodromo. In montibus Misniæ et Bohemiæ.» *Campanula cervicaria* L. (Studien, p. 44.)

IV.36. »Glabrior est præcedente, cui nec flore convenit. In monte quodam saxoso GalloProvinciæ.» *Campanula Allionii* Vill. (Studien, p. 44.)

IV.37. »Campanula foliis Anchusæ, floribus oblongis Bauh. In Vallesia.» *Campanula spicata* L. (Studien, p. 45.) Nr. 38 ist übersprungen.

IV.39. »Campanula alpina pumilla lanuginosa Bauh. Trachelium pumilum alpinum Clus. In montibus Helveticis, ut Pilato Lucernatum et aliis, item in alpibus Austriæ.» *Campanula barbata* L. (Studien, p. 45.)

IV.40. »Campanula pratensis flore conglomerato Bauh. In Misnia, Dania.» *Campanula glomerata* L. var. *pusilla* A. DC.

IV.41. »Campanula pratensis flore albo. In Misnia.» *Campanula bononiensis* L.

IV.42. »Rapistrum flore luteo Bauh. Hederich. In Lusatia &c.» Links *Sinapis alba* L., rechts, wie es scheint, *Brassica nigra* (L.) Koch.

IV.43. »Rapistrum foliis non incisis, apud Bauh. Basileæ. *Sinapis arvensis* var. *orientalis* L.

IV.44. »Rapistrum flore albo Bauh. In Lusatia, Helvetia.» *Raphanus raphanistrum* L.

IV.45. »Rapistrum purpureum Tab. Aut Raphanus florens. Monspelii.» *Raphanus sativus* L.

IV.46. »Rapistrum purpureum foliis integris. Basileæ.» Fast nichts übrig.

IV.47. »Rapistrum floribus Leucoii marini Bauh. In GalloProvincia.» *Arabis verna* (L.) R. Br. (Studien, p. 46.)

IV.48. »Rapistrum Italicum siliquis longissimis Bauh. Rapistrum sylvestre Irionis folio Columnæ. Bormii GalloProvinciæ prope Insulas Stoechadas.» Sehr beschädigt, vielleicht *Sisymbrium orientale* L. (= *Columnae* Jacq.)

IV.49. »Rapistrum monospermum Bauh. Figura extat in Prodromo. Halæ Saxonum, et in Italia. Videtur revera bina semina in siliqua articulata continere. Lege descriptionem in Prodromo Bauh.» *Rapistrum perenne* (L.) All.

IV.post 49. »Napus sativa Bauh. Hench passim.» Nur zwei Blätter. 50 fehlt.

IV.51. »Raphanus major orbicularis vel rotundus Bauh. Rettig. In hortis.» *Raphanus sativus* L.

IV.52. »Raphanus minor oblongus Bauh. Raphanus minor purpureus Lob. Radiss. In hortis.» *Raphanus sativus* L.

IV.53. »Raphanus rusticanus Bauh. Raphanus marinus Tab. Meerrettich. Kreen. In hortis.» *Armoracia rusticana* G. M. Sch.

IV.54. »Raphanus aquaticus foliis in profundas lacinias divisis Bauh. Wasserrettich. In Lusatia inferior et Basileae. In Dania.» *Nasturtium palustre* (L.) DC.

IV.55. »Raphanus aquaticus Rapistri folio Bauh. Rapistrum aquaticum Tab. Wasser Hederich. Basileæ, item in Lusatia, Dania &c.» *Nasturtium amphibium* (L.) R. Br.

IV.56. »Lepidium latifolium Bauh. Raphanus syl. officinarum Lob. Pfefferkrautt. In hortis Lusatiæ, Misniæ etc. Prope Varingum Selandiæ ad littus maris sponte, qdm (quondam?) et in GalloProvincia.» *Lepidium latifolium* L.

IV.57. »Lepidium Dentillaria dictum Bauh. Plumbago quorundam Tab. Flachkrautt (oder Flohkrautt?). Wasserpfeffer. Florentiæ in hortis. Frontignanis Galliæ Narbonensis sponte.» *Plumbago europaea* L.

IV.58. »Iberis Nasturtii folio Bauh. Iberis Cardomantica Lob. Wegkresse. Monspelii et Florentiæ sponte.» *Lepidium graminifolium* L.

IV.59. »Dracunculus hortensis Bauh. Königs saladt, Dragonel. In hortis Italiæ, Misniæ, Daniæ.» *Artemisia dracunculus* L.

IV.60. »Dracunculus pratensis serrato folio Bauh. Ptarmica Matth. Tanacetum album Tragi. Weisser Thorant. In Misnia, Dania &c.» *Achillea ptarmica* L.

IV.61. »Eruca latifolia alba Bauh. Eruca sativa, Erysimum Gesneri Lob. Senff. In hortis Lusatiæ.» *Eruca sativa* Lam.

IV.62. »Eruca syl. major lutea Bauh. (vulgaris getigt) Rochetta(?) vide t(ame)n et seq(uens). Florentiæ. Monspelii.» *Diplotaxis tenuifolia* (L.) DC.

IV.63. »Videtur eadem cum præcedente, sed loco pinguiore nata. Genevæ intra mænia, et Monspelii.» Scheint dieselbe zu sein.

IV.64. »Præcedenti affinis. In Moravia.» *Diplotaxis muralis* (L.) DC.

IV.65. »Eruca Hispanica. An Rapistrum flore albo lineis nigris depicto Bauh. Hafniæ in horto D. Furenii.» Nicht bestimmbar.

IV.post 65. »Eruca Promontorii Bonæ Spei. Hoc nomine venit ex horto Leidensi.» Ein Blatt von *Cardamine graeca* L. mit fertilen Zweigen eines Nasturtium(?). (Studien, p. 46.)

IV.66. »Eruca sylvestris major lutea caule aspero Bauh. Eruca sylvestris Tab. In Vallesia.» Scheint *Erucastrum obtusangulum* (Lois.) Rchb. zu sein.

IV.67. »Cum præcedente multum convenit. Non longe Monspelio in Horto Dei.» Dürfte *Sinapis cheiranthus* (Vill.) Koch sein.

IV.68. »An sit Eruca sylvestris, an Erysimum? In Moravia.» *Sisymbrium irio* L.

IV.69. »Erucæ sylvestris species. In Vallesia ad Rhodanum.» *Erucastrum obtusangulum* (Lois.) Rchb. (Studien, p. 46.)

IV.70. »Eruca aliqua sylvestris. In GalloProvincia.» Ein Nasturtium, vielleicht *N. silvestre* (L.) R. Br. (nicht Sisymbrium Columnae, wie ich in Studien, p. 46, vermutet habe).

IV.71. »Eruca sylvestris minor luteo parvoque flore Bauh. Eruca palustris minor Tab. Kleine Wasser Raucken. In Lusatia, Bavaria &c.» *Nasturtium silvestre* (L.) R. Br. (Studien, p. 46.)

IV.72. »Eruca palustris minor strictissimis foliis. An loci ratione tantum differat a p(ræ)cedente? In GalloProvincia ad speluncam D. Magdalenæ (à saincte baulsme).» Links *Nasturtium pyrenaicum* (L.) R. Br., rechts *N. asperum* (L.) Coss. (Studien, p. 46.)

IV.73. »An Eruca sylvestris minor lutea bursæ pastoris folio Bauh.? Monspelii.» *Sinapis incana* L. (= Hirschfeldia adpressa Mnch).

IV.74. »Eruca sylvestris minor incana Bauh. Monspelii.» *Sisymbrium orientale* L. (= S. Columnae Jacq.).

IV.75. »Eruca lutea latifolia sive Barbarea Bauh. Wintter Kresse. St Barber krautt. In Misnia, Lusatia, Dania &c.» *Barbarea vulgaris* R. Br.

IV.76. »An sit Barbarea minor? In GalloProvincia.» Zu sehr beschädigt.

IV.77. »Eruca cærulea in arenosis crescens Bauh. Figura est in Prodromo. Linzii, Basileæ, et in Alsatia.» *Arabis arenosa* (L.) Scop.

IV.78. »Eruca maritima Italica, siliqua hastæ cuspidi simili Bauh. Cakile serapionis Lob. In Italia, et ad Thermas Bellilucanas non longe Monspelio. item in Dania.» *Cakile maritima* Scop.

IV.79. »Eruca Monspeliaca, siliqua quadrangula echinata Bauh. Sinapi echinatum Lugd. Figuram quære in Prodromo. Monspelii et Florentiæ.» *Bunias erucago* L.

IV.80. »Eadem cum præcedente, sed adultior et siliquas ferens. Monspelii.» D:o.

IV.81. »Eruca angustifolia Austriaca Bauh. Eruca sylvestris angustifolia Lob. In GalloProvincia.» Ist einem *Cheiranthus* ähnlich, hat aber kleinere Blüten.

IV.82. »Sinapi rapi folio Bauh. Senff. In hortis.» *Brassica nigra* (L.) Koch.

IV.83. »Sinapi apii folio sive album Bauh. In hortis.» *Sinapis alba* L.

IV.84. »Sinapi Erucæ folio Bauh. Sinapi syl. minus bursæ pastoris folio Lob. In Lusatia.» Ein Nasturtium, wahrscheinlich *N. amphibium* × *palustre*.

IV.85. »Reseda maxima Bauh. Ad thermas Bellilucanas non longe Monspelio.» *Reseda alba* L.

IV.86. »Reseda vulgaris Bauh. In Austria et Bavaria.» *Reseda lutea* L.

IV.87. »Eadem cum præcedente, nisi quod solo sicciore creverit. Monspelii.» *Reseda lutea* var.

IV.88. »Reseda linariæ foliis Bauh. In sabulo ad rivum in montibus Pyrenæis.» *Reseda glauca* L. (Studien, p. 47.)

IV.89. »Reseda alba minor Bauh. Sesamoides parvum Salmanticum Clus. Lob. Tab. In montibus Languedociæ, Hortus Dei appellatis.» *Astrocarpus sesamoides* (L.) Duby. (Studien, p. 47.)

IV.post 89. »Præcedenti similis, foliis latioribus ac rarioribus, cauliculorum summo velut in ramulos diviso, gestantes flosculum racemosum, more Echii scorpioidis intortum &c. radice admodum crassa &c. Inter oppidum Ganger(?) et Vigan, versus montem Calcaris GalloProvinciæ.» *Corrigiola telephiifolia* Pourr. (Studien, p. 47.)

IV.90. »Resedæ affinis Phyteuma Bauh. Phyteuma Monspeliensium Lob. Figura e(st) in Prodromo. Monspelii et prope Cremsam Austriæ inferioris.» *Reseda phyteuma* L.

IV.91. »Luteola herba salicis folio Bauh. Pseudostruthium Matth. Catanance, Acropodion, Luteola Tab. Streichkrautt. Sterrkrautt. Ingolstadii, et in Seelandia.» *Reseda luteola* L.

IV.post 91. »Luteola herba folio Gentianæ Bauh. Luteolæ majoris Creticæ bacciferæ nomine accepi Ex horto Lugdunensi.» *Datisca cannabina* L.

IV.92. »Erysimum vulgare Bauh. Verbena fæmina Tragi. Wegsenff. Eisenkrautt Weiblin. In Lusatia, Misnia, Dania &c.» *Sisymbrium officinale* (L.) Scop.

IV.93. »Erysimum alterum siliquis Erucæ Bauh. Erysimum II. Tab. In Misnia.» *Sisymbrium Loeselii* L.

IV.94. »Erysimum polyceration vel corniculatum Bauh. Irio alter vulgaris Matth. Florentiæ ad mænia urbis.» *Sisymbrium polyceratium* L.

IV.95. »Erysimum latifolium maius glabrum Bauh. Irio Apulus alter lævi folio Erucæ Columnæ. Monspelii sub stillicidiis.» *Sisymbrium irio* L.

IV.96. »An Erysimo similis lævis laciniata floribus luteis Bauh? In Alsatiæ arvis.» *Erysimum repandum* L.

IV.97. »An Myagrum siliqua longa Bauh. Erysimum III. Tab. In arvis Soranis Seelandiæ.» *Erysimum cheiranthoides* L.

IV.98. »Præcedenti similis. In Lusatia.» D:o.

IV.99. »Erysimo similis hirsuta non laciniata alba Bauh. Figura est in Prodromo. Monspelii, Ingolstadii, Basileæ, Annæbergæ, In Austria, Vallesia, Dania &c.» *Arabis hirsuta* (L.) Scop.

IV.100. »Præcedentis species minor, in alpibus Austriæ lecta, floribus majoribus, siliquis crassioribus &c.» *Arabis alpestris* (Schleich.) Rchb. (Studien, p. 47.)

IV.101. »Persicaria mitis maculosa et non maculosa Bauh. flore rubro. Flöhkrautt. In Lusatia, Misnia, Dania.» *Polygonum persicaria* L.

IV.102. »Persicaria mitis flore albo. In Misnia, Dania &c.» D:o.

IV.103. »Persicaria urens seu Hydropiper Bauh. Wasserpfeffer. In Lusatia, Dania &c.» Auch *P. persicaria* L.

IV.104. »Persicaria minor Bauh. Persicaria pusilla repens Lob. In Lusatia, Dania.» *Polygonum minus* Huds.

IV.(104 bis). »Persicaria maxima Americana. Hafniæ in horto Excell. Dn. D. Olai Wormii qui semen ex Belgio accep(er)at.» Scheint eine *Phytolacca* zu sein.

IV.105. »Piper Indicum vulgatissimum Bauh. Indianischer Pfeffer. In hortis Lusatiæ, Misniæ &c.» *Capsicum annuum* L.

VOLUMEN V.

Über den Inhalt des verlorengegangenen V. Bandes geben Rudbecks in Leufsta verwahrte Pflanzenbilder einige Auskunft. Er enthielt zwei Nummerserien, von denen die erste den Abschluss der Cruciferen, die zweite meist Polygonaceen und Chenopodiaceen umfasste. Die modernen Namen, die hier gegeben sind, gründen sich auf Linnés Identifizierungen, im allgemeinen in Spec. plant. Nur in einem Falle, V(1)73, habe ich eine Art, die Linné nicht erwähnt, zu identifizieren gewagt. Wie ich schon in meinen Studien, S. 48, bemerkt habe, enthielt dieser Band ohne Zweifel einige derjenigen Arten, von denen Bauhin im Prodromus sagt, dass er sie von Burser bekommen habe. Die betreffenden Stellen werden hier zitiert.

V(1)7. »Nasturtium pratense minus, caule flexuoso, folijs Erucae Palustris minoris, floribus parvis siliquis strictis.»

V(1)9. »Nasturtium aquaticum supinum Bauh.» *Nasturtium officinale* R. Br.

V(1)10. »Nasturtium aquaticum majus et amarum Bauh.» *Cardamine amara* L.

V(1)11. »Nasturtium latifolium, aquaticum, Pyrenaeum, flore rubello Bauh.»

V(1)12. »Nasturtium aquaticum, erectius, folio longiore Bauh.»

V(1)13. »Nasturtium aquaticum minus Bauh.» *Cardamine hirsuta* L.

V(1)14. »Nasturtium Alpinum trifolium Bauh.» *Cardamine trifolia* L.

V(1)15. »Nasturtium Alpinum Resedae foliis Bauh.» *Cardamine resedifolia* L.

V(1)16. »Nasturtium Alpinum Resedae foliis minus.»

V(1)17. »Nasturtium petraeum, foliis Bursae Pastoris Bauh.» *Teesdalea nudicaulis* (L.) R. Br. (nur in H. Cliff.).

V(1)18. »Nasturtium Alpinum, tenuissime divisum Bauh.» *Hutchinsia alpina* (L.) R. Br.

V(1)19. »Nasturtium pumilum vernum.»

V(1)20. »Nasturtium pumilum vernum Bauh.» *Hutchinsia petraea* (L.) R. Br.

V(1)21. »Nasturtium Alpinum bellidis folio majus Bauh. (Bauh. Prodr., p. 46). *Arabis bellidifolia* Jacq. (Mant. I).

V(1)22. »Nasturtium bellidis folio, minus Bauh.» *Cardamine bellidifolia* L.

V(1)23. »Nasturtium Alpinum bellidis folio inciso.»

V(1)27. »Nasturtium Barbareae foliis Bauh.» (Bauh. Prodr., p. 46.) *Arabis Halleri* L.

V(1)30. »Thlaspi Vaccariae folio, Bursae pastoris siliquis Bauh.» (Bauh. Prodr., p. 47.) *Thlaspi alpestre* L.?.

V(1)32. »Thlaspi incanum Vaccariae folio, minus.»

V(1)33. »Thlaspi arvense, perfoliatum majus Bauh.» *Thlaspi perfoliatum* L.

V(1)34. »Thlaspi perfoliatum, minus Bauh.» *Thlaspi alpestre* L.

V(1)35. »Thlaspi umbellatum, arvense Bauh.» *Iberis amara* L.(?)

V(1)37. »Thlaspi umbellatum nasturtii foliis Monspeliacum Bauh. *Iberis pinnata* L.
V(1)38 b. »Thlaspi montanum Glasti folio majus Bauh.» *Peltaria alliacea* L. — »Thlaspi montanum Glasti folio minus Bauh.» *Thlaspi montanum* L.
V(1)40. »Thlaspi Alpinum, majus, capitulis rotundis Bauh.» *Cochlearia saxatilis* β L. (in Sp. pl.).
V(1)41. »Thlaspi Alpinum, minus, capitulo rotundo Bauh.» Cochlearia saxatilis α L. = *Kernera saxatilis* (L.) Rchb.
V(1)42. »Thlaspi Alpinum, repens Bauh.» (Bauh. Prodr., p. 49.) *Alyssum montanum* L. (Syst. XII).
V(1)43. »Thlaspi parvum, saxatile, flore rubente Bauh.» (Bauh. Prodr., p. 107.) *Aethionema saxatile* (L.) R. Br.
V(1)44. »Thlaspi montanum, fl. rubello, ramosum minus.»
V(1)45. »Thlaspi saxatile foliis polygalae. Thlaspi saxatile vermiculato folio Bauh.» (Bauh. Prodr., p. 107). *Iberis saxatilis* L.
V(1)46. »Thlaspi incanum luteum serpilli folio minus Bauh.»
V(1)47. »Thlaspi Alysson dictum campestre, maius Bauh.» *Alyssum calycinum* L.
V(1)48. »Thlaspi Alysson dictum campestre minus Bauh.» *Alyssum campestre* L.
V(1)49. »Thlaspi Alysson dictum maritimum Bauh.» *Koniga maritima* (L.) R. Br.
V(1)50. »Thlaspi biscutatum asperum Hieraci foliis Bauh.» *Biscutella didyma* L.(?).
V(1)51. »an Thlaspi biscutatum, asperum, minus Bauh.?»
V(1)52. »Thlaspi biscutatum villosum, flore calcari donato Bauh.» (Bauh. Prodr., p. 49.) *Biscutella auriculata* L.
V(1)54. »Thlaspi clypeatum serpilli foliis Bauh.» *Clypeola Jonthlaspi* L.
V(1)56. »Thlaspi fruticosum, maius, Leucoji folio, Latifol. Bauh.» (Bauh. Prodr., p. 49.)
V(1)57. »Thlaspi fruticosum spinosum Bauh.» (Bauh. Prodr., p. 108.) *Alyssum spinosum* L.
V(1)58. »Thlaspi incanum s. Machliniense Bauh.» *Alyssum incanum* L.
V(1)59. »Thlaspi incanum peculiare.»
V(1)60. »Bursa Pastoris major, folio non sinuato Bauh.» *Capsella Bursa pastoria* L.
V(1)62. »Bursa Pastoris minor, foliis incisis Bauh.» *Teesdalea nudicaulis* (L.) R. Br.
V(1)64. »Bursa Pastoris major, loculo oblongo Bauh.» *Draba muralis* L.
V(1)65. »Bursa Pastoris loculo oblongo Bauh.»
V(1)66. »Bursa Pastoris alpina hirsuta Bauh.» Von Linné sowohl unter *Draba nemorosa* L. als *D. hirta* L. zitiert.
V(1)67. »Bursae Pastoris similis siliquosa major Bauh.» *Arabidopsis Thaliana* (L.) Schnur.
V(1)68. »Bursae Pastoris similis minor Bauh.»
V(1)70. »Myagri species Sorae proxime ad templum.»
V(1)70 c. »Myagri species.»
V(1)72. »Myagrum monospermon, latifolium Bauh.» *Myagrum perfoliatum* L.
V(1)73. »Myagrum monospermon, minus Bauh.» (Bauh. Prodr., p. 52.) Nicht von Linné zitiert. Das Bild stellt sicher *Calepina Corvini* (All.) Desv. vor.
V(1)73 b. »Myagro similis siliqua rotunda Bauh.» *Vogelia paniculata* (L.) Hornem.
V(1)77. »Draba alba siliquosa repens Bauh.» *Arabis alpina* L.
V(1)78. »Draba Erysimi flore et siliqua Bauh.»
V(2)6. »Blitum album majus Bauh.» *Amarantus oleraceus* L.
V(2)7. »Blitum album minus Bauh.» *Amarantus viridis* L.
V(2). »Halimus latifolius seu fruticosus Bauh.» *Atriplex halimus* L.

VOLUMEN VI.

Horti sicci seu stirpivm studio et labore D. Ioachimi Burseri Camentio-Lusati, in Regia Nobilium Academia Sorana Medici, et Physices Professor. publ. per diversas regiones et loca collectarum et iuxta seriem Pinacis Bauhiniani digestarum Volumen VI. continens Sectionem VI. libri tertii illius Pinacis.

VI.1. »Lactuca sativa Bauh. Lattich, Salladt. In hortis ubique.» *Lactuca sativa* L.

VI.2. »Lactuca foliis Endiviæ Bauh. Endivien lattich. In hortis Misniæ, Bohemiæ &c.» D:o.

VI.3. »Lactuca maculosa Bauh. Lactuca Romana Matth. Römischer Salladt. In hortis Misniæ &c.» D:o.

VI.4. »Lactuca folio obscurius virente, semine nigro Bauh. Endivia æstivalis appellabatur ab hortulanis. Sommer Endivien. Duys.(?) In hortis Bohemiæ plurimum colitur.» D:o.

VI.5. »Lactuca folio bolongo acuto Bauh. Habet et hoc semen nigrum. Spitzer Saladt. In quibusdam hortis Misniæ et Seelandiæ. Figura extat in Prodromo.» D:o.

VI.6. »Lactuca capitata Bauh. Lactuca capitata crispis Brassicæ foliis Lob. Kopfet lattich. In hortis Misniæ, Daniæ &c.» D:o.

VI.7. »Lactuca crispa Bauh. Krausser lattich. In hortis Lusatiæ &c.» D:o.

VI.8. »Lactuca crispa rubra, cuius quoque mentionem facit Bauh. In hortis Misniæ &c.» D:o.

VI.9. »Lactuca sylvestris costa spinosa Bauh. Endivia vulgatior officinar. Lob. Wilder lattich. In Lusatia &c.» Sehr defekt, dürfte *Lactuca scariola* L. sein.

VI.10. »Lactuca sylvestris major Thuringiana. Superat humanam altitudinem. Cum Soncho lævi altissimo Clusii non omnino convenit, cum saltem suprema folia in dorso aculeos habeant; nec superior pars caulis et calyculi hirsuti existant. In Thuringia.» *Lactuca virosa* L. (Studien, p. 49.)

VI.11. »Lactuca sylvestris angustifolia. Lactucam murorum a Gesnero appellari aiebat D. Iungermannus. Lipsiæ in collapsis muris.» *Lactuca saligna* L.

VI.12. »Lactuca montana purpurocærulea major Bauh. Libanotis Theophrasti sterilis, Sonchus sylvestris Tab. Waldt lattich. In sylvis Bohemiæ, Helvetiæ &c.» *Prenanthes purpurea* L.

VI.13. »Sonchus asper non laciniatus Bauh. Hasenkohl. In Misnia &c.» *Sonchus asper* (L.) Hill.

VI.14. »Sonchus asper laciniatus et non laciniatus Bauh. Sonchus lævis temerior latifolia Lob. In Lusatia, Dania &c.» D:o.

VI.post 14. »An hic quoque sit Sonchus asper laciniatus et non laciniatus Bauh.? In solo scilicet squalidiori natus, ut monet Bauh. In Lusatia.» D:o.

VI.15. »Sonchus asper laciniatus Creticus Bauh. Pingitur in Prodromo. Basileæ in horto Bauhini. Florentiæ in hortis.» *Urospermum picroides* (L.) Desf.

VI.16. »Sonchus lævis laciniatus latifolius Bauh. In Lusatia, Misnia &c.» *Sonchus oleraceus* L.

VI.17. »Sonchus lævis in plurimas et tenerrimas lacinias divisus Bauh. Florentiæ et Monspelii in muris.» *Sonchus tenerrimus* L. (Studien, p. 49.)

VI.18. »A præcedente solius natalis loci pinguedine differre videtur. major. Florentiæ in muris.» D:o. (Studien, p. 49.)

VI.19. »Sonchus lævis laciniatus muralis parvis floribus Bauh. Sonchus sylvaticus 4. Tab. Sonchus alter folio profundis laciniis sinuato, hederaceo Lob. geeler Hasenkohl. In sylvis Misniæ, Bohemiæ, Daniæ.» *Lactuca muralis* (L.) Fres.

VI.20. »An Sonchus lævis minor, paucioribus laciniis Bauh. In Misnia.» *Sonchus asper* (L.) Hill.

VI.21. »Sonchus lævis angustifolius Bauh. An potius Hieracium maius folio Sonchi &c. Bauh? In Lusatia, Misnia, Bohemia &c. inter segetes.» Fries, p. 208: *Sonchus arvensis* L. var. *angustifolius*.

VI.22. »Sonchus angustifolius maritimus Bauh. Monspelii in littore.» Fast nichts übrig.

VI.23. »Sonchus lævis laciniatus cæruleus vel Sonchus alpinus cæruleus Bauh. blauwer Waldt hasenkohl. In sylvis Bohemiæ et Helvetiæ.» *Mulgedium alpinum* (L.) Less.

VI.24. »Sonchus villosus luteus minor Bauh. Monspelii.» *Urospermum picroides* (L.) Desf.

VI.25. »Soncho affinis Lampsana domestica Bauh. Wildt Sonchen krautt. In Lusatia, Bohemia, Dania &c.» *Lampsana communis* L.

VI.26. »Intybus sativa latifolia sive Endivia vulgaris Bauh. In hortis Germaniæ, Italiæ, Daniæ &c.» *Cichorium endivia* L.

VI.27. »Intybus crispa Bauh. In hortis Misniæ.» D:o.

VI.28. »Cichorium sativum Bauh. Seris sativa Lob. Cichorien, Hindtleufft. In Hortis Lusatiæ, Misniæ &c.» Fries, p. 209: *Cichorium endivia* L.

VI.29. »Flores Cichorii sativi. In hortis.» Fries, p. 209: d:o.

VI.30. »Cichorium album sativum Tab. In hortis Misniæ Gc.» Fries: d:o.

VI.31. »Cichorium sylvestre, sive officinarum Bauh. In Germania, Italia, dania &c.» Fries, p. 209: *Cichorium intybus* L.

VI.32. »Cichorium sylvestre flore albo. In Lusatia.» Fries: d:o.

VI.33. »Cichorium spinosum Bauh. Pingitur in Prodromo. Dedit ipse Bauhinus Basileæ.» Fries, p. 209: *Cichorium spinosum* L.

VI.34. »Cichorium pratense luteum hirsutie asperum, vel Hieracium hirsutum foliis caulem ambientibus Bauh. In Misnia et Helvetia. Dania.» Fries, p. 209: *Picris hieracioides* L.

VI.35. »Cichorium pratense luteum lævius Bauh. Hedypnois Plinii, Aphaca Theophrasti Lob. Dens leonis III. Tab. Lipsiæ in hortis.» Fries, p. 209: *Hedypnois cretica* (L.) Willd.

VI.36. »Idem cum præcedente, prout sponte provenit. Monspelii.» Fries, p. 209: d:o.

VI.37. »Dens leonis latiore folio Bauh. Pimpelblumen, Pfaffenplatten. In Lusatia, Bohemia. Dania.» Fries, p. 210: *Taraxacum officinale* Web.

VI.38. »Dens leonis foliis non laciniatis subrotundis, villosis, atrovirentibus, maculosis &c. Monspelii in quodam prato.» Fries, p. 210: *Taraxacum obovatum* Poir. (Studien, p. 49.)

VI.39. »Dens leonis tenuissimo folio Bauh. Ad montem Draunstein Austriæ superioris.» Fries, p. 210: *Aposeris foetida* (L.) Less. (Studien, p. 50.)

VI.40. »Dens leonis minor, tenuiter laciniatus. Monspelii.» Fries, p. 210: *Taraxaci obliqui* var. (Studien, p. 50.)

VI.(40 bis). »An Dens leonis minimus Bauh? Vel Chondrilla parva lutea, maritimae

similis, sed bulbis carens. Prope oppidum Fünffhunden(?) in pratis udis sterilibus.» Fries, p. 210: »Taraxacum leptocephalum, palustri simile, sed omnibus partibus tenuissimum.»

VI.41. »Dentis leonis alia species, cum minore foliis radiatis Bauhini nonnihil conveniens. Nisi sit Sonchus aliquis. In Gallia Narbonensi.» Fries, p. 210: *Hyoseris radiata* L. (Studien, p. 50.)

VI.42. »Hieracium maius erectum angustifolium Bauh. Hieracium maius Dioscoridis Tab. Habichtkrautt. In Lusatia, Misnia, Dania.» Fries, p. 208: *Crepis biennis* L.

VI.43. »Hieracium dentis leonis folio, flore suaverubente Bauh. Ex fusco flavescit. seu purpurascit, qu(am)q(qua)m colorem per exsiccationem amiserit. In Taurero Rastadiensi.» Fries, p. 208: Leontodon croceum. Nach meiner Ansicht ist es *Crepis aurea* (L.) Cass.

VI.44. »Hieracium dentis leonis folio monoclonon Bauh? Hieracium Intybaceum Tab. In Misnia &c. Dania &c.» Fries, p. 208: *Leontodon hispidus* L.

VI.45. »Hieracium minus glabrum, foliis eleganter virentibus Bauh. Florentiæ in agris.» Eine zarte Crepis, sehr defekt, vielleicht *Crepis neglecta* L.?

VI.46. »An Hieracium asperum flore magno dentis leonis Bauh. Flos ex flavo pallescit. Monspelii et Florentiæ.» Fries, p. 208: *Urospermum Dalechampii* (L.) Desf.

VI.47. »Hieracium dentis leonis folio, hirsutie asperum, magis laciniatum Bauh. Monspelii.» Fries, p. 208: *Leontodon crispus* Vill.

VI.48. »Hieracium glabrum Resedæ foliis, radice crassa lignosa. An Hieracium macrorhizon Tab? An Sonchus potius vel Chondrilla? Monspelii et Florentiæ.» *Reichardia picroides* (L.) Roth (Fries, p. 210: Zollikoferia pumila, eine mir unerklärliche Bestimmung).

VI.49. »An Hieracium dentis leonis folio floribus parvis Bauh? In dumetis Galliæ Narbonensis. Folia crassiuscula, mollia, glutinosa, una cum striato caule nonnihil hirsuta.» Fries, p. 130: *Crepis pulchra* L. var. umbellifera.

VI.50. »Hieracium minus dentis leonis folio subaspero Bauh. Hypochæris, Porcellia Tab. Fercklinkrautt. In Misnia, Lusatia &c.» Fries, p. 208: *Hypochoeris radicata* L.

VI.51. »Estne eadem cum præcedente? In Lusatia &c.» Fries, p. 208: d:o.

VI.52. »An hoc potius sit Hieracium minus dentis leonis folio subaspero Bauh? In Lusatia.» Fries, p. 208: Aetheorrhiza bulbosa, an einer anderen Stelle: *Hypochoeris glabra* L. Es ist die letztere Art.

VI.53. »Hieracium minus dentis leonis folio oblongo glabro Bauh. Hyoseris angustifolia Tab. In Lusatia, Dania &c.» Fries, p. 208: *Hypochoeris glabra* L.

VI.54. »Hieracium minus flore ex albo carneo Bauh. Hieracium parvum Creticum Clus. In hortis Helvetiæ, Misniæ, Daniæ.» Fries, p. 208: *Crepis rubra* L.

VI.55. »Hieracium minus folio subrotundo Bauh. Hyoseris latifolia, mascula Tab. Hieracium 8. Clus. pann. In Lusatia, Misnia &c.» Fries, p. 208: *Arnoseris minima* (L.) Link.

(VI.56. »Hieracium dentis leonis folio, tomentosum. Monspelii et Florentiæ.» Diese Nummer ist nicht mehr da, wird aber in P. Martin's Catalog angeführt, siehe Studien, p. 50!)

VI.56 (bis?). »A præcedente non nisi foliorum figura differt. In iisdem locis.» *Andryala integrifolia* L. (Studien, p. 50. Fries, p. 210, hat: »Hier. Andryaloides», vielleicht ein Schreibfehler.)

VI.57 fehlt.

VI.58. »Hieracium maximum Chondrillæ folio asperum Bauh. Figura habetur in Prodromo. Monspelii.» Fries, p. 208: »Crepis scabra». Nach meiner Meinung ist es *Leontodon crispus* Vill.

VI.59. »Hieracium Chondrillæ folio hirsutum Bauh. Monspelii.» Steril, nur Grundblätter. Fries, p. 208: *Crepis tectorum* L.

VI.60. »Hieracium Chondrillæ folio pallido, calyce striato, non descriptum. Monspelii.» Fries, p. 208: *Crepis taraxacifolia* Thuill. (Studien, p. 51.)

VI.61. »Idem cum præcedente, flores perfectiores habens. Monspelii.» *C. taraxacifolia* Thuill.

VI.62. »Hieracium minus Dioscoridis Tab. Klein Habichkrautt. In Misnia.» Fries, p. 208: *Crepis virens* Vill.

VI.63. »Hieracium Chondrillæ folio glabra radice succisa, maius Bauh. Hieracium minus p(rae)morsa radice Lob. In Lusatia.» Fries, p. 208: *Leontodon autumnalis* L.

VI.64. »Hieracium Chondrillæ folio glabro radice succisa, minus Bauh. In Lusatia et Monspelii.» Fries d:o.

VI.65. »Hieracium siliqua falcata Bauh. Hieracium Monspeliacum et Narbonense Tab. Lipsiæ in horto Deurlingi. Monspelii et Florentiæ sponte.» Fries, p. 208: *Rhagadiolus stellatus* (L.) DC.

VI.66. »Hieracium proliferum falcatum Bauh. Monspelii et prope Bormium oppidum GalloProvinciæ ad Insulas stæchadas.» Fries, p. 208: *Tolpis barbata* L.

VI.67. »An Hieracium minimum falcatum Bauh? In Gallia Narbonensi.» Fries, p. 208: *Crepis Suffreniana* Steud. (Studien, p. 51.)

VI.68. »Hieracium echioides capitulis Cardui benedicti Bauh. Hieracium echioides, Buglossum luteum Tab. geel Ochsenzung. Lipsiæ in horto.» Fries, p. 208: *Helminthia echioides* (L.) Gaertn.

VI.69. »Idem cum præcedente, quamvis p(ro)p(ter) locum natalem tantisper evariet. Florentiæ sponte in riguis(?).» Dieselbe Art.

VI.70. »An Hieracium montanum rapifolium Bauh. An potius Sonchus aliq(ui)s? In Helvetia.» *Crepis vesicaria* L. (Studien, p. 51.) Fries, p. 208, beschreibt diese Pflanze als neue Art unter dem Namen *Crepis rapaefolia* Fr.

VI.71. »Hieracium montanum foliis dentatis flore magno Bauh. In alpibus Helveticis.» Fries, p. 209: Hypochoeris helvetica = *Hypochoeris uniflora* Vill.

VI.72. »Hieracium alpinum latifolium hirsutie incanum, flore magno Bauh. Hieracium Phlomoides Tab. Wullhabichkrautt. In Thuringia, Bohemia, Seelandia, Horto Dei.» Fries, p. 209: *Hypochoeris maculata* L.

VI.73. »An Hieracium montanum hirsutum ramosum parvis floribus Bauh? In alpibus Helveticis, et Horto Dei dicto.» Fries, p. 75: *Hieracium amplexicaule* L.

VI.74. »Hieracium alpinum foliis oblongis dentatis, non sinuosis aut laciniatis. In Pyrenæis.» *Crepis blattarioides* (L.) Vill. (Studien, p. 51.) Fries, p. 210, beschreibt diese Pflanze als neue Art unter dem Namen *Crepis prisca* Fr. Linné nannte sie Hieracium pyrenaicum.

VI.post 74. »Hieracium alpinum folio glabro, lævi dentibus rarioribus prædito, summitate caulis et calycibus hirsutis. Nescio an descriptum. In Austria.» Fries, p. 210: »Willemetia apargioides»; wahrscheinlich durch eine Verwechselung, denn es ist ein Hieracium, zur Kollektiv-Art *Hieracium nigrescens* Willd. gehörig. (Studien, p. 52.)

VI.75. »Hieracium alpinum, folio oblongo, acuto, lævi, non dentato nec sinuato, costa, caule et calyce hirsutis. Vix descriptum. In Pyrenæis.» Fries, p. 67: *Hieracium neocerinthe* Fr. **macrocephalum*. (Studien, p. 52.)

VI.76. »Hieracium alpinum ramosum, folio rigido, dentato, acuto superne glabro, inferne villoso, calyce hirsuto. In Pyrenæis.» Fries, p. 210: *Crepis blattarioides* (L.) Vill. (Studien, p. 52.)

VI.77. »Hieracium alpinum folio acuto molli, lanuginoso, dentato &c. In Vallesia non procul a Thermis.» Fries, p. 156: *Hieracium albidum* Vill. Elfstrand in Studien, p. 52: *Hieracium intybaceum* Wulf.

VI.78. »Hieracium alpinum non laciniatum flore fusco Bauh. In alpibus Rhæticis inter Disentis et Gothardum.» Fries, p. 23: *Hieracium aurantiacum* L.

VI.79. »Hieracium hortense floribus atropurpurascentibus Bauh. Basileæ in horto. Recte censet in Prodromo Bauhinus, hoc a p(ræ)cedente sola cultura differre.» Fries: d:o.

VI.80. »An Hieracium pumilum saxatile asperum, radice præmorsa Bauh? Figuram vide in Prodromo. Pro(pe) oppidum Eisenertz Austriæ superioris in fissuris petræ.» Fries, p. 101: *Hieracium saxifragum* Fr.

VI.81. »Hieracium montanum angustifolium nonnihil incanum Bauh. Hieracium montanum VI. Clus. In Taurero Rastadiensi.» Fries, p. 82: *Leontodon incanus* (L.) Schrank.

VI.82. »Hieracium montanum latifolium glabrum maius Bauh. In Lusatia.» Ziemlich beschädigt, es scheint *Crepis paludosa* (L.) Mnch zu sein.

VI.83. »Hieracium montanum latifolium glabrum minus Bauh. In montibus Misniæ. In Seelandia.» Fries, p. 209: *Crepis paludosa* (L.) Mnch.

VI.84. »Hieracium alpinum glabrum angustifolium. Folia lævia, acuta, viridia, vix dentata, nec sinuata, glabra: calyx tamen villosus. In alpibus Austriæ inferioris et Vallesiæ, nominatim Gemme.» Fries, p. 80: *Hieracium bupleuroides* Gmel.; Elfstrand (Studien, p. 52): *Hieracium glabratum* Hoppe.

VI.85. »Hieracium montanum angustifolium flore pallido, foliis leviter sinuatis, raros dentes habentibus, glabris &c. In Vallesia. Item non procul Geneva.» Fries, p. 78: *Hieracium staticifolium* Vill. (Studien, p. 52.)

VI.86. »Idem cum præcedente. In Austria inferiori.» Wie vorige Nr.

VI.87. »Hieracium alpinum pumilum Chondrillæ folio Bauh. In Schneeberg Austriæ inferioris acervatim nascebatur.» Fries, p. 209: Crepis chondrilloides Jacq.; es ist aber *Crepis Jacquinii* Tausch. (Studien, p. 53.)

VI.88. »An Hieracium Tragopogonis folio Bauh? In montibus Austriæ inferioris, et in Italia.» Fries, p. 79: *Hieracium porrifolium* L.

VI.89. »Hieracium murorum folio pilosissimo Bauh. Pulmonaria Gallica Tab. Buchkohl. lungenkrautt, gross Mäussöhrlin. In Gallia.» Fries, p. 110: *Hieracium murorum* v. *pilosissimum* L.

VI.90. »Hieracium murorum laciniatum minus pilosum Bauh. Pulmonaria Gallica secunda Tab. In Misnia, Bohemia, Dania.» Fries, p. 109: *Hieracium silvaticum* L.

VI.91. »Pulmonaria Gallica tenuifolia Tab. cuius meminit quoque Bauh. In Misnia.» Fries, p. 112: *H. murorum* v. *caesium* Fr.

VI(91 bis). »Pulmonaria Gallica monstrosa, seu hirsutis nodis degenerans, quam Henricus Schade Erphordiensis pro peculiari transmittebat.» Ein Archieracium mit Gallen.

VI.92. »An Hieracium murorum angustifolium non sinuatum Bauh? Figura exstat in Prodromo. In Vallesia, et q(u)dem in muris.» Fries, p. 38: *Hieracium glomeratum* Fr.

VI.93. Hat keine Etikette. Fries, p. 27: *Hieracium praealtum* DC.

VI.94. »An Hieracium pratense latifolium non sinuatum maius Bauh? In Helvetia.» Fries, p. 209: *Crepis praemorsa* (L.) Tausch.

VI.95. »Hieracium fruticosum latifolium foliis dentatis glabrum Bauh. In Misnia, Helvetia, Dania.» Fries, p. 190: *Hieracium boreale* Fr.

VI.96. »Hieracium fruticosum angustifolium maius Bauh. Hieracium Sabaudum Lob. In montibus Misniæ. et in Dania.» Fries, p. 177: *Hieracium umbellatum* L.

VI.97. »An Hieracium fruticosum minimum Bauh? In littore maris Baltici prope Coldinborgum.» Fries, p. 179: *H. umbellatum* L. var. *minus*.

VI.98. »Chondrilla iuncea viscosa arvensis Bauh. Acker Condrille. In Lusatia, et Avenioni Gallorum.» Ein Blütenstand von *Lactuca viminea* (L.) Pr. und eine andere, sterile, Pflanze.

VI.99. »An Chondrilla viminea viscosa Monspeliaca Bauh? In GalloProvincia.» Der Blütenstand fehlt, es dürfte *Lactuca viminea* (L.) Pr. oder *L. ramosissima* G. & Gr. sein.

VI.100. »Chondrilla bulbosa Bauh. Chondrilla pusilla marina lutea bulbosa Advers. Monspelii ad littus.» *Crepis bulbosa* (L.) Tausch.

VI.101. »Chondrilla bulbosa, Conyzæ facie foliis angustioribus Bauh. Chondrillæ alterum genus Rauwolffii appellabat mihi Bauhinus. In GalloProvincia.» *Jasonia tuberosa* (L.) DC.

VI.102. »Chondrilla verrucaria foliis Intubaceis viridibus Bauh. Zazintha Matth. Basileæ in horto Bauhini.» *Zacintha verrucosa* Gaertn.

VI.103. »Eadem cum præcedente, sed sponte nata prope Pratolinum non longe Florentia in arvis.» D:o.

VI.104. »Chondrilla cærulea latifolia laciniata Bauh. Chondrilla latifolia cærulea Tab. Blauwe Chondrille. Lipsiæ in horto Deurlingi.» *Lactuca perennis* L.

VI.105. »Chondrilla cærulea altera, Cichorii sylvestris foliis Bauh. Chondrilla cærulea Tab. In Thuringia.» D:o.

VI.106. »Videtur eadem cum antecedente. In GalloProvincia.» D:o.

VI.107. »Chondrilla foliis laciniatis serratis purpurascente flore Bauh. Chondrilla Hispanica Narbonens. Tab. In Lusatiæ, Daniæ &c. hortis.» *Crupina vulgaris* Cass.

VI.108. »Eadem cum præcedente. Nam sic sponte nascitur. Monspelii.» D:o.

VI.109. »Chondrilla purpurascens foetida Bauh. Hieracium parvum Creticum Clusii. Neque enim ista duo differre videntur. Figura e(st) in Prodromo. In hortis Lipsiæ, Basileæ &c.» *Crepis rubra* L.

VI.110. »Chondrilla cærulea Cyani capitulo Bauh. Sesamoides parvum Matth. Monspelii sponte.» *Catananche caerulea* L.

VI.111. »Senecio minor vulgaris Bauh. Kreutzkrautt. Ubivis.» *Senecio vulgaris* L.

VI.112. »Senecio incanus pinguior Bauh. In montibus Vallesiæ.» *Senecio viscosus* L.

VI.113. »Senecio incanus tenuifolius. Ad Castellum novum prope Monspelium.» *Senecio gallicus* Chaix. (Studien, p. 53.)

VI.114. »Iacobæa vulgaris laciniata Bauh. St. Iacobskrautt. In Lusatia, Bohemia, Dania.» *Senecio erucifolius* L. var. und *S. jacobaea* L.

VI.115. »Iacobæa procerior incana. In Austria, Helvetia, Thuringia.» *Senecio erucifolius* L.

VI.116. »Iacobæa maritima Bauh. Iacobæa marina, Cineraria Tab. In Italia, et in Insulis stæchadibus.» *Senecio cineraria* DC.

VI.117. »Iacobæa maritima, sive Cineraria latifolia Bauh. Pingitur in Prodromo. Communicavit Bauhinus. Legi quoque in Insulis stæchadibus.» Dürfte eine Form derselben Art sein.

VI.118. »Iacobæa alpina laciniata, flore buphthalmi Bauh. Iacobæa Pannonica III latifolia Clus. In montibus Tyrolensibus. et Gothardo.» *Senecio cordatus* Koch.

VI.119. »Eadem cum antecedente. In monte Reichenstein Austriæ superioris.» Dürfte *Senecio alpestris* DC. sein.

VI.120. »Est affinis præcedenti. In montibus Styriæ.» Eine Form derselben Art.

VI.121. »Iacobæa alpina foliis rotundis serratis Bauh. Figura exstat in Prodromo. In coenobio Eremitarum (Einsidel) Helvetiæ.» Vielleicht *Senecio cordatus* Koch, aber einköpfig.

VI.123. »Iacobæa rotundifolia incana. In Colleudaneis GalloProvinciæ.» *Senecio provincialis* (L.) Juel (Studien, p. 54) = S. Gerardi Gr. & G.

VOLUMEN VII.

Horti sicci seu stirpivm studio et labore D. Ioachimi Burseri Camentio-Lusati, in Regia Nobilium Academia Sorana Medici et Physices prof. publ. per diversas regiones et loca collectarum et iuxta seriem Pinacis Bauhiniani digestarum Volumen VII. continens Sectiones 1. 2. 3. 4. libri quarti illius Pinacis.

VII(1)1. »Tanacetum vulgare luteum Bauh. Artemisia Dioscoridis Tab. Reinfarn. In Misnia, Bohemia, Dania.» *Tanacetum vulgare* L.

VII(1)2. »Tanacetum foliis crispis Bauh. Artemisia sativa Anglica Tab. Krausser Reinfarn. In hortis Misniæ, Daniæ &c.» D:o var. *crispum* L.

VII(1)3. »Tanacetum minus album, odore camphoræ Bauh. Achillea Matth. Millefolium nobile Tragi. Edelgarbe. In Misnia, Bohemia &c.» *Achillea nobilis* L.

VII(1)4. »Videtur eadem cum præcedente. In Gallia Barbonensi.» Dürfte eher *A. odorata* L. sein.

VII(1)5. »Achillea minima. Non excrescit altius, utrum tamen a vulgari differat, dubito. Monspelii sponte.» *Achillea odorata* L. (Studien, p. 54.)

VII(1)6. »Tanacetum alpinum. Ita hanc, ob affinitatem, quam habet cum vulgari Tanaceto, nominare libet. Sed descriptio Tanaceti alpini, quam Bauhinus in prodromo adfert, huic prorsus non quadrat. In Gothardo Rhætiæ monte.» *Achillea macrophylla* L. (Studien, p. 54.)

VII(1)post 6. »An hoc sit Tanacetum alpinum Bauh. quod in Prodromo describit? Alias cum Matricaria alpina convenit, potestque Parthenium alpinum tomentosum appellari. In altissimo monte Gletsherbergk dicto a perpetua glacie ibi existente.» *Achillea nana* L. (Studien, p. 54.)

VII(1)7. »Tanacetum montanum inodorum minore flore Bauh. Tanacetum leucanthemum Tab. Weisser Reinfarn. In Thuringia, et ad thermas Carolinas Bohemiæ.» *Chrysanthemum corymbosum* L.

VII(1)8. »Tanacetum inodorum flore majore Bauh. Lipsiæ in horto.» D:o.

VII(1)9. »Tanacetum sive flos Africanus major flore pleno Bauh. grosse gefülltte Thunissblumen. Dresdæ in hortis.» *Tagetes erectus* L.

VII(1)10. »Tanacetum Africanum seu flos Africanus minor Bauh. Color floris prorsus luteus. In hortis Misniæ.» *Tagetes patulus* L.

VII(1)11. »Tanacetum Africanum minus flore rubente. In hortis Misniæ.» D:o.

VII(1)12. »Flos Africanus minor multiflorus Tab. kleine gefüllte Thunissblumen. Dresdae in hortis.» D:o.

VII(1)13. »Tanacetum Africanum minus flore pleno rubente. In Misniæ hortis.» D:o.

VII(1)14. »Matricaria vulgaris Bauh. Artemisia tenuifolia Tab. Mettram, Mutterkrautt. In hortis Misniæ &c.» *Chrysanthemum parthenium* (L.) Bernh.

VII(1)15. »Matricaria flore pleno Bauh. gefüllte Mettram. In hortis Misniæ, Daniæ &c.» D:o, fl. pleno.

VII(1)16. »Matricaria alpina Chamæmeli foliis Bauh. Parthenium alpinum Clus. In alpibus Helveticis, Austriacis.» *Achillea atrata* L. (Studien, p. 54.)

VII(1)17. »Foiis latiusculis seu non ita tenuiter incisis, sed velut pennatis a præcedenti differt. In monte Vallesiæ, Gemme dicto.» *Achillea moschata* Jacq (Studien, p. 54.)

VII(1)18. »Matricaria maritima Bauh. Cotula sive Parthenium marinum minimum Advers. Monspelii ad mare.» *Anthemis maritima* L.

VII(1)19. »Chrysanthemum foliis Matricariæ Bauh. Chrysanthemum Matth. Goldtblum. Lipsiæ et Basileæ in hortis.» *Chrysanthemum coronarium* L.

VII(1)20. »Chrysanthemum flore partim candido, partim luteo Bauh. Lipsiæ in hortis.» D:o.

VII(1)21. »Chrysanthemum alpinum incanum foliis laciniatis Bauh. In Gothardo, Rhætiæ monte.» *Senecio incanus* L.

VII(1)22. »Chrysanthemum alpinum foliis Abrotani multifidis Bauh. In alpibus Austriæ, Styriæ, Carinthiæ, Vallis Augustæ &c.» *Senecio abrotanifolius* L.

VII(1)23. »Chrysanthemum alpinum foliis longis, tenuiter incisis Bauh. In horto Dei dicto, et montibus Pyrenæis.» *Senecio adonidifolius* Lois.

VII(1)24. »Buphthalmum Dioscoridis Bauh. Cotula lutea Dod. Rinds Auge. In Misnia et Bohemia sponte.» *Anthemis tinctoria* L.

VII(1)25. »Buphthalmum Cotulæ folio Bauh. In Gallia Narbonensi.» *Anacyclus radiatus* Lois.

VII(1)26. »Præcedenti affine. An hoc potius sit Buphthalmum cotuleo folio Bauh., præcedens vero sit Buphthalmum lanuginosum foliis Millefolii Eiusd., quod t(ame)n Clusius negat habere flores radiatos, contra Lobelius asserit. In Gallo-Provincia.» Scheint eine schlanke Form derselben Art zu sein.

VII(1)27. »Chamæmelum vulgare, Leucanthemum Dioscoridis Bauh. Chamomilla Trago. Camillen, Hermlin (?). In Lusatia, Misnia, Bohemia, Dania &c.» *Matricaria chamomilla* L.

VII(1)28. »Chamæmelum nobile seu odoratius Bauh. Chamæmelum Romanum Tab. Römische Camillen. In hortis Lusatiæ, Misniæ, Daniæ &c.» *Anthemis nobilis* L.

VII(1)post 28. »An Chamæmelum leucanthemum Hispanicum magno flore Bauh. Chamomillæ latifoliæ Hispanicæ nomine accepi ex horto Leydensi.» *Anthemis* spec. (nicht altissima L.).

VII(1)ante 29. »An Chamæmelum Hispanicum luteum odoratum Bauh. Chamomillæ Hispanicæ nomine venit ex horto Lugdunensi.» Dürfte *Anacyclus radiatus* Lois. sein.

VII(1)29. »Chamæmelum nobile flore multiplici Bauh. gefüllte Römische Camillen. In hortis Misniæ &c.» *Anthemis nobilis* L., fl. pleno.

VII(1)post 29. »Chamæmelum luteum capitulo aphyllo Bauh. Ex horto Lugdunensi.» Vielleicht *Anthemis nobilis* L., f. *discoidea?*

VII(1)30. »Chamæmelum inodorum Bauh. In Lusatia.» *Anthemis cotula* L.

VII(1)31. »An hoc sit potius Chamæmelum inodorum Bauh. Verum hoc non solo odore, sed foliorum ac florum specie et qnte (quantitate?) a Chamomilla

vulgari distinguitur. Vide Bauhinum. Monspelii et Florentiæ.» *Anthemis arvensis* L.

VII(1)32. »Chamæmelum fætidum Bauh. Cotula fætida Dod. Hundts Camillen. In Germania. Dania &c.» Ziemlich beschädigt.

VII(1)33. »Chamæmelum alpinum inodorum Bauh. Leucanthemum alpinum Clus. In alpibus Helveticis, p(ræ)cipue prope thermas piperinas.» *Chrysanthemum alpinum* L. (Studien, p. 55.)

VII(1)34. »Abrotanum mas angustifolium maius Bauh. Stabwurtz. Alprautte. In hortis Lusatiæ.» *Artemisia abrotanum* L.

VII(1)35. »Abrotanum mas angustifolium maximum Bauh. grosse Stabwurtz. Dresdæ, Florentiæ in hortis.» Vielleicht *Artemisia procera* Willd.

VII(1)36. »Abrotanum campestre Bauh. Ambrosia tenuifolia Lob. In Misnia, Bohemia &c.» *Artemisia campestris* L.

VII(1)37. »A præcedente forte non differt specie, sed accidentibus quibusdam soli natalitii ratione acquisitis. Monspelii in littore maris.» Scheint dieselbe Art zu sein.

VII(1)38. »Abrotanum campestre coliculis albicantibus Ioh. Franco. In Lusatia superiori. Post exsicc(ation)em acq(vi)siverunt caules rubedinem quam in collectione non habebant.» Scheint auch *A. campestris* zu sein.

VII(1)39. »Abrotanum campestre incanum Carlinæ odore Bauh. Linzii Austriæ sup(er)ioris.» *Artemisia scoparia* W. &. K. (Studien, p. 55.)

VII(1)40. »Idem cum præcedente, sed florens, nam adultum variat a seipso adolescente. In Bohemia ad fluvium Egram.» D:o. (Studien, p. 55.)

VII(1)41. »Abrotanum fæmina foliis teretibus Bauh. Chamæcyparissus Trago. Cupresse. In hortis Lusatiæ &c.» *Santolina chamaecyparissus* L.

VII(1)42. »Abrotanum fæmina flore majore Bauh. Abrotanum fæmina III seu Narbonense Clus. hist. p. 142. In GalloProvincia sponte: et in horto Regio Monspelii.» Dieselbe Art.

VII(1)43. »An Abrotanum fæmina foliis Ericæ Bauh. In hortis Lusatiæ.» Eine Form derselben Art mit kahleren Blättern.

VII(1)44. »Eadem cum præcedente videtur.» D:o.

VII(1)45. »An Abrotanum fæmina villosis et incanis foliis Bauh.? In GalloProvincia sponte.» Dichtwollige Form von *Santolina chamaecyparissus* L.

VII(1)46. »Artemisia vulgaris major Bauh. Roter Beifuss. In Germania, Dania &c.» *Artemisia vulgaris* L.

VII(1)47. »Artemisia alba Tab. In Germania, Dania &c.» D:o.

VII(1)48. »Ambrosia maritima Bauh. In hortis Lusatiæ.» *Ambrosia maritima* L.

VII(1)49. »Ambrosia campestris repens Bauh. Coronopus repens Lob. Tab. Feldthirtshorn. Lipsiæ in Collegio Paulino, et Ingolstadii in arvis.» *Coronopus procumbens* Gil.

VII(1)50. »Botrys Ambrosioides vulgaris Bauh. Traubenkrautt. Dresdæ in valle sponte (nisi casu semen eo venerit). Alias in hortis passim.» *Chenopodium botrys* L.

VII(1)51. »Botrys Chamædryoides Bauh. Iva muschata Tab. Chamædrys laciniatis foliis Lob. Feldt Cypress. In Misnia et Helvetia sponte.» *Teucrium botrys* L.

VII(1)52. »Absinthium Ponticum seu Romanum officinarum, seu Dioscoridis Bauh. Absynthium vulgare Lob. Tab. Wermuth. Passim sponte, subinde in hortis.» *Artemisia absinthium* L.

VII(1)53. »Absynthium Ponticum tenuifolium incanum Bauh. Absynthium Pon-

ticum Matth. Pontischer Wermuth. In hortis Lusatiæ, Daniæ.» *Artemisia pontica* L.

VII(1)54. »Absynthium Ponticum tenuifolium Austriacum Bauh. An potius idem cum præcedente? In Ungariæ interamni sponte.» D:o.

VII(1)post 54. »An hoc potius sit Absynthium Ponticum Austriacum Bauh.? Locus natalis excidit. Folia habet diversa a p(ræ)cedenti.» Dürfte eine Gartenform derselben Art sein.

VII(1)55. »An Absynthium Ponticum repens vel supinum Bauh.? Camitii in horto paterno.» Steril.

VII(1)56. »Præcedentibus simile. Florentiæ.» Steril.

VII(1)57. »Absynthium maritimum Lavandulae folio Bauh. Meer beyfuss. Basileæ in horto Fel. Plateri.» *Artemisia caerulescens* L.

VII(1)58. »Absynthium Seriphium Germanicum Bauh. Lipsiæ in horto Deurlingi.» Steril, wahrscheinlich *Artemisia maritima* L.

VII(1)post 58. »A præcedente foliorum latitudine differt. Parisis in horto des poudres.» Junges Exemplar, wahrscheinlich auch *A. maritima*.

VII(1)59. »Absynthium Seriphium Gallicum Bauh. Monspelii in maris littore.» *Artemisia gallica* Willd.

VII(1)60. »Absynthium Santonicum Alexandrinum Bauh. Dedit Basileæ D. Reuchenius, qui legerat in horto Medico Patavino.» Nur ein kleines Stück, nicht bestimmbar.

VII(1)61. »An Absynthium Santonicum Gallicum Bauh? Massiliæ non longe a portu.» Steril, vermutlich *Artemisia gallica* Willd.

VII(1)62. »An Absynthium Seriphium montanum candidum Bauh? In Vallesia.» *Artemisia valesiaca* All.

VII(1)63. »Absynthium alpinum incanum Bauh. In monte Vallesiæ prope Gletzsherbergk.» *Artemisia mutellina* Vill. (Studien, p. 55.)

VII(1)64. »Absynthium alpinum candidum humile Bauh. In monte Gletzsherbergk dicto Vallesiæ. Gletzsher en(im) appellant ibi glaciem. quasi mons glacialis.» *Artemisia glacialis* L. (Studien, p. 56.)

VII(1)65. »Absynthium alpinum umbelliferum latifolium Bauh. Absynthium album Tab. Weisser Wermuth. In alpibus Austriæ, Styriæ, Carinthiæ &c.» *Achillea Clavennae* L. (Studien, p. 56).

VII(1)66. »Absynthium montanum Chamæmeli flore Bauh. Absynthium montanum Abrotani fæminæ flore Columnæ. In GalloProvinciæ montibus.» *Anthemis montana* L.

VII(1)67. »Millefolium maximum umbella alba Bauh. Sideritis Herculea appellabatur mihi Parisiis. Parisiis in horto du Monsieur Gonu.» Scheint mir *Achillea millefolium* L. zu sein (nicht tanacetifolia All.).

VII(1)68. »Millefolium vulgare album Bauh. Schaffsgarbe. In Germania, Gallia, Italia, Dania.» *Achillea millefolium* L.

VII(1)69. »Millefolium purpureum maius Bauh. Basileæ in hortis, uti et Florentiæ.» D:o.

VII(1)70. »Millefolium vulgare purpureum minus Bauh. In Misnia &c.» D:o.

VII(1)71. »Millefolium incanum Creticum Bauh. Florentiæ in horto magni Ducis.» *Achillea cretica* L.

VII(1)72. »Millefolium tomentosum luteum Bauh. Helichrysum Italicum Matth. In Gallia Narbonensi et Vallesia sponte.» *Achillea tomentosa* L.

VII(1)73. »Millefolium aquaticum flosculis ad foliorum nodos Bauh. Lipsiæ et in Vallesia.» *Myriophyllum verticillatum* L.

VII(1)74. »Millefolium aquaticum seu Viola aquatica caule nudo Bauh. In Lusatia.» Steril.

VII(1)75. »Millefolium aquaticum Equisetifolium caule nudo Bauh. Wasserveyel, Wasserfenchel. In Lusatia, Dania.» *Hottonia palustris* L.

VII(1)76. »Millefolium aquaticum foliis Abrotani, Ranunculi flore et capitulo Bauh. In Lusatia, Misnia &c.» *Batrachium aquatile* (L.) Dum.

VII(1)77. »Millefolium aquaticum foliis Fæniculi, ranunculi flore et capitulo Bauh. In Gallia.» *Batrachium fluitans* (Lam.) Wimm.

VII(1)78. »Simile præcedenti. Lipsiæ.» Steril.

VII(1)post 78. »An hoc sit potius Millefolium aquat. foliis Fæniculi Bauh. Allatum Rostochio.» *Potamogeton pectinatus* L.

VII(1)79. »Millefolium aquaticum pennatum spicatum Bauh. Figura est in prodromo. Lipsiæ et Ingolstadii et in Seelandia. Hoc in spica sub verticillis caret foliolis, quibus Myriophyllum aquaticum minus Clusti donatur.» *Myriophyllum spicatum* L.

VII(1)80. »Millefolium aquaticum cornutum maius Bauh. Exstat figura in Prodromo. Lipsiæ in fossis urbis, et Basileæ.» *Ceratophyllum demersum* L.

VII(1)post 80. »Millefolium aquaticum cornutum minus Bauh. Venit Rostochio.» *Batrachium divaricatum* (Schrank) Wimm.

VII(1)81. »Millefolium aquaticum lenticulatum Bauh. Fæniculum aquaticum galericulatum Monspelii. Item in Valle Augusta et in Bohemia, Dania.» *Utricularia vulgaris* L.

VII(1)82. »Stellaria aquatica Lobelii Bauh. Lipsiæ &c.» *Callitriche vernalis* Kütz. und *stagnalis* Scop.

VII(1)83. »Consolida regalis hortensis flore majore et simplici Bauh. gross blauwer Rittersporn. In hortis Misniæ. Daniæ.» *Delphinium Ajacis* L.

VII(1)post 83. »Consolida regalis hortensis flore majore et simplici, sed incarnato. gross leibfarben Rittersporn. In hortis Misniæ.» D:o.

VII(1)84. »Consolida regalis hortensis flore minore Bauh. Flos est purpureoluteus. In hortis Misniæ, Daniæ &c.» D:o.

VII(1)85. »Consolida regalis hortensis flore minore incarnato. In hortis Lusatiæ, Misniæ &c.» D:o.

VII(1)86. »Consolida regalis hortensis flore minore albo. In hortis Misniæ.» D:o.

VII(1)87. »Consolida regalis hortensis degener vel cinerei coloris, aut potius virescentis. Lipsiæ in horto Deurlingi.» D:o, monströs.

VII(1)88. »Consolida regalis flore majore et multiplici Bauh. Delphinium elatius pleno flore Clus. gefüllter Rittersporn. Basileæ in hortis.» Dieselbe Art, fl. pleno.

VII(1)89. »Consolida regalis arvensis Bauh. Wilder Rittersporn. In Misnia, Bohemia, Seelandia.» *Delphinium consolida* L.

VII(1)90. »Consolida regalis arvensis flore carneo. In hortis Misniæ.» *Delphinium Ajacis* L.

VII(1)91. »Consolida regalis latifolia parvo flore Bauh. Pingitur in Prodromo. Basileæ communicavit Bauhinus.» Schlechtes Exemplar, vermutlich *Delphinium peregrinum* L.

VII(1)92. »Fumaria officinarum et Dioscoridis Bauh. Erdtrauch. Feldtrautte. In Germania, Gallia, Dania &c.» *Fumaria officinalis* L.

VII(1)93. »Fumaria foliis tenuissimis floribus albis, cuius meminit Bauhinus sub vulgari. Monspelii.» *Fumaria parviflora* Lam.

VII(1)94. »Fumaria viticulis et capreolis plantis vicinis adhærens Bauh. Prope Olbyam Galliæ Narbonens.» *Fumaria capreolata* L.

VII(1)95. »Fumaria minor tenuifolia Bauh. Capnos tenuifolia Lob. kleiner Erdrauch. Lipsiæ in hortis. In Gallia Narbonens. sponte.» *Fumaria spicata* L.

VII(1)96. »Fumaria minor folio oblongo capillaceo Bauh. Basileæ donavit Bauhinus.» D:o.

VII(1)97. »Fumaria lutea Bauh. Corydalis Matth. gelber Erdrauch. In Italia sponte. Lipsiæ in horto Medico. et inter Mediolanum et Cedelag(?). 16 Maii Ao 1616 (?).» *Fumaria lutea* L.

VII(1)98. »Fumaria flore albo major. An Fumaria claviculis donata Bauh? Florentiæ sponte.» *Fumaria capreolata* L.

VII(1)99. »Fumaria bulbosa radice cava major Bauh. Holwurtz. In sylvis Misniæ. Daniæ &c.» *Corydalis cava* (L.) Schw. & K.

VII(1)100. »Fumaria bulbosa major albo flore. Iisdem cum purpurea locis.» D:o.

VII(1)101. »Fumaria bulbosa radice non cava major Bauh. Nota folia laciniata inter flores, q(ui)bus distinguitur a vulgari, observante Bauhino. In Misnia, Helvetia.» *Corydalis laxa* Fr.

VII(1)102. »Fumaria bulbosa, radice non cava minor Bauh. Fabacea radice Capnos altera Lob. Klein Holwurtz. Erd Mockeern(?). Hahnensporn. In Lusatia, Misnia, Fionia.» *Corydalis intermedia* (L.) P. M. E.

VII(1)103. »Chelidonium maius vulgare Bauh. Schellkrautt. In Germania, Dania &c.» *Chelidonium majus* L.

VII(1)104. »Chelidonium maius foliis quernis. Figura e(st) in Prodromo. Monspelii in horto Regia. In Bohemia sponte.» D:o, var. *laciniatum* (Mill.).

VII(1)105. »Aquilegia sylvestris Bauh. Flos est coloris punicei. Wildt Ackeley. Non procul Lucerna Helvetiæ.» *Aquilegia vulgaris* L.

VII(1)106. »Aquilegia hortensis simplex Bauh. Ageley. In hortis passim.» D:o.

VII(1)107. »Aquilegia hortensis simplex flore albo. weiss Agley. In Lusatiæ hortis &c.» D:o.

VII(1)108. »Aquilegia montana magno flore Bauh. In altissimo monte prope thermas Fabarias (Pfeffersbade) Helvetiorum.» *Aquilegia alpina* L. (Studien p. 56, wo ich unrichtig »Pfefferblatt» geschrieben habe).

VII(1)109. »Apuilegia montana parvo flore Bauh. In horto Dei dicto Galliæ Narbonensis.» *Aquilegia vulgaris* L.

VII(1)110. Aquilegia hortensis multiplex flore magno Bauh. gefüllt Agley. Lipsiæ in hortis &c.» D:o, fl. pleno.

VII(1)111. »Aquilegia multiplex albo flore. In hortis Misniæ, Daniæ &c.» D:o.

VII(1)112. »Aquilegia multiplex carnea. In hortis Misniæ &c.» D:o.

VII(1)113. »Aquilegia hortensis multiplex flore parvo Bauh. In hortis Misniæ.» D:o.

VII(1)114. »Aquilegia flore roseo multiplici Bauh. Basileæ in hortis. et Lipsiæ, et Soræ.» D:o, f. stellata, fl. pleno.

VII(1)115. »Aquilegia rosea flore incarnato. Basileæ in hortis &c.» Ähnliche Form derselben Art.

VII(1)116. »Aquilegia rosea rubro flore. Basileæ in hort.» D:o.

VII(1)117. »Aquilegia degener virescens Bauh. Basileæ in hort.» Monströse, proliferierende Form derselben Art.

VII(1)118. »Nigella arvensis cornuta Bauh. Melanthium agreste alterum Tab. Wildt

Nardenkrautt. Schwartzkümmel. Ingolstadii, Basileæ, et in Bohemia.» *Nigella arvensis* L.

VII(1)119. »Nigella arvensis flore albo. Ingolstadii.» *Nigella arvensis* L. (Studien, p. 56.)

VII(1)120. »Nigella latifolia flore majore simplici cæruleo Bauh. Basileæ et Annæbergæ in hortis.» Das Exemplar fehlt.

VII(1)121. »Nigella angustifolia flore majore simplici cæruleo Bauh. Melanthium Damascenum Dod. Damascener Kümmel. Lipsiæ et alibi in hortis.» *Nigella damascena* L.

VII(1)122. »Nigella flore majore pleno cæruleo Bauh. Melanthium Damascenum pleno flore Clusii. Lipsiæ in hortis.» D:o, fl. pleno.

VII(1)123. »Nigella flore minore simplici candido Bauh. Melanthium sativum Tab. Zam Nardensamen. Lipsiæ in hortis.» *Nigella sativa* L.

VII(1)124. »Nigella flore minore pleno et albo Bauh. Nigella citrina vulgo vocata, flore albo multiplici Lob. in append. Lipsiæ.» D:o, fl. pleno.

VII(2)1. »Cuminum semine longiore Bauh. Cuminum sativum Matth. Lipsiæ in horto.» *Cuminum cyminum* L.

VII(2)2. »Fæniculum vulgare Germanicum Bauh. Fenchel. In hortis Lusatiæ, Misniæ &c.» *Foeniculum officinale* All.

VII(2)3. »Fæniculum sylvestre Bauh. Wilder Fenchel. Florentiæ.» *Petroselinum segetum* (L.) Koch.

VII(2)4. »Anethum hortense Bauh. Dille. In hortis.» *Anethum graveolens* L.

VII(2)5. »Meum foliis anethi Bauh. Beerwurtz. In montibus Bohemiæ, Austriæ, et Horto Dei dicto.» *Meum athamanticum* Jacq.

VII(2)6. »Meum alpinum umbella purpurascente Bauh. Mutellina Camer. In Carinthia et Helvetia.» *Meum Mutellina* (L.) Gärtn.

VII(2)7. »Pyrethrum flore Bellidis Bauh. Pyrethrum officinarum Lob. Bertram. Zahnwurtz. Florentiæ et Lipsiæ in horto.» Ein *Anacyclus*, vielleicht A. pyrethrum (L.) DC.

VII(2)8. »An Pyrethrum umbelliferum Bauh? In Rhætia inter Disentis et Gothardum. Cum figura Panacis Asclepii Apuli Columnæ convenit: sed tribuit illi flores luteos, cum hi sint albi.» *Laserpitium panax* Gouan.

VII(2)9. »Ferula fæmina Plinii Bauh. Monspelii in horto Regio. et Florentiæ in horto Magni Ducis.» Ein Blatt, wahrscheinlich von *Ferula communis* L.

VII(2)10. »Ferulago latiore folio Bauh. Ferula galbanifera Lob. Accepi a parente.» *Ferula ferulago* L.

VII(2)11. »Videtur eadem cum præcedenti.» Wahrscheinlich dieselbe Art.

VII(2)12. »Præcedenti affinis. Basileæ in horto Heinzmanni.» Ein Blatt, vielleicht einer Ferula.

VII(2)13. »Ferulago tenuiore folio Bauh. Monspelii in horto Regio.» Wie vorige.

VII(2)post 13. »Haec est tenuissimo folio. Ex horto Leydensi.» Nur ein Blatt.

VII(2)14. »An Thapsia maxima latissimo folio Bauh. An potius Thapsia latifolia Eiusdem? Monspelii vocabatur Thapsia montis Seti. In Seto vel Ceto prope Monspelium, et alibi in GalloProvincia.» *Thapsia villosa* L.

VII(2)post 14. »An Thapsia foliis Libanotidis Bauh. Monspelii in horto Regio.» Nur ein Blatt.

VII(2)15. »An Thapsia, an Ferula? Florentiæ in hort.» Nur ein Blatt.

VII(2)16. »Thapsia Fæniculi foliis Bauh. Thapsia angustifolia Tab. Florentiæ in hort.» *Athamanta Matthioli* Wulf.

VII(2)17. »Thapsia Carotæ folio Bauh. Thapsia vulgaris Tab. Monspelii in horto Regio. In Pyrenæis sponte.» Scheint ein Blatt von *Ligusticum ferulaceum* All. zu sein.

VII(2)18. »Estne eadem cum præcedenti? Romæ in thermis Diocletianis.» Nur ein Blatt.

VII(2)19. »An sit Thapsia, an Peucedanum? Florentiæ in hort.» Ebenso.

VII(2)20. »Peucedanum maius Italicum Bauh. grosser Seuwfenchel. Basileæ in hortis, Monspelii in horto Regio.» Scheint ein Blatt von *Peucedanum officinale* L. zu sein.

VII(2)21. »Peucedanum Germanicum Bauh. Haarstrang, Seuwfenchel. Ingolstadii sponte.» *Peucedanum officinale* L.

VII(2)22. »Daucus foliis Fæniculi tenuissimis Bauh. Daucus Cretensis Lob. Candisch Möhrenkümmel. In GalloProvincia.» *Athamanta cretensis* L.

VII(2)23. »Daucus Creticus verus. Parisiis in horto Robini, qui ita appellabat.» Zwei verschiedene Blätter.

VII(2)24. »Daucus alpinus multifido longoque folio, sive montanus umbella candida Bauh. In montibus Helveticis et Austriacis.» *Athamanta cretensis* L.

VII(2)25. »Idem Daucus montanus, sed incanior. Ex horto Dei dicto.» D:o.

VII(2)26. »An Daucus montanus multifido brevique folio Bauh. Saxifraga Pannonica Clus. A parente.» Scheint *Seseli glaucum* L. zu sein.

VII(2)27. »Præcedenti similis. An Saxifraga Anglorum Lob? A parente.» Unentwickelt, nicht bestimmbar.

VII(2)(27 bis). Jungermann: »Daucus quidam Oenanthen Cicutæ facie succo uiroso crocato Lobelii referens. Polygonum maritimum quorundam eidem.»

Burser: »Propria manu ista adscripsit Clariss. Dn. D. Ludovicus Iungermannus tunc temporis Lipsiæ. In plantis paternis.» Nur ein Blatt.

VII(2)28. »An Daucus montanus multifido folio Selini semine Bauh? Selinum montanum pumilum Clus? Prope Herbipolim.» *Trinia glauca* (L.) Dum.

VII(2)29. »Estne idem cum præcedenti? Monspelii.» D:o.

VII(2)30. »Daucus montanus apii folio Major Bauh. Libanotis Theophrasti nigra Tab. Schwartz Hirschwurtz. In Thuringia, Helvetia, Austria, Misnia.» *Peucedanum cervaria* (L.) Cusson.

VII(2)31. »An Daucus montanus apiifolio minor Bauh? Pingit Bauh. in Prodromo. Prope Cremsam Austriæ.» Dürfte *Libanotis sibirica* (L.) Koch sein.

VII(2)32. »Daucus montanus apiifolio albicans Bauh. Nam Seseli Peloponense Senensium appellabat Iungermannus. In Bavaria, Thuringia.» *Libanotis montana* Cr.

VII(2)33. »Affine præcedenti. Nisi sit Oreoselinum. In monte Wasserfall Helvetico, et in GalloProvincia non longe Massilia in montibus.» D:o.

VII(2)34. »Daucus montanus apii folio flore luteo Bauh. Prope Badenam Austriæ inferioris.» *Peucedanum alsaticum* L. (Studien, p. 56.)

VII(2)35. »Daucus pratensis millefolii palustris folio Bauh. In Pyrenæis. Habet radices Filipendulæ mont.» *Carum verticillatum* (L.) Koch.

VII(2)36. »Daucus Alsaticus Bauh. in Prodr. ubi pingit. Non procul Argentina in paludibus.» Nur ein Blatt.

VII(2)37. »Pastinaca tenuifolia sylvestris Dioscoridis, vel Daucus Officinarum Bauh. Pastinaca erratica Tab. Vogelsnest, Wild Pastenach. In Misnia, Dania &c.» *Daucus carota* L.

VII(2)38. »Pastinaca syl. hirsuta, echinato fructu Bauh. Daucus λασιόκαυλος Thalii. In Misnia.» Defekt, wahrscheinlich dieselbe Art.

VII(2)39. »Pastinaca tenuifolia sativa, radice lutea vel alba Bauh. Pastinaca sativa Tab. Möhren, gelbe Rüben. In hortis passim.» Dieselbe Art.

VII(2)40. »Pastinaca tenuifolia sativa, radice atrorubente Bauh. Rothe möhren. In hortis Italiæ, Germaniæ, Daniæ.» D:o.

VII(2)41. »An Gingidium folio Fæniculi Bauh? prope Narbonam GalloProvinciæ sponte.» *Ammi visnaga* (L.) Lam.

VII(2)42. »Gingidium umbella longa Bauh. Visnaga Matth. Lob. Syrisch Körffelkrautt. Lipsiæ in hort.» D:o.

VII(2)43. »Gingidium foliis Chærifolii Bauh. Gingidium Matth. Lipsiæ in hort.» *Daucus gingidium* L.

VII(2)44. »Chærophyllum sativum Bauh. Cerefolium Matth. Körffel. In hortis Lusatiæ, Misniæ, Daniæ.» *Anthriscus cerefolium* (L.) Hoffm.

VII(2)45. »Chærophyllum sylvestre Bauh. Cerefolium sylvestre, Onoselinum Tab. Wilder Körffel. In Lusatia.» *Chaerophyllum temulum* L.

VII(2)46. »Cerefolium semestrale vocabat D. Lud. Iungermannus. Lipsiæ sponte et in Lusatia.» *Anthriscus vulgaris* Pers.

VII(2)47. »Chærophyllo nonnihil similis Bauh. Perelepier Anglorum Lob. Scandix minor Tab. Kleiner Nadelkörffel. In Lusatia, Dania, Bohemia &c.» *Alchemilla arvensis* (L.) Scop.

VII(2)48. »Scandix semine rostrato vulgaris Bauh. Pecten Matth. Lob. Nadelkörffel. Monspelii, Florentiæ, Basileæ &c.» *Scandix pecten Veneris* L.

VII(2)49. »Scandix Cretica minor Bauh. Anthriscus Plinii Clus. Figura e(st) in Prodromo. Basileæ et Pisis in hort.» *Scandix australis* L.

VII(2)50. »Eadem cum præcedenti, prout primum oritur et q(ui)dem sponte. In monte Lupi p(ro)pe Monspelium.» Wahrscheinlich Primärblätter derselben.

VII(2)51. »Caucalis maxima Sphondilii aculeato semine Bauh. Caucalis major Clus. grosser Klettenkörffel. Ad Castellum novum non longe Monspelio, et in Thuringia.» *Tordylium maximum* L.

VII(2)52. »Caucalis lato Apii folio Bauh. Caucalis Matth. Caucalis flore rubeo folio latiore Lob. In GalloProvinciæ arvis.» *Turgenia latifolia* (L.) Hoffm.

VII(2)53. »Caucalidis species videtur. A parente.» *Tordylium apulum* L.

VII(2)54. »Caucalis arvensis echinato magno flore Bauh. Klettenkörffel. Ackerkletten. In Saxonia.» *Orlaya grandiflora* (L.) Hoffm.

VII(2)55. »Caucalis arvensis echinato parvo flore et fructu Bauh. Basileæ.» *Caucalis daucoides* L.

VII(2)56. »Caucalis semine aspero flosculis rubentibus Bauh. Daucoides minor Cordi. Figura e(st) in Prodromo. In Lusatia, Helvetia.» *Torilis anthriscus* L.

VII(2)57. »Videtur eadem cum præcedenti. Ex Toupinambault attulit pharmacopæus Parisiensis.» Eine *Osmorrhiza*, wahrscheinlich *O. Claytoni* (Mchx) Clarke.

VII(2)58. »Caucalis nodosa echinato semine Bauh. Parisiis et Florentiæ.» *Torilis nodosa* (L.) Gärtn.

VII(2)59. »Caucalis pumila maritima Bauh. Ad littus maris prope Insulas Stæchadas in sabulo.» *Orlaya maritima* (L.) Koch = Caucalis pumila L.

VII(2)60. »An Caucalis folio Peucedani Bauh? Caucalis Anglica Tab? sive Fæniculum petræum Anglorum, nam vera est magis lutea (?). In summitate pontis Gardæ, Galliæ Narbonensis.» Ein *Seseli*, vielleicht montanum L.

VII(2)61. »Præcedenti cognata. Monspelii in saxosis.» Wie vorige.

VII(2)62. »Et hæc præcedenti affinis est. Monspelii.» Auch ein *Seseli*, vielleicht montanum L.

VII(2)63. »Neque hæc absimilis est p(ræ)cedenti.» Ist vielleicht *Seseli nanum* Duf.

VII(2)64. »Apium hortense seu Petroselinum vulgo Bauh. Petersilie. In hortis.» *Petroselinum sativum* Hoffm.

VII(2)post 64. »Pro Petroselino Cretico Bauh. accepi ex horto Lugdunensi.» Dürfte *Apium graveolens* L. sein.

VII(2)65. »An Apium hortense latifolium Bauh? Vide figuram in Prodromo. Florentiæ in hortis. Sedano (?).» Blätter von *Apium graveolens* L.

VII(2)66. »Apium montanum folio ampliore Bauh. Oreoselinum sive Petroselinum Lob. Vielgutta. Brockeppich (?). Vielgutt. In Lusatia, et non procul a S. Bernhardo Helvetiæ.» *Peucedanum oreoselinum* (L.) Moench.

VII(2)67. »Apium sylvestre, lacteo succo turgens Bauh. Thysselinum Plinii Lob. Ölstrutz, Erlenkummich. In Misnia, Bohemia, Dania.» *Peucedanum palustre* (L.) Moench.

VII(2)68. »An Apium peregrinum foliis subrotundis Bauh. Vide figuram in Prodromo. In GalloProvincia.» Nur Grundblätter, vielleicht von *Pimpinella peregrina* L.

VII(2)(68 bis). »Semen huius ex horto Leidensi accepi, nomine Petroselini Macedonici. Folia inferiora, h. e. primum ex semine orientia, non erant dissimilla præcedenti. In horto meo Sorano.» Schlechtes, kaum bestimmbares Exemplar.

VII(2)69. »Apium palustre, et Apium officinarum Bauh. Eleoselinum sive Paludapium Lob. Wasser Eppich. In Lusatia, Dania.» *Apium graveolens* L.

VII(2)70. »Apii palustris folia inferiora. Monspelii in palustri loco.» Blätter derselben Art.

VII(2)71. »Apium Macedonicum Bauh. Petroselinum Macedonicum Matth. Lipsiæ, Florentiæ, Parisiis. Monspelii in hortis.» *Athamanta macedonica* (L.) Spreng.

VII(2)72. »Hipposelinum Theophrasti vel Smyrnium Dioscordidis Bauh. Hipposelinum Apium Hispanicum Tab. Rosspeterlein. Monspelii et Florentiæ.» *Smyrnium olusatrum* L.

VII(2)73. »Smyrnium peregrinum rotundo folio Bauh. Smyrnium Creticum Matth. Myrrhenkrautt. Parisiis in horto Academico.» *Smyrnium perfoliatum* L.

VII(2)74. »Sison, quod Amomum Officinis nostris Bauh. Petroselinum Macedonicum Fuchsii. Parisiis sponte.» *Petroselinum segetum* (L.) Koch.

VII(2)75. »Sion sive Apium palustre foliis oblongis Bauh. Sion sive Laver Lob. In Misnia, Dania &c.» *Sium angustifolium* L.

VII(2)76. »Sium latifolium Bauh. Sium medium, Pastinaca palustris Tab. Wasser Pastinach. Lipsiæ.» *Sium latifolium* L.

VII(2)77. »Sium Erucæ folio Bauh. Sium alterum Olusatri facie Lob. Lipsiæ et Basileæ. et in Seelandia.» *Cicuta virosa* L.

VOLUMEN VIII.

Horti sicci seu stirpivm studio et labore D. Ioachimi Burseri Camentio-Lusati, in Regia Nobilium Academia Sorana Medici et profess. publici per diversa regiones et loca collectarum, et iuxta seriem Pinacis Bauhiniani digestarum Volumen VIII. continens Sectionem V. et VI. libri quarti illius Pinacis.

VIII.1. »Pastinaca sativa latifolia Bauh. Elaphoboscum sativum Tab. Zam Pastenach. In hortis Misniæ, Bohemiæ, Bavariæ, Helvetiæ, Daniæ &c.» *Pastinaca sativa* L.

VIII.2. »Pastinaca sylvestris latifolia Bauh. Elaphoboscum erraticum Tab. Wildt Pastinack. In Bavaria et Bohemia.» D:o.

VIII.3. »Sisarum Germanicum Bauh. Zuckerwurtz. Garten Rapuntzel. In hortis Lusatiæ et Misniæ et Daniæ.» *Sium sisarum* L.

VIII.4. »Angelica sativa Bauh. Angelick. Heilig geisteswurtz. In hortis Lusatiæ, Misniæ, Bohemiæ &c.» *Angelica archangelica* L.

VIII.post 4. »Angelicæ Aquitanicæ nomine accepi ex horto Leidensi. Forte Agunticæ(?) debuisset scribi.» Blätter von 2 Arten, die eine scheint Aegopodium zu sein.

VIII.5. »Angelica sylvestris minor sive erratica Bauh. Podagraria Lob. Aegopodium, Herba Gerhardi Tab. Giersich. In Lusatia, Misnia, Dania.» *Aegopodium podagraria* L.

VIII.6. »Angelica sylvestris hirsuta inodora Bauh. Herba Podagrariæ cognata, Ioh. Franco. In Lusatia, Misnia.» *Chaerophyllum aromaticum* L. (Studien, p. 57.)

VIII.7. »Eadem cum præcedente. In Misnia.» Scheint *Angelica silvestris* L. zu sein. (Studien, p. 57.)

VIII.8. »Affinis præcedenti. Ex Toupinambault sive Brasilia attulit pharmacopæus Parisiensis.» *Aralia nudicaulis* L. (Studien, p. 57.)

VIII.9. »Angelica sylvestris montana Bauh. In Pyrenæis.» Nur ein Blatt, vielleicht von *Angelica Razulii* Gouan.

VIII.10. »Angelica aquatica Bauh. Angelica minor aquatica Tab. Wasser Angelicke. In Lusatia, Bohemia &c.» Ein kleines Exemplar von *Angelica silvestris* L.

VIII.11. »Imperatoria major Bauh. Meisterwurtz. In hortis Lusatiæ, Misniæ, Daniæ &c. In Draunstein monte Austriæ superioris sponte.» *Imperatoria ostruthium* L.

VIII.12. »Laserpitium Gallicum Bauh. In GalloProvincia sponte.» *Laserpitium gallicum* L.

VIII.13. »Videtur idem cum præcedente. Nisi sit Daucus montanus. Non procul Massilia in montibus.» Ein Blatt, wahrscheinlich der vorigen Art.

VIII.14. »An Panax Pastinacæ folio Bauh. In Rhætia prope Disentis ad humanam proceritatem excrescebat. Item in Valle umbrosa non longe Florentia ubi a Monacho PseudoCostus appellabatur.» *Angelica verticillaris* L. (Studien, p. 57.)

VIII.15. »Præcedenti affinis. Basileæ dedit Bauhinus, sibi a Doldio missam, nomine Ferulaceæ c(uius)dam gummiferæ.» Ein Blatt, wie es scheint, von derselben Art.

VIII.16. »Panax Costinum Bauh. Pseudocostus Matth. Monspelii sponte, et in Italia.» *Opoponax chironium* Koch.

VIII.17. »An Panax Sphondylii folio sive Heracleum Bauh? An potius Sphondylium glabrum eiusd(em)? In alpibus Austriæ.» Ein *Heracleum*, nur ein Blatt ist übrig.

VIII.18. »An hoc potius sit Panax Sphondylii folio Bauh. In Italia.» Grosses Blatt eines *Heracleum*.

VIII.19. »Sphondylium vulgare hirsutum Bauh. Deutsch Beerenklauw. In Lusatia, Bohemia, Helvetia, Dania.» Beschädigt, wahrscheinlich *Heracleum sphondylium* L.

VIII.20. »Sphondylium hirsutum foliis angustioribus Bauh. Basileæ in prato.» *Heracleum sibiricum* L. var. *angustifolium* (Jacq.).

VIII.21. »Sphondylium alpinum parvum Bauh. In alpibus Austriæ.» *Heracleum austriacum* L. (Studien, p. 57.)

VIII.22. »Sphondylium alpinum glabrum Bauh. Figura e(st) in Prodromo. In alpibus Helveticis.» *Heracleum alpinus* L.

VIII.post 22. »Profundius laciniatum est quam præcedens. In Valle umbrosa, h. e. montibus aliquot milliaribus ab urbe Florentina dissitis (?).» Blatt eines Heracleum.

VIII.23. »Videtur idem cum præcedente, licet nonnihil hirsutum. In Pyrenæis.» Es dürfte 2 Blätter von *Heracleum pyrenaicum* Lam. sein.

VIII.24. »Libanotis latifolia major Bauh. Libanoyis Theophrasti alba Tab. Cervaria alba. Weisse Hirtzwurtz. In Thuringia &c.» *Laserpitium latifolium* L.

VIII.25. »Folia præcedentis, sed quæ ob aquam salsam in loco natali continenter effundi solitam tantopere excrevit. In monte qui imminet Halæ, oppidulo Austriæ superioris.» Grosse Blättchen derselben Art.

VIII.26. »Libanotis latifolia altera sive vulgatior Bauh. Basileæ dedit Bauhinus, cum no(min)e.» Dieselbe Art.

VIII.27. »Libanotis latifolia Aquilegiæ folio Bauh. Seseli Aethyopicum alterum Cam. in Epit. Lipsiæ in horto Medico.» Blatt von *Siler trilobum* (L.) Cr.

VIII.28. »Idem cum præcedente videtur. Parisiis in horto Academico.» *Siler trilobum* (L.) Cr.

VIII.29. »Ligusticum vulgare Bauh. Liebstückel. In hortis Lusatiæ, Misniæ &c.» *Levisticum officinale* Koch.

VIII.30. »Libanotis Ferulæ folio, semine anguloso Bauh. Cachrys verior, Libanotis Galeni Lob. Non procul Monspelio in monte.» *Cachrys laevigata* Lam.

VIII.31. »Cachrys Aegyptiaca. Sic nominavit Reuchenius, Clivo Vesaliensis, qui dedit Basileæ, allatam Patavio.» Nur ein Blattfragment.

VIII.32. »Libanotidi secundæ similis Bauh. Panax Asclepium Matth. Florentiæ in horto Magni Ducis.» Ein Blatt, wahrscheinlich von *Elaeoselinum asclepium* (L.) Bert.

VIII.33. »Libanotis tenuifolia Germanica Bauh. Libanotis ναρθικοειδης Thalii. Lipsiæ, et in Ungaria.» *Seseli annuum* L. (Studien, p. 57.)

VIII.34. »Videtur eadem cum præcedenti, q(uam)vis hæc flores habeat candidiores, illa purpurascentes. Radix a. utrobique fusca e(st). In Austria inferiori.» D:o. (Studien, p. 57.)

VIII.35. »Cuminum pratense, Carvi officinar(um) Bauh. Carum Matth. Wisenkümmel. Dänisch Kümmel. In Lusatia, Bohemia, Dania &c.» *Carum carvi* L.

VIII.36. »Carvi alpinum Bauh. In Pyrenæis.» Dürfte *Selinum pyrenaeum* (L.) Gouan sein. (Studien, p. 58.)

VIII.37. »Carvifolia Bauh. Basileæ.» *Selinum carvifolia* L.

VIII.38. »Coriandrum maius Bauh. Coriander. In hortis Misniæ, Daniæ, &c.» *Coriandrum sativum* L.

VIII.39. »Coriandrum minus testiculatum Bauh. Coriandrum alterum minus odorum Lob. Florentiæ inter segetes.» *Bifora testiculata* (L.) DC.

VIII.40. »Anisum herbariis Bauh. Aniss. In hortis »(A)ustriæ, Bohemiæ, Dania.» *Pimpinella anisum* L.

VIII.41. »Ammi maius Bauh. Ammioselinum, Bubonium Hippocratis Tab. Ammeypeterlein. Florentiæ et Parisiis.» *Ammi majus* L.

VIII.42. »Videtur idem cum præcedente. Non procul Narbona Galliæ.» D:o.

VIII.43. »Ammi alterum semine apii Bauh. Ammi Creticum aromaticum Lob. Dedit mihi Bauhinus.» *Ammi copticum* L.

VIII.44. »Convenit cum figura Ammios Cretici apud Lobel. Parisiis in horto pulverum (au iardin des poudres).» Nur ein Blatt.

VIII.45. »An Ammi parvum foliis Fæniculi Bauh? Ammi perpusillum Lob. Monspelii.» Dürfte *Seseli elatum* L. sein (S. Gouani Koch in Reichb. Ic. Fl. Germ. Germ. XXI: 63).

VIII.46. »Pimpinella saxifraga major, umbella candida Bauh. Tragoselinum maius Tab. grosse Bibenell. In Lusatia, Helvetia, Gallia &c.» Ein Blatt von *Pimpinella magna* L.

VIII.47. »Pimpinella saxifraga major, umbella rubente Bauh. In alpibus Austriæ.» *Pimpinella saxifraga* L.

VIII.48. »Pimpinella saxifraga minor Bauh. kleine Bibenell. In Lusatia, Misnia, Dania &c.» D:o.

VIII.49. »Pimpinella saxifraga minor laciniatis foliis. In Austria.» *Pimpinella saxifraga* L. var. (Studien, p. 58.)

VIII.50. »Pimpinella crispa sive petræa Tabern. In Lusatia &c.» Var. *dissecta*(Retz) derselben Art.

VIII.51. »Pimpinella saxifraga tenuifolia Bauh. Ad lacum Genevensem, unde Bauhino attuli.» Dürfte *Ptychotis saxifraga* (L.) Drude sein (Studien, p. 58).

VIII.52. »Pimpinella Sanguisorba major Bauh. Welsche Bibenell. Herrgottsbärttlin. In Misnia sponte, uti et in Bohemia.» *Sanguisorba officinalis* L.

VIII.53. »Pimpinella Sanguisorba minor Bauh. In Bohemia sponte.» *Sanguisorba minor* Scop.

VIII.54. »Pimpinella Sanguisorba minor, floribus velut in umbellam dispositis. Florentiæ.» *Sanguisorba minor* Scop. (Studien, p. 58.)

VIII.55. »Myrrhis major, vel Cicutaria odorata Bauh. Cerefolium Hispanicum Tab. Spanischer Körffel. Zuckerkrautt. In hortis Lusatiæ, Misniæ &c.» *Myrrhis odorata* (L.) Scop.

VIII.56. »Myrrhis minor Bauh. Myrrhis altera parva Lob. In sylvis montosis Misniæ, Bohemiæ, Galliæ Narbonensis, Helvetiæ &c.» Dürfte *Chaerophyllum aureum* L. sein.

VIII.57. »Myrrhus sylvestris seminibus lævibus Bauh. Pseudomyrrhis Thalii etc. Franco. Kelberkern. In Lusatia, Bohemia, Helvetia, Dania.» *Anthriscus silvestris* (L.) Hoffm.

VIII.58. »Cicuta major Bauh. Schirling. Wutschirling. In Misnia.» *Conium maculatum* L.

VIII.post 58. »Cicuta vera Italica perniosissima. Hoc nomine accepi horto Medico qui est Lugduni Batavorum.» Kaum bestimmbar, vielleicht *Selinum carvifolia* L. (Studien, p. 58.)

VIII.59. »Cicuta minor, petroselino similis Bauh. Cicutaria fatua Lob. ic. gleisse. Inter segetes hortorum passim.» *Aethusa cynapium* L.

VIII.60. »An Cicutaria latifolia fætida Bauh? Seseli Peloponense Matth? An potius Daucus montanus Apii folio albicans Bauh? In horto Dei dicto, Galliæ Narbonensis.» *Molopospermum cicutarium* DC. (Studien, p. 59.)

VIII.61. »An sit eadem cum præcedenti? In Lusatia.» *Pleurospermum austriacum* (L.) Hoffm. (Studien, p. 59.)

VIII.62. »An Cicutaria latifolia tertia Bauh? In Lusatia.» *Conium maculatum* L. (nicht Molopospermum).

VIII.63. »Cicutaria palustris tenuifolia Bauh. Phellandrium Dod. In Lusatia, Bohemia, Dania &c.» *Oenanthe aquatica* (L.) Poir.

VIII.64. »Cicutaria bulbosa Bauh. Myrrhis. Cicutaria Tab. In Austria.» Es dürfte junge Pflanzen von *Chaerophyllum bulbosum* L. sein.

VIII.65. »Cum præcedente videtur eadem. Lipsiæ.» Dürfte *Chaerophyllum bulbosum* L. sein.

VIII.66. »Seseli montanum Cicutæ folio glabrum Bauh. Ligusticum alterum Belgar. Lob. Seseli alpinum Clus. In Sneeberg Austriæ inferioris.» *Pleurospermum austriacum* (L.) Hoffm. (Studien, p. 59.)

VIII.67. »Cum præcedente gerit affinitatem. In Italia.» *Physospermum aquilegiifolium* (All.) Koch. (Studien, p. 59.)

VIII.68. »Seseli Creticum maius Bauh. Tordilion Lob. Lipsiæ in horto Deurlingi.» Ein kleines Stück, wie es scheint, von *Tordylium syriacum* L.

VIII.69. »Seseli Creticum minus Bauh. Florentiæ.» *Tordylium apulum* L.

VIII.70. Seseli Aethiopicum Salicis folio. In monte Ceto prope Monspel. sponte. Florentiæ in hortis.» *Buplerum fruticosum* L.

VIII.71. »Seseli Massiliense Ferulæ folio Bauh. Parisiis in horto du Monsieur Gonu.» Nur ein Blatt.

VIII.72. »Seseli Massiliense Fæniculi folio Bauh. Seseli Massiliense nonnullorum Cam. in Ep. Steinpeterlein. Monspelii sponte.» *Seseli tortuosum* L.

VIII.73. »Seseli pratense, Silaus forte Plinii Bauh. Seseli pratense Monspeliensium Lob. Lipsiæ et Basileæ.» *Silaus flavescens* Bernh.

VIII.74. »Seseli pratense tenuifolium sive Daucus pratensis tenuifolius Bauh. Pastinaca nigra pratensis a Lud. Iungermanno vocabatur. Lipsiæ in pratis.» *Selinum carvifolia* L. Linné zitiert dieses Exemplar in Mantissa II, p. 353.

VIII.75. »Ligusticum, quod Seseli Officinarum Bauh. Siler montanum Officinar. Lob. Welsch liebstückel. In Thuringia et alpibus Austriæ.» *Laserpitium siler* L.

VIII.76. »Idem cum præcedente, licet foliis nonnihil evariet. In GalloProvincia.» D:o.

VIII.77. »An Ligusticum sive Siler montanum angustifolium Bauh? An potius Peucedanum Pannonicum Clus.? Ad fluvium Oenum Austriæ in saxis.» Ein *Seseli*, vielleicht *glaucum* L. oder *austriacum* (Beck) Drude (Studien, p. 59).

VIII.78. »Bulbocastanum maius folio Apii Bauh. Oenanthe I. Matth. Nucula terrestris Lob. Erdt Castanien. Parisiis in arvis.» *Bunium bulbocastanum* L.

VIII.79. »Estne idem cum præcedente? Quamvis hoc p(ro)cumbat, alterum erectum sit. In Pyrenæis.» Ich vermute, dass dies *Conopodium majus* (Gouan) Druce ist.

VIII.80 »Bulbocastanum minus Bauh. In Pyrenæis.» Dies ist gewiss *Conopodium majus* (denudatum Koch). Linné hielt es für Chaerophyllum bulbosum, Mantissa II, p. 356.

VIII.81. »Oenanthe Apii folio Bauh. Oenanthe angustifolia Lob. Monspelii, Parisiis. Wasser Steinbrech.» *Oenanthe globulosa* L.

VIII.82. »An Oenanthe Chærophylli folio Bauh? In Lusatia.» Nur eine Rosette von Grundblättern.

VIII.83. »Oenanthe aquatica Bauh. Filipendula palustris, Ruta palustris Tab. Wasser Rautten. In Lusatia, Bohemia, Dania.» *Oenanthe fistulosa* L.

VIII.84. »Filipendula vulgaris Bauh. Rothe Steinbrech. In Lusatia, Bohemia, Seelandia.» *Ulmaria filipendula* (L.) Kostel.

VIII.85. »Filipendula montana flore Pedicularіæ Bauh. In monte Calcaris seu Horto Dei. In Pyrenæis, et Alpibus Austriæ.» Beschädigt, wahrscheinlich *Pedicularis foliosa* L.

VIII.86. »An Filipendula montana altera Bauh? In Pyrenæis. flore rubro.» Die Blüten sind beschädigt, es ist vielleicht *Pedicularis pyrenaica* Gay.

VIII.87. »An Pedicularis alpina Filicis folio major Bauh. In alpibus Austriæ.» *Pedicularis recutita* L.

VIII.88. »Pedicularis alpina purpurea strigosior, spica oblonga, incana, floribus alternatim et per intervalla positis &c. In Taurero Rastadiensi.» *Pedicularis incarnata* Jacq. (Studien, p. 59.)

VIII.89. »Pedicularis alpina filicis folio minor Bauh. In montibus Helvetiæ et Austriæ.» *Pedicularis verticillata* L.

VIII.90. »Pedicularis pratensis purpurea Bauh. Ruta pedicularia Tab. Leusekrautt. Braun Rodel. In Lusatia, Misnia, Dania.» *Pedicularis silvatica* L.

VIII.91. »Pedicularis pratensis albo flore. In Valle Augusta.» *Pedicularis palustris* L.

VIII.92. »Pedicularis purpurea aquatica, recta et procera. An soli ratione differat a vulgari? Figura Tabernæmontani sub Ruta pedicularia huic valde convenit. In Misnia.» *Pedicularis palustris* L. (Studien, p. 60.)

VIII.93. »Pedicularis pratensis Lutea vel Crista galli Bauh. Hanenkam. Klaffer. Passim.» *Rhinanthus major* Ehrh.

VIII.94. »Crista galli peculiaris, hirsuta, flore viridi pallente, &c. In Pyrenæis.» *Bartsia viscosa* L. (Studien, p. 60.)

VIII.95. »Barba Capræ floribus oblongis Bauh. Drymopogon Tab. Waldt Geissbartt. In Misnia sponte.» *Aruncus silvester* Kostel.

VIII.96. »Barba capræ floribus compactis Bauh. Ulmaria Tab. Geissbartt. In Lusatia, Misnia, Bohemia, Helvetia, Dania.» *Ulmaria palustris* Mnch.

VIII.97. »Valeriana hortensis Bauh. Phu Ponticum Tab. Baldrian. Theriackskrautt. In hortis Lusatiæ, Misniæ, Daniæ.» *Valeriana phu* L.

VIII.98. »Valeriana peregrina purpurea Bauh. Valeriana Indica Clus. Pingitur in Prodromo. Basileæ in hort.» *Fedia cornucopiae* (L.) Gärtn.

VIII.99. »Valeriana peregrina albo flore. Basileæ in hort.» D:o.

VIII.100. »Valeriana sylvestris major Bauh. Katzenwurtz. In Lusatia, Bohemia, Seelandia.» *Valeriana officinalis* L.

VIII.101. »Valeriana syl. major montana Bauh. Ad Kupfferbergen Bohemiæ in monte.» Dieselbe Art, vielleicht ihre Var. *angustifolia* Tsch.

VIII.102 fehlt.

VIII.103. »Valeriana palustris major Bauh. Valeriana media repens Franco. In Lusatia.» *Valeriana sambucifolia* Mik., eine Form mit weit abstehenden Zähnen an den Blättchen.

VIII.104. »Valeriana latifolia maxima Pyrenaica. Forte ad Cacalias referenda, Inter quas nascebatur. In Pyrenæis.» *Valeriana Pyrenaica* L. (Studien, p. 60.)

VIII.105. »Valeriana cærulea Bauh. Valeriana Græca Tab. Grichscher Baldrian. In hortis Misniæ, Helvetiæ, Daniæ.» *Polemonium caeruleum* L.

VIII.106. »Valeriana Græca albo flore. In hortis.» D:o.

VIII.post 106. »Valerianæ Græcæ sanguineis floribus nomine accepi ex horto Medico qui est Lugduni Batavo(ru)m.» Blätter von *Centranthus calcitrapa* (L.) DC. mit Blüten einer Valeriana. (Studien, p. 60.)

VIII.107. »Valeriana palustris minor Bauh. Phu minus Tab. In montibus Misniæ, Bohemiæ &c. item in Seelandia.» *Valeriana dioica* L., mas und femina.

VIII.108. »Valeriana palustris media, parum laciniata Bauh. In Lusatia.» *Valeriana sambucifolia* Mik., eine kleinere Form.

VIII.109. »Valeriana alpina prima Bauh. Pingitur in Prodromo. In monte Wasserfall Helvetior. et Pyrenæis.» *Valeriana tripteris* L.

VIII.110. »Valeriana alpina altera Bauh. In Pyrenæis, qua Hispaniam spectant.» D:o.

VIII.111. »Valeriana alpina Scrophulariæ folio Bauh. Pingitur in Prodromo. In monte Reichenstein Austriæ.» *Valeriana montana* L.

VIII.112. »An Valeriana montana subrotundo folio Bauh? Basileæ dedit Mianus ab Urstisio missam.» Dürfte var. *rotundifolia* derselben Art sein.

VIII.113. »Valeriana alpina minor Bauh. In Pyrenæis.» *Valeriana globulariifolia* Ram. (Studien, p. 60.)

VIII.114. »Valeriana rubra Bauh. Ocimastrum Valerianthon Lob. Roter Baldrian. Massiliæ sponte: alias in hortis.» *Centranthus ruber* (L.) DC.

VIII.115. »Valeriana rubra angustifolia Bauh. In Pyrenæis, et non procul Geneva in monte.» Scheint eine Mittelform zwischen *Centranthus ruber* und *angustifolius* DC. zu sein.

VIII.116. »Valeriana campestris inodora major Bauh. Lactuca agnina Tab. Lämmerlattich. Wildt Rapuntzlichen. In Misnia, Bohemia, Bavaria, Helvetia &c.» *Valerianella* sp., zu jung, nicht genauer bestimmbar.

VIII.117. »Valerianella echinata Bauh. In GalloProvincia.» *Valerianella discoidea* Lois.

VIII.118. »An Vallerianella semine stellato Bauh. Valeriana minima annua. Monspelii et in mæniis Valentiæ Gallor.» *Centranthus calcitrapa* (L.) DC.

VIII.119. a) »Nardus montana radice olivari Bauh. In GalloProvincia sponte.» b) »Nardus montana radice oblonga Bauh. In GalloProvincia.» Beide sind *Valeriana tuberosa* L. (Studien, p. 61.)

VIII.120. »Nardus Celtica Dioscoridis Bauh. A parente.» Vegetative Individuen von *Valeriana celtica* L.

VIII.121. »Nardus Celtica altera Bauh. In monte Reichenstein prope oppidum Eisenertz Austriæ.» Blühende Individuen derselben Art.

VIII.122. »Nardo Celticæ similis inodora Bauh. Non video quid differat a Valeriana alpina II. sive saxatili Clus. In alpibus Austriæ sup(er)ioris, Styriæ &c.» *Valeriana saxatilis* L. (Sutdien, p. 61.)

VIII.123. »Nardo Celticæ similis alia, seu Valeriana alpina minor floribus rubentibus in spicam dispositis, foliis infimis Nardo Celticæ similibus, pediculum habentibus, aliis vero laciniatis, binis inter se oppositis lata basi cauliculum amplexantibus &c. In Sneeberg monte Austriæ inferioris.» *Valeriana elongata* Jacq. (Studien, p. 61.)

VOLUMEN IX.

»Horti sicci seu stirpivm, studio et labore D. Ioachimi Burseri Camentio-Lusati, in Regia Nobilium Academia Sorana Medici, et Phys. professoris publici, per diversas regiones et loca collectarum, et iuxta seriem Pinacis Bauhiniani digestarum Volumen IX. continens Sectionem 1. 2. 3. libri quinti Pinacis prædicti.»

IX.1. »Solanum officinarum Bauhini. Solanum vulgare Trag. Nachtschatten. In Lusatia, Bohemia, Dania.» *Solanum nigrum* L.

IX.2. »Solanum vulgare, sed laciniis carens. Lipsiæ.» D:o. (Studien, p. 62.)

IX.3. »Solanum vesicarium Bauh. Halicacabon Trago. Judenkirschen. In agro Tyrolensi, et in Bohemia sponte.» *Physalis alkekengi* L.

IX.4. »Solanum vesicarium Indicum Bauh. Basileæ in horto Bauhini.» Eine *Physalis*, nicht angulata L., auch nicht peruviana L.

IX.5. »Solanum Μελανοκερασος Bauh. Belladonna Clus. In Helvetia sponte. quidem(?) et in Italia.» *Atropa belladonna* L.

IX.6. »An Solanum somniferum bacciferum Bauh. An potius idem cum antecedente. A parente.» D:o.

IX.7. »Solanum somniferum verticillatum Bauh. Florentiæ, Monspelii, et Basileæ in hortis.» *Withania somnifera* (L.) Dun.

IX.8. »Solanum fruticosum bacciferum Bauh. Strychnodendron et Amomum Plinii Lob. Lipsiæ et Monspelii in hortis.» *Solanum pseudocapsicum* L.

IX.9. »Solanum quadrifolium Bacciferum Bauh. Herba Paris Matth. Aconitum salutiferum Tab. Einbeer. Wolffsbeer. In Lusatia, Misnia, Bohemia, Seelandia». *Paris quadrifolia* L.

IX.10. »Idem cum præcedente, sed quinque foliis constans. In Muteto Basileensi.» D:o.

IX.11. »Idem cum præcedenti, sed sex folia habens. In Bohemia.» D:o.

IX.12. »Solanum triphyllum Brasilianum Bauh. Ex Gallia nova Lutetiam attulit pharmacopæus quidam.» *Trillium grandiflorum* Salisb. (Studien, p. 62.)

IX.13. »Solanum scandens seu Dulcamara Bauh. In Lusatia, Misnia, Dania &c.» *Solanum dulcamara* L.

IX.14. »Solanum tuberosum esculentum Bauh. In hortis Helvetiæ, Misniæ, Daniæ &c.» *Solanum tuberosum* L.

IX.15. »Solanum racemosum Cerasorum forma Bauh. Basileæ in hortis.» *Solanum lycopersicum* L. var. *cerasiforme* (Dun.).

IX.16. »Solanum pomiferum fructu rotundo striato molli Bauh. Poma amoris Lob. Tab. Liebäpffel. Lipsiæ et alibi in hortis.» *Solanum lycopersicum* L.

IX.17. »Solanum pomiferum fructu striato duro Bauh. Basileæ dedit Mianus.» Wahrscheinlich *Solanum aethiopicum* L. (Studien, p. 62.)

IX.18. »Solanum pomiferum fructu oblongo Bauh. Mala insana, Melanzana Tab. Melantzen. Basileæ et Lipsiæ in hortis.» *Solanum melongena* L.

IX.19. »Est malum insanum, aut fructus Mandragoræ. Florentiæ in horto.» Etikette von anderer Hand: »Hispnice Verongenes(?) coquiter in culinis cum carne bovina instar Brassicæ capitatæ folia; (Zeichen für ergo?) non est, ut actor putat, venenosa herba sed oculis tantum nocet,» Es sind zwei Früchte von *Solanum melongena* L.

In Syst. Veg. ed. XIII, herausg. von Murray 1774, p. 189, steht unter S. sanctum: »Sub S. insano a C. Bauhino habuit Burserus.» Diese Angabe ist aber irrtümlich, die von Bauhin bekommene Pflanze ist die nächst folgende Nr.

IX.20. »Solanum spinosum fructu rotundo Bauh. Pomi Hierochuntici Imperati nomine dedit Bauhinus Basileæ.» Dürfte *Solanum sanctum* L. (hierochuntinum Dun.) sein.

In Spec. plant. ed. II (1762), p. 269, zitiert Linné unter S. sanctum: »Solanum spinosum fructu rotundo Bauh. pin. 167, a quo Burserus.» In Mant. II (1771), p. 340, schreibt er aber unter derselben Art: »Synonymon C. B. videtur ad S. insanum pertinere, sed hanc plantam sub dato nomine a C. B. habuit Burserus.» Linné hat also dies Exemplar für *S. sanctum* erkannt.

IX.21. »Solanum pomo spinoso rotundo, longo flore Bauh. Nux metella Matth. Stramonia Dod. Stechäpffel. Lipsiæ, Basileæ &c. in hortis.» *Datura metel* L.

IX.22. »Solanum fætidum pomo spinoso oblongo Bauh. Tatula vel Datura Cam. ap. Matth. In hortis Misniæ, &c.» *Datura stramonium* L.

IX.23. »Tatula flore purpureo. Lipsiæ in horto.» Wahrscheinlich Blätter derselben Art.

IX.24. a) »Solanifolia Circæa dicta major Bauh. Herba Divi Stephani Tab. S'Stephans krautt. In sylvis Misniæ, Daniæ.» *Circaea lutetiana* L. b) »Solanifolia Circæa alpina Bauh. In montibus Bohemiæ.» *Circaea alpina* L.

IX.25. »Solanum Mexiocanum flore magno Bauh. Marabillas del Peru Clus. Ingolstadii et alibi in hortis.» *Mirabilis jalapa* L.

IX.26. »Mandragora fructu rotunda Bauh. Allraun. Lipsiæ et Monspelii in hortis.» *Mandragora officinarum* Vis.

IX.27. »Mandragora flore subcæruleo purpurascente Bauh. Florentiæ in hort.» *Mandragora autumnalis* Spr.

IX.28. »Hyoscyamus vulgaris vel niger Bauh. Bilsenkrautt, Schlaffkrautt. In Misnia, Bohemia, Gallia, Dania.» *Hyoscyamus niger* L.

IX.29. »Hyoscyamus albus major Bauh. Lipsiæ in horto Deurlingi. In Italia sponte.» *Hyoscyamus albus* L.

IX.30. »Hyoscyamus albus minor Bauh. Parisiis in horto du Monsieur Gonu.» D:o.

IX.31. »Nicotiana major latifolia Bauh. Indianische Beinwelle. In hortis Misniæ, Helvetiæ, Daniæ.» *Nicotiana tabacum* L.

IX.32. »Nicotiana major angustifolia Bauh. Lipsiæ in horto.» D:o.

IX.33. »Nicotiana minor Bauh. Hyoscyamus Peruvianus, Petum Tab. In hortis passim.» *Nicotiana rustica* L.

IX.34. »Papaver hortense semine albo Bauh. Weisser Mohn. In hortis.» *Papaver somniferum* L.

IX.35. »Papaver flore albo simplici non dissecto. In hortis.» Nur die Blumenblätter sind übrig, wahrscheinlich dieselbe Art.

IX.36. »Papaver hortense nigro semine Bauh. Schwarzer Mohn. In hortis.» *Papaver somniferum* L.

IX.37. »Papaver vulgare, cuius capitula foraminibus hiant, semine incano Bauh. Ausslauffender Mohn. In hortis.» D:o.

IX.38. »Papaver flore rubro, semine fusco Bauh. In hortis.» D:o.

IX.39. »Papaver cristatum floribus et semine album. Weisser zerkerpfter(?) Mohn. In hortis.» D:o, f. petalis laciniatis.

IX.40. »Papaver cristatum floribus rubris, semine nigro Bauh. Roter zerkerpffter Mohn. In hortis.» D:o d:o.

IX.41. »Papaver cristatum floribus ex albo et rubro mixtis. In hortis.» D:o d:o.

IX.42. »Papaver pleno flore album Bauh. Weisser gefülleter Mohn. In hortis.» *Papaver somniferum* f. flore pleno.

IX.43. »Papaver pleno flore nigrum Bauh. Roter gefüllter Mohn. In hortis.» D:o d:o.

IX.44. »Papaver erraticum maius Bauh. Klapper Rosen, Kornrosen. In Lusatia, Misnia, Dania.» *Papaver rhoeas* L.

IX.45. »Papaver erraticum pyrenaicum, flore flavo Bauh. Gelbe Klapper Rosen. In Pyrenæis.» *Meconopsis cambrica* (L.) Vig. (Studien, p. 62.)

IX.46. »Papaver erraticum minus Bauh. Kleine Klapper Röslin. In Misnia.» *Papaver rhoeas* L.

IX.47. »Papaver corniculatum luteum Bauh. geel gehörnte Magsamen. Monspelii sponte.» *Glaucium flavum* Cr.

IX.48. »Papaver corniculatum II Tab. a præcedente forsan ob loci natalia diversitatem evarians. Monspelii sponte.» D:o.

IX.49. »Papaver corniculatum phæniceum hirsutum Bauh. Florentiæ sponte; et in GalloProvincia.» *Glaucium corniculatum* (L.) Curt.

IX.50. »Papaver corniculatum phæniceum glabrum Bauh. Rotgelber gehörnter Magsamen. In GalloProvincia sponte.» D:o.

IX.51 ist übersprungen.

IX.52. »Papaver corniculatum violaceum Bauh. Blauwer gehörnter Mohn. In GalloProvincia sponte.» *Roemeria hybrida* (L.) DC.

IX.53. »Hypecoum Bauh. Cuminum syl. alterum Matth. grosser Hornkümmel. Prope Lunellam Galliæ Narbonensis sponte.» *Hypecoum procumbens* L.

IX.54. »Idem cum p(ræ)cedente, ex Creta missum Bauhino, qui mihi dedit Basileæ.» D:o.

IX.55. »Hypecoi altera species Bauh. Cyminum siliquosum minus Tab. kleiner Hoernkümmel. In Gallo Provincia sponte.» *Hypecoum pendulum* L.

IX.56. »Argemone capitulo breviore Bauh. Argemon Rösslin. Lutetiæ et Monspelii.» *Papaver hybridum* L. (hispidum Lam.).

IX.57. »Argemone capitulo longiore Bauh. Parisiis et in Seelandia.» *Papaver argemone* L.

IX.58. »Argemone alpina, foliis scandicis, lutea Bauh. Vocat luteam, sed recens erat candidus floris color et exsiccatus in luteum degeneravit. In Sneeberg monte Austriæ inferioris, ubi catervatim crescit in Daliceto.» *Papaver alpinum* L. (Studien, p. 63.)

IX.59. »Anemone Cyclaminis seu Malvæ folio lutea Bauh. Anemone latifolia Clusii. Portugalisch Anemon Rösslin. Basileæ co(mmun)icavit Mianus.» Ein Blatt, nicht von Anemone palmata, sondern wahrscheinlich einer Malvacee.

IX.60. »Anemone Geranei rotundo folio purpurascens Bauh. Anemone tuberosa Lob. Stern Windröslin. Florentiæ sponte, q(ui)d(e)m et Romæ in Collisæo.» Sehr beschädigt, scheint *Anemone hortensis* L. zu sein.

IX.61. »Anemone latifolia violaceo flore Bauh. Basileæ in hort.» *Anemone hortensis* L.

IX.62. »Anemone latifolia flore variegato Bauh. Basileæ in hort.» D:o.

IX.63. »Anemone latifolia flore carneo Bauh. Basileæ in hort.» D:o.

IX.64. »Anemone latifolia flore coccineo Bauh. Basileæ in hort.» D:o.

IX.65. »Videtur eadem cum præcedente. Basileæ in hort.» D:o.

IX.66. »Anemone latifolia flore coccineo phæniceo Bauh. Basileæ in hort.» *Anemone coronaria* L.

IX.67. »Anemone Geranei Ropertiani folio cærulea Bauh. Anemone Rupertiana Tab. Romæ sponte a la Cesarina et in horto Pisano Magni ducis.» *Anemone apennina* L.

IX.68. »Anemone oenanthes foliis, flore violaceo hexaphyllo Bauh. Basileæ in hort.» *Anemone coronaria* L.

IX.post 68. »Præcedenti non absimilis. Florentiæ in hort.» D:o.

IX.69. »Anemone tenuifolia flore pallide coccineo Bauh. Basileæ in horto Eckenstenii.» D:o.

IX.70. »Videtur convenire cum præcedente. Basileæ in hort.» D:o.

IX.71. »Anemone tenuifolia flore coccineo Bauh. Basileæ in hort.» *Anemone hortensis* L.

IX.72. »Anemone tenuifolia flore exalbido majore Bauh. Florentiæ in horto.» *Anemone coronaria* L.

IX.73. »Anemone latifolia maxima versicolor Bauh. Florentiæ in hort.» D:o, fl. pleno.

IX.74. »Eadem cum præcedente. Basileæ in hort.» D:o d:o.

IX.75. »Anemone latifolia Pavo dicta major Bauh. Basileæ in hort.» *Anemone hortensis*, vielleicht var. *reginae* (Risso).

IX.76. »Anemone tenuifolia multiplex rubra Bauh. Basileæ in hortis, ut et Florentiæ.» *A. coronaria*, fl. pleno.

IX.77. »Anemone tenuifolia multiplex purpurea Bauh. Basileæ in horto Eckenstenii.» D:o d:o.

IX.78. »Anemone sylvestris alba major Bauh. Anemone 3a. Matth. Lipsiae in hort.» *Anemone silvestris* L.

IX.79. »Anemone sylvestris alba minor Bauh. Prope Herbipolim sponte, unde Bauhino attuli. Præcedens ab hac sola forsan cultura differt.» Dürfte eine kleine Form von *Anemone silvestris* L. sein (Studien, p. 63).

IX.80. Diese Nummer wird von Linné zitiert, ist aber jetzt nicht mehr da. (Studien, p. 63.)

IX.81. »Anemone alpina alba minor Bauh. In Taurero Rastadiensi.» *Pulsatilla alpina* L. (P. alba Rchb. Studien, p. 64.)

IX.82. »Anemone trifolia Tab. Dod. Alabastrites sive Dentaria alba D. Brancionis Lob. obs. Florentiæ in hort.» *Anemone trifolia* L.

IX.83. »Anemone nemorosa flore majore Bauh. Ranunculus nemorosus albus Tab. Weiss Waldeshähnlin. In sylvis Misniæ, Bohemiæ, Lusatiæ, Daniæ &c.» *Anemone nemorosa* L.

IX.84. »Ranunculus nemorosus purpureus Tab. In Misnia, Dania.» D:o.

IX.85. »Anemone nemorosa flore pleno Bauh. Basileæ in hort.» D:o, fl. pleno.

IX.86. »Anemone nemorosa flore pleno purpureo Bauh. Basileæ in hort.» D:o d:o.

IX.87. »Pulsatilla folio crassiore, et majore flore Bauh. Küchenschell. In Germania, Gallia, Dania.» *Pulsatilla vulgaris* Mill.

IX.88. »An sint folia Pulsatillæ vulgaris? postquam adolerunt. Prope oppidum Eisenertz Styriæ in saxo.» Wahrscheinlich dieselbe Art.

IX.89. »Pulsatilla folio tenuius inciso et flore minore sive palustris Bauh. Basileæ in horto Bauhini.» Dürfte eine Form von *P. vulgaris* sein.

IX.90. »Estne eadem cum præcedente, an vulgaris? In Alsatia.» Scheint auch eine kleinblütige Form derselben Art zu sein.

IX.91. »Pulsatilla Apii folio vernalis flore majore Bauh. A parente.» *Pulsatilla vernalis* (L.) Mill.

IX.92. »Pulsatilla Apii folio vernalis flore minore Bauh. In Pyrenæis, item inter Rhætiam et Vallesiam altissimo monte.» D:o.

IX.93. »Pulsatilla folio Anemones 2dæ sive subrotundo Bauh. In Lusatia inferiori.» *Pulsatilla patens* (L.) Mill.

IX.post 93. »An sit Pulsatilla flore albo Bauh. In Pyrenæis.» *Pulsatilla alpina* (L.) Lois.

IX.94. »Pulsatilla lutea Pastinacæ sylvestris folio Bauh. In Helvetiæ et Rhætiæ montibus.» *Pulsatilla alpina* var. *sulphurea*. Nicht Linnés A. sulphurea, die zu P. vernalis gehören muss. Diese Form erwähnt er dagegen unter A. Alpina in Spec. plant. ed. II, p. 760, mit diesen Worten: Confer: Pulsatilla lutea, Pastinacæ sylvestris folio C. B. 177, quæ vix videtur ab hac diversa.»

IX.95. »An Adonis hortensis Bauh? Florentiæ.» *Adonis aestivalis* L. oder *autumnalis* L.

IX.96. »Adonis flore majore Bauh. Feuwerröslin. In Bavaria, Bohemia &c.» *Adonis aestivalis* oder *autumnalis*.

IX.97. »Adonis hortensis flore minore atrorubente Bauh. Corallenblumen. In hortis Misniæ, Daniæ &c.» *Adonis autumnalis* L.

IX.98. »Adonis sylvestris flore phæniceo (aut pallido) ejusque foliis longioribus Bauh. Adonis flore pallido Camer. in Ep. Matth. In Saxonia &c.» Wahrscheinlich *Adonis aestivalis* L.

IX.99. »Ranunculus nemorosus luteus Rauh. Geel Waldthähnlin. In sylvis Lusatiæ, Misniæ, Helvetiæ, Daniæ.» *Anemone ranunculoides* L.

IX.100. »Idem cum præcedente, sed pluribus floribus. Basileæ.» D:o.

IX.101. »Ranunculus nemorosus luteus flore pleno. Coagii Seelandiæ collectum attulit Fredericus Lubinus Med. Cand.» *Anemone ranunculoides* f. fl. pleno. (Studien, p. 64.)

IX.102. »Ranunculus nemorosus vel sylvaticus folio rotundo Bauh. Ranunculus dulcis seu pratensis Trago. Süsser Hanenfuss. In Lusatia, Misnia, Dania.» *Ranunculus auricomus* L.

IX.103. »Ranunculus nemorosus Thalictri folio Bauh. A parente.» *Isopyrum thalictroides* L.

IX.104. »Ranunculus nemorosus Muscatellina dictus Bauh. Fumaria bulbosa seu tuberosa minima Tab. Bisemkrautt. In Lusatia, Helvetia, Dania &c.» *Adoxa moschatellina* L.

IX.105. »Ranunculus pratensis erectus acris Bauh. Ranunculus sylvestris Tab. Wilder Hanenfuss. In Lusatia, Bohemia Dania &c.» *Ranunculus acris* L.

IX.106. »Ranunculus pratensis repens hirsutus Bauh. Ranunculus vinealis Tab. In Lusatia, Misnia &c.» *Ranunculus repens* L.

IX.107. »Ranunculus pratensis, radice verticilli modo rotundo Bauh. Ranunculus minor Tab. In Lusatia, Dania &c.» *Ranunculus bulbosus* L.

IX.108. »Ranunculus radice rotunda, copiosioribus floribus hirsutie incanus. In Gallia Narbonensi.» Eine stark behaarte Form derselben Art. (Studien, p. 64.)

IX.109. »Ranunculus pratensis hirsutus radice tuberosa crassa. An Ranunculus V. Matth? In GalloProvincia.» Steril, wahrscheinlich *Ranunculus monspeliacus* L. (Studien, p. 64.)

IX.110. »Ranunculus hortensis erectus flore pleno Bauh. gefüllter Hanenfuss. Basileæ et Lipsiæ in hortis.» *Ranunculus acris*, fl. pleno.

IX.111. »Ranunculus hortensis erectus flore pleno eoque albo. Lipsiæ in hortis.» Nur Blüten, nicht bestimmbar.

IX.112. »Ranunculus dulcis flore pleno Bauh. gefüllter süsser Hanenfuss. Basileæ in hortis.» *Ranunculus repens*, fl. pleno.

IX.post 112. »Ranunculus radice tuberosa flore pleno et prolifero Bauh. Hafniæ et Soræ in hort.» Kaum bestimmbare monströse Form: aus der Mitte jeder Blüte geht eine gestielte Blüte hervor.

IX.113. »Ranunculus folio Aconiti flore albo multiplici. Ranunculus albus multiflorus Tab. gefüllter weisser Hanenfuss. Basileæ in hort.» *Ranunculus aconitifolius* L., fl. pleno.

IX.114. »Ranunculus arvensis echinatus Bauh. Acker hanenfuss. In Bohemia, Misnia, Dania.» *Ranunculus arvensis* L.

IX.115. »Ranunculus rotundifolius repens echinatus Bauh. Florentiæ.» *Ranunculus parviflorus* L.

IX.116. »Ranunculus palustris echinatus Bauh. Ranunculus Apulei q(ui)busdam Clus. In Italia et Monspelii.» *Ranunculus muricatus* L.

IX.117. »Ranunculus Creticus latifolius Clusii. Ranunculus Asphodeli radice Creticus Bauh. Florentiæ in hortis.» Dürfte *Ranunculus creticus* L. sein.

IX.118. »Ranunculus palustris Apii folio, lævis Bauh. Ranunculus palustris Tab. Wasser eppich. In Lusatia, Seelandia &c.» *Ranunculus sceleratus* L.

IX.119. »Ranunculus aquaticus Cotyledonis folio Bauh. Cotyledon aquaticum Dod. In Lusatia, Gallia, Dania.» *Hydrocotyle vulgaris* L.

IX.120. »Ranunculus aquaticus folio rotundo et capillaceo Bauh. Ranunculus aquaticus hepaticæ facie Lob. Wasser hähnlin, Wasser leberkrautt. In Bohemia, Gallia, Dania.» *Batrachium peltatum* (Schrank) Fr. und *B. hederaceum* (L.) Dum.

IX.121. »Ranunculus aquaticus capillaceus Bauh. In Seelandia. Collimborgi.» Ist wohl *Batrachium paucistamineum* (Tausch.).

IX.122. »Ranunculus longifolius palustris major Bauh. Ranunculus lanceatus major Tab. gross lang Wasserhanenfuss. In Lusatia inferiori, Helvetia, Dania.» *Ranunculus lingua* L.

IX.123. »Ranunculus longifolius palustris minor Bauh. Ranunculus lanceatus minor Tab. Speerkrautt, langer Wasser hanenfuss. In Lusatia, Misnia, Dania.» *Ranunculus flammula* L.

IX.124. »Ranunculus palustris longifolius minimus reptans. Prope Murtenam oppidum Helvetiorum ad lacum.» *Ranunculus reptans* L. (Studien, p: 64.)

IX.125. »Ranunculus montanus foliis Plantaginis Bauh. Ranunculus Pyrenæus albo flore Clus. In Pyrenæis.» *Ranunculus amplexicaulis* L.

IX.126. »Ranunculus montanus folio gramineo Bauh. Ranunculus gramineus Tab. grass Hanenfuss. In Pyrenæis et ad speluncam D. Magdalenæ in Gallia Narbonensi.» *Ranunculus gramineus* L. (Studien, p. 64.)

IX.127. »Ranunculus alpinus gramineus albo flore. In Pyrenæis. Est perpetuo brevior præcedente, nec cum illo simul reperitur in uno loco: folia qu(o)q(ue) non ita rigent.» *Ranunculus pyrenaeus* L. (Studien, p. 64.)

IX.128. »Ranunculus lanuginosus angustifolius grumosa radice minor Bauh. Ranunculus Illyricus Lob. Tab. Windischer Hanenfuss. Basileæ dedit Bauhinus.» *Ranunculus illyricus* L.

IX.129. »Ranunculus grumosa radice, folio Ranunculi bulbosi Bauh. In GalloProvincia.» Dürfte *Ranunculus flabellatus* Desf. oder *garganicus* Ten. sein.

IX.130. »An Ranunculus grumosa radice ramosus Bauh? Folia floris sunt incisa, quas incisuras figura apud Clusium non exhibet. Basileæ in hort.» *Ranunculus asiaticus* L.

IX.131. »Ranunculus rutaceo folio flore suaverubente Bauh. Ranunculus præcox I. rutæ folio Clus. Flos candidus est. In monte altissimo Helvetior, ad thermas fabarias, item in S. Bernhardo.» Scheint mir *Ranunculus glacialis* L. zu sein, aber eine f. pilosa.

IX.132. »Ranunculus alpinus humilis rotundifolius Bauh. flore minore. Ranunculus minimus flore albo Clus. In alpibus Austriæ.» *Ranunculus alpestris* L.

IX.133. »Convenit cum præcedente. In Pyrenæis.» Dürfte auch *R. alpestris* sein.

IX.134. »Ranunculus alpinus humilis rotundifolius flore majore Bauh. Prope Einsidel Helvetiorum.» Scheint mir ein kräftiges Individ derselben Art zu sein.

IX.135. »Ranunculus alpinus humilis auricomus, flore grandiusculo, uno folio medium cauliculi occupante, eoque fere radiato, ut in Ranunculo dulci. In

alpibus Austriæ.» Scheint *Ranunculus montanus* Willd. zu sein. (Studien, p. 65.)

IX.136. »Ranunculus alpinus humilis rotundifolius hirsutus &c. In Pyrenæis. An Ranunculus saxatilis magno flore Bauh.» Mir scheint dies eine niedrige und grossblütige Form von *Ranunculus acris* L. zu sein.

IX.137. »Ranunculus montanus hirsutus humilior Narcissi flore Bauh. In alpibus Austriæ, Helvetiæ, et Pyrenæis.» *Anemone narcissiflora* L.

IX.138. »Ranunculus Brasilianus. An Ranunculus montanus Aconiti folio albus flore majore Bauh? Ex Toupinambault attulit pharmacopæus.» *Anemone dichotoma* L. (Studien, p. 65.)

IX.139. »Ranunculus montanus Aconiti folio albus flore minore Bauh. Ranunculus albus, Batrachium album Tab. Weisser berghanenfuss. In monte Calcaris seu Horto Dei, in Bohemia, Alsatia. In alpibus Rhæticis, Austriacis, Pyrenæis.» *Ranunculus aconitifolius* L.

IX.140. »Ranunculus montanus Aconiti folio flore globoso Bauh. Ranunculus alpinus luteus Tab. Alp-hanenfuss. Trollblumen. In Lusatia, Helvetia, Rhætia, Dania.» *Trollius europaeus* L.

IX.141. »Ranunculus montanus subhirsutus Geranii folio Bauh. In Lusatia, Helvetia &c.» *Ranunculus lanuginosus* L.

IX.142. »An Ranunculus montanus lanuginosus foliis Ranunculi pratensis repentis Bauh? Bey Unser Frauwen im Stein, non longe Basilea.» Dürfte dieselbe Art sein.

VOLUMEN X.

Horti sicci seu stirpivm studio et labore D. Ioachimi Burseri Camentio-Lusati, in Regia Nobilium Academia Sorana Medici et Physices profess. publici per diversas regiones et loca collectarum et iuxta seriem Pinacis Bauhiniani digestarum Volumen X. continens Sectionem 4. 5. 6. libri quinti Pinacis eiusdem.

X.1. »Aconitum unifolium luteum bulbosum Bauh. Aconitum hyemale Cam. in Ep. Matth. Florentiæ sponte, Lipsiæ, Basileæ, Hafniæ in hort.» *Eranthis hiemalis* (L.) Salisb.

X.2. »Aconitum lycoctonum luteum Bauh. Luparia Trago. gelbe Wolffswurtz. In Austria sponte.» *Aconitum lycoctonum* L.

X.3. »Haud dubie idem cum præcedente, sed humidiore solo natum. In Austria.» D:o.

X.4. »Aconitum lycoctonum luteum, foliis, caule et ipsis floribus hirsutis, spica longissima. In Pyrenæis.» *Aconitum pyrenaicum* L. (Studien, p. 65.)

X.5. »Aconitum cæruleum glabrum flore Consolidæ regalis Bauh. Aconitum IV Matth. A parente.» *Delphinium fissum* W. & K.

X.6. »Aconitum cæruleum seu Napellus I. Bauh. Napellus Matth. Eysenhüttlin. Narrenkappen. In montibus Lusatiæ, Bohemiæ &c.» *Aconitum paniculatum* Lam.

X.7. »Alius Napellus. A parente.» D:o.

X.8. »Napellus maximus ramosus. In Bavaria.» Dürfte *Aconitum paniculatum* Lam. sein. (Studien, p. 65.)

X.9. »Aconiti cærulei alia species. A parente.» D:o.

X.10. »Aconitum racemosum Bauh. Christophoriana Tab. Lob. St Christoffelskrautt. In Bohemia, Misnia, Seelandia, Helvetia.» *Actaea spicata* L.

X.11. »Cum præcedente convenit. Ex Brasilia per pharmacopæum Lutetianum.» Dürfte *Actaea rubra* (Ait.) Willd. sein.

X.12. »Aconitum salutiferum seu Anthora Bauh. Heilgifft, Giftheil. In Pyrenæis sponte.» *Aconitum anthora* L.

X.13. »Aconitum Pardalianches I. seu Thora major Bauh. Thora Valdensis Tab. In Pyrenæis.» *Ranunculus thora* L.

X.14. »Aconitum Pardalianches alterum seu Thora minor Bauh. Thora montis Baldi et Sabaudica Tab. Ranunculus grumosa radice Clus. In Taurero Rastadiensi.» *Ranunculus hybridus* Biria (phthora Cr.).

X.15. »Doronicum radice dulci Bauh. Aconitum Pardalianches Theophrasti Matth. In Pyrenæis.» Sterile Exemplare von *Doronicum pardalianches* L.

X.16. »Doronicum radice scorpii Bauh. Doronicum I. Tab. Gemsenwurtz. In hortis Hafniæ.» Dürfte dieselbe Art sein.

X.17. »Præcedenti cognatum. Florentiæ.» Wahrscheinlich dieselbe.

X.18. »Estne idem cum præcedenti. In monte Calcaris Galliæ narbonensis.» Wahrscheinlich dieselbe.

X.19. »An Doronicum plantaginis folio Bauh? Doronicum minus officinar. Lob? Non procul Lutetiæ in sylva.» *Doronicum plantagineum* L.

X.20. »Doronicum Plantaginis folio alterum Bauh. Alisma Matth. Wolfferleij. S. Iohannsblum. laugenkrautt. In Lusatia. Misnia, Bohemia, monte Calcaris, Dania &c.» *Arnica montana* L.

X.21. »Alisma angustifolium. In Pyrenæis.» Ein kleines Individuum von *Senecio doronicum* L. (Studien, p. 65.)

X.22. »Doronicum longifolium hirsutie asperum Bauh. Doronicum I. Clus. Pann. In alpibus Austriæ.» Grosse Exemplare von *Aronicum Clusii* Koch.

X.23. »An idem cum p(ræ)cedente? Ad thermas fabarias seu piperinas Helvetior. et in Pyrenæis.» *Aronicum scorpioides* (L.) DC.

X.24 ist übersprungen.

X.25. »Doronicum latifolium flore magno Bauh. Doronicum III. Clus. Pann. In alpibus Helveticis.» *Aronicum scorpioides* (L.) DC.

X.26. »Videtur idem cum præcedente, licet minus. In alpibus Helveticis et Rhæticis.» *Aronicum glaciale* (Wulf.) Rchb.

X.27. »Doronicum maximum, foliis caulem amplexantibus Bauh. Doronicum Austriacum V. Clus. pann. In Styria.» *Doronicum pardalianches* L. oder *austriacum* Jacq.

X.28. »Videtur idem cum præcedente, licet folia non tantopere serrata nev flos tam grandis. In montibus Austriæ et Horto Dei. Dürfte eine Schattenform eines Doronicum sein.

X.29. »Doronicum Helveticum incanum Bauh. prope Gothardum, Rhætiæ montem, unde Bauhino attuli.» *Senecio doronicum* L. (Studien, p. 66.)

X.30. »Helleborus niger fætidus Bauh. Helleborastrum minus Tab. klein leusekrautt. In Helvetia sponte.» Steril, wahrscheinlich *Helleborus foetidus* L.

X.31. »Helleborus niger hortensis flore viridi Bauh. Christwurtz. In hortis Lusatiæ, Daniæ &c.» *Helleborus viridis* L.

X.32. »Helleborus niger hortensis alter Bauh. Basileæ in horto Bauh.» Nur ein Blatt.

X.33. »Helleborus niger flore roseo Bauh. Veratrum nigrum Styriacum Tab. Elle-

borus niger legitimus Clus. hist. Schwartze Nisewurtz. In Austria copiosissime et Appennino.» *Helleborus niger* L.

X.34. »Helleborus niger Saniculæ folio major Bauh. Astrantia nigra Lob. Schwartz Sanickel. In Bohemia sponte.» *Astrantia major* L.

X.35. »Helleborus Saniculæ folio minor Bauh. In Gothardo et Pyrenæis.» *Astrantia minor* L.

X.36. »Helleborus niger tenuifolius Buphthalmi flore Bauh. Helleborus Hippocratis Tab. Niesewurtz. In Bohemia sponte, uti et in Thuringia.» *Adonis vernalis* L.

X.37. »Helleborus albus flore subviridi Bauh. Weisse Niesswurtz. In Helvetia, p(ro)pe Belenzonam, Rhætia, Austria, Pyrenæis.» *Veratrum album* L.

X.38. »Helleborus albus flore atrorubente Bauh. Infra Badenam Austriæ sponte.» *Veratrum nigrum* L.

X.39. »Helleborine latifolia montana Bauh. Wilde Niesswurtz. In sylvis misniæ, Helvetiæ, Daniæ.» *Epipactis latifolia* (L.) All.

X.40. »Helleborine altera atrorubente flore Bauh. In Helvetia &c.» *Epipactis atrorubens* (Hoffm.) Schult.

X.41. »Helleborine angustifolia palustris sive pratensis Bauh. In Lusatia, Misnia.» Das Exemplar ist nicht mehr da. Die Abdrücke zeigen, dass es wohl *Cephalanthera longifolia* (L.) Fritsch gewesen ist.

X.42. »Helleborine flore carneo Bauh. In Lusatia, et Gallia Narbonensi. et in Seelandia.» *Epipactis palustris* (L.) Cr.

X.43. »Helleborine flore albo vel Damasonium montanum latifolium Bauh. In Pyrenæis.» *Cephalanthera grandiflora* (L.) S. F. Gr.

X.44. »An Helleborine montana angustifolia spicata Bauh? An vero eadem cum subsequente? Ad Pratolinum secundo ab urbe Florentina milliari. In Insula Moena ad præcipitia, loco qui sella Reginæ vocatur.» *Cephalanthera rubra* (L.) Rich.

X.45. »Helleborine montana angustifolia purpurascens Bauh. A parente.» Scheint dieselbe Art zu sein.

X.46. »Helleborine flore rotundo sive Calceolus Bauh. Damasonium nothum Dod. Vnser Frauwen Schuh. In alpibus Austriæ superioris sponte. q(ui)d(e)m in Augusta Rauracorum.» *Cypripedium calceolus* L.

X.47. »Vix differt a præcedente. Pharmacopæus Parisiensis ex Brasilia attulit.» *Cypripedium parviflorum* Salisb.

X.48. »Gentiana major lutea Bauh. Entzian. Basileæ in horto.» *Gentiana lutea* L.

X.49. »Eadem cum præcedente. In monte Wasserfall Helvetiæ et in Pyrenæis.» Nur wenig übrig, wahrscheinlich dieselbe Art.

X.50. »Gentiana major lutea flore amplo et campaniformi, c(ui)us meminit Bauh. Est per omnia minor p(ræ)cedente, et foliis oblongis. In Pyrenæis, unde Bauhino attuli.» *Gentiana Burseri* Lap. (Studien, p. 66.)

X.51. »Gentiana major purpurea Bauh. In alpibus Helveticis et Rhæticis et Austriacis.» *Gentiana purpurea* L.

X.52. »Gentiana major flore albo rubro punctato Bauh. In alpibus Austriæ, Styriæ, et Rhætiæ.» *Gentiana punctata* L.

X.53. »Gentiana Asclepiadis folio Bauh. Prope Lucernam Helvetiorum, et in montibus Tyrolensibus.» *Gentiana asclepiadea* L.

X.54. »Gentianella alpina latifolia magno flore Bauh. In alpibus Helveticis.» *Gentiana acaulis* L. (excisa Pr.).

X.55. »Gentianella alpina latifolia magno flore, per omnia minor præcedente. In Pyrenæis.» D:o.

X.56. »Gentianella alpina angustifolia flore magno Bauh. In alpibus Austriæ et Pyrenæis.» *Gentiana vulgaris* (Neilr.) Beck (Clusii Perr. & S.).

X.57. »Gentianella alpina verna major Bauh. Gentianella elegantissima Camer. in horto. Ingolstadii sponte. *Gentiana verna* L.

X.58. »Haud dubie eadem cum præcedente. In alpibus Austriæ et Pyrenæis.» D:o.

X.59. »Gentianella verna flore albo. Ingolstadii sponte. Beschädigt, ist vielleicht *Gentiana verna* L. (Studien, p. 66.)

X.60. »Gentianella alpina verna minor Bauh. Gentianella elegantiss. Bavarica 2da seu minor Cam. in hort. et icon. In alpibus Helvetiæ et Rhætiæ.» *Gentiana bavarica* L.

X.61. »Gentianella alpina æstiva Centaureæ minoris folio Bauh. Gentiana minor Tab. himmelstengel. In montibus Helvetiæ, Carinthiæ, et Pyrenæis.» *Gentiana nivalis* L.

X.62. »An Gentianella brevi folio Bauh. Differt a Bavaricis paullo sup(er)ius positis, caulis longitudine, rectitudine, et florum in eo copia. In pratis Bavariæ.» *Gentiana utriculosa* L. (Studien, p. 67.)

X.63. »Gentiana cruciata Bauh. Mödelgern. Speerenstich. Basileæ et ingolstadii sponte, q(ui)d(e)m et in Misnia.» *Gentiana cruciata* L.

X.64. »Gentiana autumnalis ramosa Bauh. In Bavaria, Helvetia, Bohemia, Dania.» *Gentiana germanica* Willd. (Studien, p. 67.)

X.65. »Præcedenti affinis, sed flos ex cæruleo pallescit, habetque calycem, cui includitur ex foliolis latioribus, minusque dissectis constantem. In Pyrenæis.» *Gentiana campestris* L. (oder vielleicht baltica Murb.; Studien, p. 67).

X.66. »Eadem cum proxime antecedente, sed flore prorsus candido. In Pyrenæis.» D:o.

X.67. »Gentiana angustifolia autumnalis major Bauh. Calathiana Viola Dod. In pratis Lipsiæ, Basileæ &c.» *Gentiana pneumonanthe* L.

X.68. »Gentiana angustifolia autumnalis minor, floribus ad latera pilosis Bauh. Pneumonanthe Cordi. Basileæ et in Thuringia.» *Gentiana ciliata* L.

X.69. An Plantago latifolia glabra Bauh? Folia s(un)t crassa, ut plerumque maritima. Monspelii in littore maris.» *Plantago Cornuti* Gouan.

X.70. Plantago latifolia sinuata Bauh. Plantago vulgaris latifolia Lob. breitter Wegerich, Wegbreitt. Passim.» *Plantago major* L.

X.71. »Plantago latifolia incana Bauh. Plantago media Matth. Dod. Schaffzunge. In Misnia, Bavaria, Helvetia, Seelandia.» *Plantago media* L.

X.72. »Plantago latifolia rosea, floribus quasi in spica dispositis Bauh. Plantago multiplex Tabern. Gefültt Wegerich. Lipsiæ in horto Deurlingii.» *Plantago major* f. monstrosa.

X.73. »Plantago latifolia glabra minor Bauh. kleiner breitter Wegerich. In Lusatia.» Zwergform derselben Art.

X.74. »Plantago angustifolia major Bauh. Plantago quinquenervia Lob. Spitziger Wegerich. Passim. *Plantago lanceolata* L.

X.75. »Plantago angustifolia minor Bauh. kleiner spitziger Wegerich. In Lusatia &c.» D:o.

X.76. »Plantago angustifolia paniculis Lagopi Bauh. Co(mmuni)cavit Bauhinus, asserens ad Cetum Monspessulanum lectam esse.» *Plantago lagopus* L.

X.77. »An Plantago trinervia folio angustissimo Bauh? In Gothardo monte.» *Plantago alpina* L.

X.78. »Plantago aquatica latifolia Bauh. Wasser Wegerich. In Lusatia, Bohemia, Dania &c.» *Alisma plantago aquatica* L.

X.79. »Plantago aquatica angustifolia Bauh. Plantago aquatica minor Tabern. In Seelandia pone pagum Slaglille, et versus Nestwediam.» *Echinodorus ranunculoides* (L.) Engelm.

X.80. »Plantago aquatica stellata Bauh. Alisma pusillum angustifolium muricatum sive Plantago aquatica minor Lob. obs. Dedit Basileæ M. Urstisius Aureliis in paludibus collectam.» *Damasonium alisma* Mill.

X.81. »Plantaginella palustris Bauh. Lipsiæ et prope Tigurum Helvet. Etiam in Seelandia.» *Limosella aquatica* L.

X.82. »Holosteum hirsutum albicans minus Bauh. Holosteum Monspeliacum Tab. Schlangenzwang.(?) Monspelii sponte.» *Plantago albicans* L.

X.83. »Holosteum sive Leontopodium Creticum Bauh. Dedit Bauhinus, a Doldio acceptum. Zu jung, kaum bestimmbar; ist nicht Plantago cretica L.

X.84. »An Holosteum Creticum alterum Bauh? Folia rigida, minora &c. Non procul ab oppido Bormo, prope Insulas stæchadas.» *Plantago Bellardi* All. (Studien, p. 67.)

X.85. »Holosteum strictissimo folio maius Bauh. Coronopus syl. serpentina Tab. In monte Calcaris seu horto Dei.» Ist *Plantago carinata* Schrad. am meisten ähnlich.

X.86. »Holosteum Massiliense Bauh. Coronopus Massiliensis Tab. In GalloProvincia.» *Plantago subulata* L.

X.87. »Holosteo affinis, Cauda muris Bauh. Myosuron Dod. Meusegrass, Meuseschwäntzlin. In Lusatia, Dania &c.» *Myosurus minimus* L.

X.88. »Coronopus hortensis Bauh. Hirtzhorn, Krähenfuss. Dresdæ in hortis.» *Plantago coronopus* L.

X.89. »Coronopus sylvestris hirsutior Bauh. In Gallia Narbonensi.» *Plantago coronopus* L. (Studien, p. 67.)

X.90. »Videtur idem cum præcedente, licet glabra. Parisiis sponte.» D:o. (Studien, p. 67.)

X.91. »A præcedente videtur foliorum figura differre. In Italia.» D:o.

X.92. »Coronopus maritima major Bauh. Plantago marina Lob. Tab. Halæ Saxonum.» *Plantago maritima* L.

X.93. »Idem cum præcedente. Monspelii ad littus maris. In Seelandia.» *Plantago crassifolia* Forssk. (der letztere Fundort muss irrtümlich sein).

X.94. Coronopus maritimus tenuifolius lævis Bauh. Coldinborgi Seelandiæ.» *Plantago maritima* L.

X.95. »Idem cum præcedente. In Austria et Bohemia, pratis paludosis, sed dulci aqua perfusis.» D:o.

X.96. »Psyllium maius supinum Bauh. flöhesaamen. Monspelii sponte.» *Plantago cynops* L. Sp. pl. II (wahrscheinlich).

X.97. »Psyllium maius erectum Bauh. Lipsiæ et in Seelandia in hortis.» *Plantago arenaria* W. & K.

X.98. »Videtur idem cum præcedente. In Valle Augusta sponte.» D:o.

X.99. »Pyrola rotundifolia major Bauh. In Lusatia, Bohemia, Misnia, Dania &c.» *Pyrola rotundifolia* L. und *P. minor* L.

X.100. »Pyrola Brasiliana foliis cordatis Asari. Ex Brasilia des Toupinambaux attulit pharmacopæus Lutetianus.» *Pyrola asarifolia* Michx. (Studien, p. 67.)

X.101. »Pyrola rotundifolia minor Bauh. Pyrola minima et 4a Clus. In Austria, Bohemia, Lusatia &c.» *Pyrola uniflora* L.

X.102. »Pyrola rotundifolia Brasiliana minor. Ex Brasilia per pharmacopæum Parisiensem accepi.» *Pyrola secunda* L.

X.103. »Pyrola Brasiliana minor, folio magis acuminato. Cum præcedente simul accepi. Forte non differt ab ea quæ subseq(uitur).» D:o.

X.104. »Pyrola folio mucronato serrato Bauh. Pyrola tenerior et 2da Clus. pann. In Misnia et monte Calcaris. In Insula Moena.» D:o.

X.105. »Pyrola Alsines flore Europæa Bauh. Alsinanthemon Thalii. Figura e(st) in Prodromo. In Misnia, Bohemia, Seelandia.» *Trientalis europaea* L.

X.106. »Pyrola Alsines flore Brasiliana major Bauh. Des Toupinambaux per pharmacopæum Parisinum Parisiis ad Bauhinum transtuli.» *Cornus canadensis* L. (Studien, p. 68.)

X.107. »Pyrola Alsines flore Brasiliana minor Bauh. Ex eodem cum priore loco, unde et Bauhino attuli.» *Trientalis americana* Pursh. (Studien, p. 68.)

X.108. »Pyrola frutescens Arbuti folio Bauh. In Lusatia inferiori.» *Pyrola umbellata* L.

X.109. »Bistorta major, radice minus intorta Bauh. Natterwurtz. In Lusatia.» *Polygonum bistorta* L.

X.110. »Bistorta major, radice magis intorta Bauh. In Lusatia, Misnia, Bohemia &c.» D:o.

X.111. »Bistorta alpina media Bauh. Bistorta minor Cam. in Ep. In Helvetia ad oppidum Schwitz, et ad montem Miete(?), item in alpibus Austriæ superioris, et Pyrenæis.» *Polygonum viviparum* L.

X.112. »Limonium maritimum maius Bauh. Monspelii in littore.» *Statice limonium* L.

X.113. »Limonium maritimum minus oleæ folio Bauh. Monspelii in littore». *Statice Girardiana* Guss.

X.114. »An Limonium parvum Bellidis minoris folio Bauh? Monspelii in littore.» *Statice bellidifolia* Gouan und *S. virgata* Willd. (Studien, p. 68.)

X.115. »An Limonium maritimum minus foliolis cordatis Bauh? Monspelii et Massiliæ.» Blüten sind nicht entwickelt, stimmt sonst mit *Statice minuta* L. überein.

X.116. »Limonium peregrinum foliis Asplenii Bauh. Florentiæ in horto Magni Ducis. Monspelii in horto Regio.» *Statice sinuata* L.

X.117. »Potamogeton rotundifolium Bauh. breitt Samkrautt. In Lusatia, Bohemia. Dania &c.» *Potamogeton natans* L.

X.118. »Potamogeton Salicis folio Bauh. Potamogeton angustifolium Tab. Spitzig Samkrautt. In Lusatia, Misnia, Seelandia &c.» *Polygonum amphibium* L.

X.119. »Potamogeton foliis latis splendentibus Bauh. Lipsiæ, et in Bohemia.» Steril, ohne Schwimmblätter, könnte *Potamogeton gramineus* L. sein.

X.120. »Potamogeton splendens perfoliatum. Considera figuram Potamogeiti 3. in Historia Dodonæi. Lipsiæ.» *Potamogeton perfoliatus* L.

X.121. »Potamogeton ramosum angustifol. Bauh. (getilgt: An Potamogeton foliis angustis splendentibus Bauh?) In Lusatia.» Scheint *Potamogeton obtusifolius* M. & K. zu sein.

X.122. »Potamogeton foliis crispis, sive Lactuca ranarum Bauh. Tribulus aquaticus minor Clus. In Lusatia, Italia, GalloProvincia.» *Potamogetum densus* L. und *P. crispus* L.

X.123. »Potamogeti angustifolii species, utriculis donata. Ad pagum Michelfelden prope Basileam.» Vielleicht *Potamogeton trichoides* Cham. (Studien, p. 69; dort steht unrichtig: Mischfelden.)

X.124. »Potamogeton gramineum ramosum Bauh. In Austria.» *Potamogeton pectinatus* L. (Studien, p. 69.)

X.post 124. »Puto esse idem cum præcedente, quamvis folia videantur tenuiora. Ma-

lim ad Fæniculum sive Peucedanum aquaticum reducere. Prope Insulam Gauffnöe(?) in aqua salsa ad pontem.» *Potamogeton pectinatus* L.

X.125. »Potamogeton minimum capillaceo folio. Monspelii in paludibus.» Dürfte *Potamogeton pusillus* L. sein. (Studien, p. 69.)

X.126. »Potamogeton capillaceum, capitulis ad alas trifidis Bauh. Capitulum est ex siliculis compositum: folia non quousque pilo tenuiora, ut scribit Bauhinus, q(ui) a me accepit. Monspelii in paludibus.» *Zanichellia palustris* L. (Studien, p. 69.)

X.127. »Nymphæa alba major Bauh. Weisse Seeblumen. Haarwurtz. In Lusatia, Bohemia, Gallia, Dania.» Dürfte *Nymphaea candida* Pr. sein.

X.128. »Videtur folium recens præcedentis, cuius et(iam) meminit Bauh. Ad Castellum novum non longe Monspelio.»

X.129. »Nymphæa alba minima Bauh. Ranæ morsus Lob. Tab. In Lusatia, Bohemia, Seelandia.» *Hydrocharis morsus ranae* L.

X.130. »Nymphæa lutea minor magno flore Bauh. geele Seeblumen. In Bavaria.» Blüten von *Nuphar luteum* (L.) Sm. und Blätter von *Limnanthemum nymphoides* (L.) Lk.

X.131. »Nymphæa minima. A parente.» *Calystegia soldanella* (L.) R. Br. (Studien, p. 69.)

X.post 131. »Nymphæa lutea minor parvo flore Bauh. Allatum Rostochio.» *Limnanthemum nymphoides* (L.) Lk.

X.132 fehlt.

X.133. »Sagitta aquatica major Bauh. Pfeilkrautt. Lipsiæ &c.» *Sagittaria sagittifolia* L.

X.134. »Sagitta aquatica minor latifolia Bauh. In Lusatia.» *Sagittaria* mit einem eingefügten Blütenstand von Cucurbita(!).

X.135. »Sagitta aquatica minor angustifolia Bauh. In Lusatia inferiori.» *Sagittaria sagittifolia* L.

X.136. »Dracunculus polyphyllus Bauh. Dracunculus minor Tab. Matth. klein Drachenwurtz, Schlangenkrautt. Patavii, Florentiæ, Monspelii in hortis.» *Dracunculus vulgaris* Schott.

X.137. »Dracunculus sive Serpentaria triphylla Brasiliana Bauh. Apud Toupinambaultios legit pharmacopæus Parisiensis, mihique co(mmun)icavit, unde postea Bauhino exemplar dedi.» *Arisaema triphyllum* (L.) Schott. (Studien, p. 69.)

X.138. »Dracunculus palustris, sive radice arundinacea Bauh. In Lusatia, Seelandia Danorum.» *Calla palustris* L.

X.139. »Arum venis albis Bauh. Aron. Deutscher Ingber. Monspelii in horto Regio.» Blätter von *Arum italicum* Mill.

X.140. »Arum maculatum Bauh. Accepi Basileæ, sed aliunde allatum.» *Arum maculatum* L.

X.141. »Arum vulgare non maculatum Bauh. In Misnia, Bohemia, Helvetia, Italia, Dania.» D:o.

X.142. »Aron maximum Aegyptiacum, quod vulgo Colocasia Bauh. Florentiæ, Romæ, Argentorati in hortis.» Blätter von *Colocasia*.

X.143. »Arisarum latifolium alterum Bauh. Basileæ in hort.» Blätter, wahrscheinlich von *Arisarum vulgare* Targ.

X.144. »Arisarum angustifolium Bauh. Basileæ dedit Reuchenius, Patavii lectum.» Ein Blatt, wahrscheinlich von *Biarum tenuifolium* (L.) Schott.

X.145. »Asarum Bauh. Haselwurtz. In Lusatia, Misnia, Bohemia &c.» *Asarum europaeum* L.

X.146. »Asarina foliis Asari Bauh. Accepi a parente, sed nihil est aliud quam Tussilago alpina.» Steriler Spross von *Homogyne alpina* (L.) Cass.

X.147. »Tussilago vulgaris Bauh. Ungula caballina Trago. Hufflattich. In Lusatia, Misnia, Bavaria, Dania.» *Tussilago farfara* L.

X.148. »Tussilago alpina rotundifolia glabra Bauh. In montibus Bohemiæ, Helvetiæ, Pyrenæis.» *Homogyne alpina* (L.) Cass.

X.149. »Tussilago alpina rotundifolia canescens Bauh. In alpibus Helveticis.» D:o.

X.150. »Petasites major et vulgaris Bauh. Tussilago major Matth. Pestilentzwurtz. In Lusatia, Misnia, Seelandia.» *Petasites officinalis* Moench.

X.151. »Petasites major alius incanior. Supra Hamburgum ad Albim copiosissime.» Ein Blatt, wahrscheinlich von d:o.

X.152. »Præcedentis folium maius (darüber: mediocre), sed non nisi dimidiatum. Ibidem.» D:o.

X.153. »Petasites minor Bauh. Petasites flore albo Cam. in Ep. Matth. In Bohemia, Helvetia.» *Petasites albus* (L.) Gaertn.

X.154. »Cacalia tomentosa Bauh. Cacaliæ congener planta Clus. Est Tussilaginis species major: nam primo vere florem p(ro)ducit, qui postea in pappum abit. In Helvetia et Austria sup(er)iori.» Steriler Spross, wohl von *Petasites niveus* (Vill.) Baumg.

X.155. »Cacalia foliis crassis Bauh. Non est hirsuta. In montibus Austriæ.» Blatt einer *Adenostyles*.

X.156. »Cacalia folio crasso, flore albo. In Pilato Lucernatum Helvetiæ.» *Adenostyles alpina* (L.) Bl. & Fing. (Studien, p. 70.)

X.157. »Cacalia foliis cutaneis acutioribus et glabris Bauh. In Austria superiori.» D:o.

X.158. »Eadem cum præcedente. In Helvetia bey der Wasserfall. et Comitatu Tyrolensi.» D:o.

X.159. »Lappa major Bauh. Personata Lob. grosse kletten. Passim.» Dürfte *Lappa minor* DC. sein.

X.160. »Lappa major montana, (capitulis) tomentosis Bauh. In Lusatia, Misnia &c.» Sehr beschädigt, wahrscheinlich *Lappa tomentosa* Lam.

X.161. »Lappa minor, Xanthium Dioscoridis Bauh. Bettlers Leuse. In Lusatia, Bohemia, Helvetia, Dania.» *Xanthium strumarium* L.

VOLUMEN XI.

Horti sicci seu stirpivm, studio et labore D. Ioachimi Burseri Camentio-Lusati, in Regia Nobilium Academia Sorana Medici et Phys. profess. publ. per diversas regiones et loca collectarum et iuxta seriem Pinacis Bauhiniani digestarum Volumen XI. continens Sectionem 1. et 2. libri sexti Pinacis illius.

XI.1. »Viola Martia purpurea, flore simplici odoro Bauh. Blauwe Violen. In Lusatia, Bohemia, Helvetia, Dania &c.» *Viola odorata* L.

XI.2. »Viola Martia inodora sylvestris Bauh. Viola canina Tab. Hundes-Violen. In Lusatia, Misnia, Dania &c.» *Viola silvestris* Lam.-Rchb.

XI.3. »Viola sylvestris pusilla flore pallido. Ingolstadii.» Rechts *Viola rupestris* Schmidt, links vielleicht *V. hirta* L.

XI.post 3. »Viola Martia inodora palustris. Sub argenteæ palustris nondum descriptæ nomine accepi ex Belgio.» *Viola palustris* L. (Studien, p. 70.)

XI.4. »Viola Martia alba Bauh. In hortis Lusatiæ, Misniæ.» Wahrscheinlich *Viola odorata* f. fl. albo.

XI.5. »Viola Martia multiplici flore Bauh. Viola purpurea multiplex Tab. Doppelte blauwe Violen. Dresdæ in hortis.» *Viola odorata* L.

XI.6. »Viola alpina purpurea exiguis foliis Bauh. In alpibus passim.» *Viola calcarata* L.

XI.7. »Viola alpina rotundifolia lutea Bauh. In alpibus Styriæ, Gothardo, Rhætiæ, Pyrenæis.» *Viola biflora* L.

XI.8. »Viola tricolor erecta latifolia Brasiliana. Apud Toupinambaultios legit pharmacopæus, Lutetiamque attulit.» *Viola canadensis* L. (Studien, p. 70.)

XI.9. »Viola tricolor erecta, an Iovis flos Theophrasti? Bauh. Viola Martia surrectis cauliculis Lob. Wildt Freysamkrautt. Ingolstadii sponte.» *Viola elatior* Fr.

XI.10. »Viola montana tricolor odoratissima Bauh. Basileæ in horto.» *Viola tricolor* L. var. *hortensis* DC.

XI.11. »Viola tricolor hortensis repens Bauh. Herba Trinitatis Trago. Freysamkrautt. Zahme Stieffmütterlein. In hortis Misniæ.» D:o.

XI.12. »Viola bicolor arvensis Bauh. Viola Trinitatis minor petræa Tab. In Lusatia, Bavaria, Dania.» *Viola tricolor* L. (nich arvensis Murr.).

XI.13. »Viola montana lutea grandiflora Bauh. geel bergk Veijel. In Pilato Lucernatum.» Ein Exemplar ist *Viola grandiflora* L., zwei andere dürften *V. saxatilis* Schmidt sein.

XI.14. »Viola montana floribus albis. In Pyrenæis.» *Viola cornuta* L.

XI.15. »Leucoium incanum maius Bauh. gross Welsche Veijel. Florentiæ in horto.» *Matthiola incana* (L.) R. Br.

XI.16. »Leucoium purpureum vel rubrum Bauh. In Italia.» D:o.

XI.17. »An sit idem cum præcedente? In Italia.» D:o.

XI.18. »Leucoium incanum minus Bauh. Weisse Veijel. In hortis Misniæ, Daniæ &c.» D:o.

XI.19. »Leucoium violaceum Tab. In hortis.» D:o.

XI.20. »Leucoium album Tab. In hortis.» D:o.

XI.21. »Leucoium incanum maius multiplex Bauh. Doppelt weisse Veijel. Florentiæ in hortis.» D:o.

XI.22. »Leucoium incanum maius multiplex purpureo flore. Basileæ in hortis.» D:o.

XI.23. a) »Leucoium incanum maius multiplex rubro flore. Lipsiæ in horto Deurlingi.» D:o. b) »Leucoium incanum maius carneo flore multiplex. Argentorati in horto D. Oberndorfferi.» D:o.

XI.24. »Leucoium incanum maius multiplex rubro flore diluto. Basileæ in hortis.» D:o.

XI.25. »Leucoium maritimum sinuato folio Bauh. Meer Veijel. In littore non longe Monspelio, ad pagum Perault.» *Matthiola sinuata* (L.) R. Br.

XI.26. »Leucoium maritimum angustifolium Bauh. Leucoium marinum minus Clus. Eodem quo præcedens loco.» *Malcolmia littorea* (L.) R. Br.

XI.27. »An Leucoium maritimum candidum Bauh. Folia prorsus glabra. In monte Ceto, non longe Monspelio.» Dürfte *Matthiola glabrata* DC. sein.

XI.28. »Leucoium maritimum minimum Bauh. Prope tuguriola (aux Cabanes) prope Insulas stæchadas.» Dürfte *Malcolmia parviflora* DC. sein. (Studien, p. 71.)

XI.29. »Leucoium Alyssoides clypeatum maius Bauh. Alyssum Dioscoridis putatum Lob. Lipsiæ et Basileæ in hortis.» *Farsetia clypeata* (L.) R. Br.

XI.30. »Leucoium incanum siliquis rotundis Bauh. Leucoium maximum Patavinum Lob. gross geel meer veijel. Basileæ in hort.» *Vesicaria sinuata* (L.) Poir.

XI.31. »Haud dubie idem cum præcedente, prout sponte provenit. Prope Welckium oppidum Austriæ in saxis ad Danubium.» *Alyssum saxatile* L.

XI.32. »Leucoium parvum arvense vernum. An Leucoium luteum sylvestre Hieracifolium Bauh? Sæpe sat alte excrescit. In arvis Bohemiæ.» *Erysimum repandum* L. und Reste von Exemplaren einer anderen Art.

XI.33. »Leucoium luteum vulgare Bauh. geel Veijel. In hortis.» *Cheiranthus cheiri* L.

XI.34. »Leucoium luteum pleno flore maius Bauh. doppelt gele Veijel. Giessæ, Basileæ, Florentiæ, Argentorati in hortis.» D:o.

XI.35. »Leucoium luteum sylvestre angustifolium Bauh. In Vallesia et ad speluncam D. Magdalenæ in Gallia Narbonensi.» *Erysimum longifolium* DC.

XI.36. »Præcedenti ramosius est et floribus ac foliis minoribus. In Thuringia.» *Erysimum hieracifolium* L.

XI.37. »Hesperis hortensis Bauh. Viola hyemalis purpurea Tab. braun Wintter veyeln. Damaschkenblumen. Ad Pyrenæos sponte, alias in hortis passim.» *Hesperis matronalis* L.

XI.38. »Viola hyemalis alba Tab. Weiss Wintterveijel. Weisse Damaschkenblumen. In hortis passim. *Hesperis matronalis* L. (Studien, p. 71.)

XI.39. »Viola hyemalis asperioribus, latioribus, magisque sinuatis foliis. Lutetiæ in horto pulverum.» D:o.

XI.40. »Hesperis montana pallida odoratissima Bauh. Hesperis I. Clus. Argentorati in horto D. Oberndorfferi.» *Hesperis tristis* L.

XI.41. »Hesperis sylvestris flore parvo Bauh. In monte Calcaris ad rivum delabentem.» *Arabis cebennensis* DC. (Studien, p. 71.)

XI.42. »Hesperis sylvestris hirsuta, foliis Hieracii Bauh. Ad speluncam D. Magdalenæ in GalloProvincia.» *Hesperis laciniata* All. (Studien, p. 71.)

XI.43. »Viola lunaris major siliqua rotunda Bauh. Lunaria Græca, Bolbonac Lob. Monveijel. In hortis Misniæ, Daniæ &c.» *Lunaria annua* L.

XI.44. »Viola Lunaria major, siliqua oblonga Bauh. Viola lunaris 2. Tab. In monte Peloro, Annæbergæ vicino, item in Thuringia, sponte.» *Lunaria rediviva* L.

XI.45. »Lychnis hirsuta flore coccineo major Bauh. Lychnis Chalcedonica miniata Lob. Feuwer Neglin. In hortis Misniæ, Bohemiæ, Daniæ.» *Lychnis chalcedonica* L.

XI.46. »Lychnis Chalcedonica floribus incarnatis. Lipsiæ et Basileæ in hortis.» D:o.

XI.47. »Lychnis coronaria Dioscoridis sativa Bauh. Margenröslin, Sammetblumen. In hortis Lusatiæ, Misniæ, Daniæ &c.» *Lychnis coronaria* (L.) Lam.

XI.48. »Lychnis coronaria alba Tab. Weisse Sammetblumen. Parisiis in horto pulverum &c. et in hortis Daniæ.» D:o.

XI.49. »Lychnis coronaria sativa multiplex Bauh. Doppelte Sammetblumen. Florentiæ in hortis.» D:o.

XI.50. »Lychnis sylvestris alba simplex Bauh. Ocimoides sive Ocimastrum Tab. Weiss Widerstoss. In Lusatia, Bohemia, Dania &c.» *Melandrium album* (Mill.) Gcke.

XI.51. »Lychnis alba multiplex Bauh. Doppelt weiss Widerstoss. Lipsiæ in hortis. Ocymastrum multiflorum Tab.» D:o.

XI.52. »Lychnis sylvestris sive aquatica purpurea simplex Bauh. Ocymastrum rubrum Tab. Rot Widerstoss. In sylvis Misniæ, Daniæ, item Heidelbergæ in ascensu ad arcem.» *Melandrium rubrum* (Weig.) Gcke und *M. album*.

XI.53. »Lychnis purpurea multiplex Bauh. Ocymoides flore pleno Cam. in Epit. Heidelbergæ in horto, ut et in horto Regio Hafniensi.» *Melandrium rubrum* (Weig.) Gcke.

XI.54. »Lychnis segetum major Bauh. Pseudomelanthium Lob. Rade. In Lusatia, Bohemia, Dania &c.» *Agrostemma githago* L.

XI.55. »Lychnis segetum rubra, foliis Perfoliatae Bauh. Isatis syl. Vaccaria dicta Lob. Lidweich. Basileæ sponte: alioq(uin) in hortis passim. *Vaccaria segetalis* (Neck.) Ccke.

XI.56. »Lychnis sylvestris, quæ Been album vulgo Bauh. Spumeum papaver vulgo Lob. Spisspettel. Knirrkrautt. In Lusatia, Helvetia, Bohemia, Dania.» *Silene inflata* Sm.

XI.57. »Lychnis sylvestris latifolia caliculis turgidis striatis Bauh. In Lusatia, Helvetia.» *Silene conoidea* L.

XI.58. »Lychnis sylvestris angustifolia calyculis turgidis striatis Bauh. Moguntiæ, Parisiis, Massiliæ. Wilde Himmelsrösslein.» *Silene conica* L.

XI.59. »Lychnis frutescens myrtifolia, Been albo similis Bauh. Ocimoides fruticosum Camer. Pisis in horto, Genuæ sponte.» Steril, wahrscheinlich *Silene fruticosa* L.

XI.60. »Lychnis noctiflora Bauh. Ocimoides noctiflorum Camer. in horto. In Lusatia.» Scheint eine Schattenform von *Melandrium* album oder urbrum zu sein (nicht Silene noctiflora).

XI.61. »Lychnis incana foliis crassis, calyculis striatis, floribus pallidis tenuiter incisis, in spicam (binis semper co oppositis) concinnatis, staminibus longe eminentibus &c. Proxime urbem Saatz Bohemiæ, in margine horti lupulini.» *Silene viscosa* (L.) Pers. (Studien, p. 72.)

XI.62. »Lychnis montana viscosa alba latifolia Bauh. Lychnis syl. Tabern. Weisse Pechblumen. In Lusatia, Misnia, Dania.» *Silene nutans* L.

XI.63. »Lychnis viscosa alba angustifolia major Bauh. Prope oppidum Eisenertz Styriæ in monte.» *Silene alpestris* Jacq. (Studien, p. 72.)

XI.64. »Lychnis sylvestris viscosa rubra angustifolia Bauh. Lychnis syl. purpurea Tab. Rote Pechblumen. In Lusatia, Bavaria, Helvetia &c. Dania.» *Viscaria vulgaris* Röhl.

XI.65. »Lychnis sylvestris viscida angustifolia erecta ramosa, caule folioso &c. Non procul Tolosa Galliæ Narbonensis.» *Silene muscipula* L. (Studien, p. 73.)

XI.66. »Lychnis viscosa purpurea latifolia lævis Bauh. Viscaria sativa, Muscaria Tab. Zam leimkrautt. In hortis Lusatiæ, Misniæ, Daniæ &c.» *Silene armeria* L.

XI.67. »Viscaria sativa flore albo. In hortis Lipsiæ, Daniæ &c.» D:o.

XI.68. »Lychnis viscosa flore muscoso Bauh. Sesamoides magnum Salmanticum Clus. Otites Tab. Ohrlöfflinkrautt. Wittebergae, In Vallesia etc.» *Silene otites* (L.) Sm.

XI.69. »Idem cum præcedente. Folia t(ame)n latiora obtinet, ac cum Clusii figura melius convenit. In GalloProvincia.» D:o.

XI.70. »An Lychnidi præcedenti affinis foliis lini Bauh. In Italia inter segetes.» Schlecht erhalten, dürfte *Silene cretica* L. sein.

XI.71. »Lychnis Auriculæ ursi facie Bauh. Lychnis syl. latifolia Clus. Dedit Bauhinus Basileæ.» Nur eine Blattrosette.

XI.72. »Lychnis sylvestris lanuginosa major Bauh. himmelrösslin. In Lusatia, Italia, Gallia. Lychnis sylvestris hirta Lob.» *Silene gallica* L.

XI.73. »Lychnis sylvestris minima exiguo flore Bauh. In Thuringia et Italia. Videtur Centaurium minus.» Ist eine *Erythraea*, ähnlich linariifolia Pers. (Studien, p. 74.)

XI.74. »Videtur eadem cum præcedente, licet ramos habeat varie inflexos &c. Florentiæ in margine agri miliaris.» *Velezia rigida* L. (Studien, p. 74.)

XI.75. »Lychnis vel Ocimoides repens montanum Bauh. Ocimoides repens Polygoni folio Lob. In Italia, et Gallia Narbonensi sponte.» *Saponaria ocymoides* L.

XI.76. »Lychnis pumila saxatilis alpina flore carneo, folio crasso molli tomentoso &c. In Vallesiæ monte arenoso et saxeo non procul a Gletzscherbergk.» *Silene vallesia* L. (Studien, p. 74.)

XI.77. »Lychnis alpina pumila folio gramineo sive Muscus alpinus Lychnidis flore Bauh. Ocimoides muscosus Ponæ. In alpibus Helvet. Rhæt. Austr. Pyrenæis.» *Silene acaulis* L.

XI.78. »Saponaria major lævis Bauh. Seyffenkrautt. In Lusatia, Bohemia, Seelandia.» *Saponaria officinalis* L.

XI.79. »Caryophyllus altilis major Bauh. grosse Neglin. In hortis passim.» *Dianthus caryophyllus* L.

XI.post 79. »Caryophyllus altilis major e nigro purpurascens. In hort.» D:o.

XI.80. »Caryophyllus altilis major flore variegato. In hortis Misniæ.» D:o.

XI.81. »Caryophyllus altilis flore semipleno, eoque carneo. In hortis Misniæ. D:o.

XI.82. »Caryophyllus altilis semipleno flore albo. In hortis Misniæ.» D:o.

XI.83. »Caryophyllus hortensis simplex flore majore Bauh. In hortis Misniæ &c.» D:o.

XI.post 83 (a). »Caryophyllus hortensis simplex variegatus. In hort.» D:o.

XI.post 83 (b). »Caryophyllus arborescens Creticus Bauh. Ex horto Robini, Botanici Parisiensis.» D:o.

XI.84. »Caryophyllus simplex flore minore pallide rubente Bauh. In hortis.» D:o.

XI.85. »Caryophyllus simplex supinus angustifolius Bauh. Caryophyllus virgineus Tab. Jungfer Neglin. In hortis passim.» Ist *Dianthus furcatus* Balb. ähnlich, hat aber tiefer eingeschnittene Blumenblätter.

XI.86. »Caryophyllus barbatus hortensis latifolius Bauh. Scharlachblumen. Cartheuser neglin. In hortis Germaniæ, Daniæ &c. Caryophyllus Carthusianorum Tab.» *Dianthus barbatus* L.

XI.87. »Caryophyllus barbatus hortensis angustifolius Bauh. Florentiæ, Heidelbergæ &c. in hortis.» D:o.

XI.88. »Caryophyllus barbatus hortensis angustifolius albo flore. Basileæ in hortis.» D:o.

XI.89. Caryophyllus barbatus sylvestris Bauh. In Germania, Dania, Italia sponte.» *Dianthus armeria* L.

XI.90. »Caryophyllus sylvestris prolifer Bauh. Caryoph. syl. minimus Tab. kleine wilde neglin. In Lusatia, Helvetia &c.» *Tunica prolifera* (L.) Scop.

XI.91. »Caryophyllo prolifero affinis, unico ex quolibet capitulo flore Bauh. In Misnia.» D:o (Dianthus diminutus L.).

XI.92. »Caryophyllus syl. vulgaris latifolius Bauh. Donderneglin. In Thuringia.» *Dianthus carthusianorum* L.

XI.93. »Caryophyll. syl. latifolius flore albo. In Thuringia.» D:o.

XI.94. »Caryophyllus syl. vulgaris angustifolius Bauh. Passim.» *Dianthus deltoides* L.

XI.95. »Caryophyllus pumilus latifolius Bauh. In monte Reichenstein prope oppidum

Eisenertz Styriæ.» *Dianthus alpinus* L. (Studien, p. 75; dort steht irrtümlich »Riesenstein»).

XI.96. An Caryophyllus syl. humilis flore unico Bauh? Monspelii sponte.» Zwei Arten, nur mit Blütenknospen, die eine ist vielleicht *Dianthus virgineus* L.

XI.97. »Caryophyllus cæruleus Monspeliensium Bauh. Aphyllanthes Monspeliensis Advers. Monspelii sponte.» *Aphyllanthes monspeliensis* L.

XI.98. »Caryophyllus præcedenti similis Brasiliana. Apud Toupinambaultios legit Pharmacopæus q(ui)dam Lutetianus, mihique co(mmun)icavit.» *Sisyrinchium angustifolium* Mill.

XI.99. »Caryophyllus sylvestris repens multiflorus Bauh. Monspelii sponte.» *Dianthus virgineus* L. (Studien, p. 75.)

XI.100. »Caryophyllus flore tenuissime dissecto Bauh. Federnelcken. Superba Trag. In hortis Lusatiæ.» *Dianthus superbus* L.

XI.101. »Caryophyllus syl. flore laciniato albo inodoro Bauh. In hortis Lusatiæ.» Dürfte *Dianthus plumarius* L. oder *serotinus* W. & K. sein.

XI.102. »Caryophyllus syl. alter flore laciniato odoratissimo Bauh. In Thuringia, Dania &c. sponte.» *Dianthus superbus* L.

XI.103. »Caryophyllus pratensis flore laciniato simplici, sive Flos Cuculi Bauh. Gauchblum. In Lusatia, Bohemia, Helvetia, Dania &c.» *Lychnis flos cuculi* L.

XI.104. »Caryophyllus pratensis sive Flos cuculi albo flore. In Lusatia, Dania.» D:o.

XI.105. »Caryophyllus pratensis pleno flore Bauh. Odontites Plinii pleno flore Clus. Margarita Venetorum Lipsiæ vocabatur. Margenröslin. Lipsiæ in hortis.» D:o, fl. pleno.

XI.106. »Caryophyllus arvensis hirsutus flore majore Bauh. Holosteum caryophyllaceum Tab. Weiss Neglingrass. In Lusatia, Gallia, Dania.» *Cerastium arvense* L.

XI.post 106. »Caryophyllus holosteus tomentosus latifolius Bauh. Lychnidis Americanæ nomine accepi ex horto Lugdunensi.» *Cerastium tomentosum* L.

XI.107. »Caryophyllus holostius tomentosus angustifolius Bauh. Pisis et Viennæ in hort.» D:o.

XI.post 107. »Estne idem cum præcedente? Ex horto Leydensi.» Steril, scheint dieselbe Art zu sein.

XI.108. »Caryophyllus umbellatus folio glabro Bauh. Holostium caryophyllaceum arvense Tab. In Lusatia, Bohemia, Helvetia. Weiss Ackerneglingrass.» *Holosteum umbellatum* L.

XI.109. »Caryophyllus arvensis glaber flore majore Bauh. Gramen floridum majus Tab. Augentrostgrass. gross Blumengrass. In Lusatia, Misnia, Dania. *Stellaria holostea* L.

XI.110. »Caryophyllus arvensis alius, foliis angustioribus, non ita flaventibus. In Austria.» *Stellaria graminea* L. (Studien, p. 75.)

XI.111. »Caryophyllus arvensis glaber flore minore Bauh. Gramen floridum minus Tab. In Misnia, Lusatia, Bohemia.» D:o.

XI.112. »Præcedenti affinis. Alsine vera Dalechampii. Quamvis hanc Bauhinus existimet e(ss)e illum Caryophyllum, quem Tabernæmontanus appellat Holosteum caryophyllaceum arvense, paullo ante. Prope Giessam, et Mediolanum.» *Cerastium manticum* L.

XI.113. »Caryophyllus arvensis glaber minimus Bauh. Pingit in Prodromo. Prope Wisebaden infra Moguntiam, unde Bauhino transmisi. etiam in Fionia.» *Aira caryophyllea* L.

XI.114. »Caryophyllus holosteus alpinus latifolius Bauh. Prope Thermas Fabarias Helvetior. in altissimo monte.» Zwei Formen von *Cerastium latifolium* L. (Studien, p. 75.)

XI.115. »Præcedenti similis, sed angustioribus foliis. In alpibus Austriæ.» Ein *Cerastium*, mit alpinum oder latifolium verwandt.

XI.116. »Caryophyllus holosteus alpinus angustifolius Bauh. Habebat florem carnei coloris. In Pyrenæis Hispaniam versus.» *Arenaria purpurascens* Ram. (Studien, p. 75.)

XI.117. »Caryophyllus holosteus alpinus gramineus Bauh. In alpibus Helveticis et Austriacis.» *Silene quadridentata* (L.) Pers. (Studien, p. 76.)

XI.118. »Caryophyllus holostius montanus angustifolius alter Bauh. Versus Hortum Dei.» *Arenaria montana* L. (Studien, p. 76.)

XI.119. »Caryophyllus holostius alpinus, foliolis strictis, brevibus glabris, acutis, flore magno Gc. In Alpibus Austriæ.» *Arenaria grandiflora* L. (Studien, p. 76).

XI.120. »Caryophyllus montanus major flore globoso Bauh. gross Meergrass. In Pyrenæis, alpibus Austriacis. Gramen marinum maius Tab.» *Armeria alpina* Willd.

XI.121. »Caryophyllus montanus folio latiore Plantaginis nervoso &c. Monspelii et ad speluncam Divæ Magdalenæ.» *Armeria plantaginea* (All.) Willd. (Studien, p. 77.)

XI.122. »Caryophyllus montanus minor Bauh. Gramen marinum minus Tab. Lipsiæ, Lutetiæ &c. In Dania.» *Armeria vulgaris* Willd.

XI.123. »Caryophyllus montanus minimus. Basileæ dedit Urstisius, Londini Anglor. in horto lectum.» *Armeria maritima* (Mill.) Willd.

XI.124. »Caryophyllus marinus pumilio reptans &c. Prope Coldingborgum Seelandiæ in littore.» *Littorella uniflora* (L.) Asch. (Studien, p. 77.)

XI.125. »Caryophyllus saxatilis foliis gramineis, umbellatis corymbis Bauh. Symphytum petræum vel γυψοφυλον maius Thalii. Franckenhusii Thuringiæ.» *Gysophila fastigiata* L.

XI.126. »Caryophyllls saxatilus, foliis gramineis minor Bauh. Symphytum petræum minus Thalii. In Austriæ, Helvetiæ etc. montibus.» *Gypsophila repens* L. (Studien, p. 77.)

XI.127. »Cum præcedente idem, sed strigosior. In Pyrenæis.» D:o.

XI.128. »Caryophyllus saxifragus Bauh. Saxifragam magnam Matth. et Lob. existere affirmabat mihi ipse Bauhinus: alioquin competit figuræ Saxifragiæ antiquorum in Advers. Prope Massiliam in montibus.» *Silene saxifraga* L.

XI.129. »Caryophyllus saxatilis, Polygoni minoris (quod Herbam Cancri vocant) foliis et facie, floribus albis tanquam in umbella positis &c. Saxifragæ Anglicæ Advers. figuræ quadrare videtur, quam t(ame)n pro Polygono habet Bauhinus. In Alpibus Austriæ et montibus Vallis Augustæ.» *Alsine laricifolia* (L.) Cr. (Studien, p. 77.)

XI.130. a) »Similis præcedenti, sed flosculos minores habens. In alpibus Austriæ. Vielleicht *Alsine austriaca* M. & K. b) »Similis superiori, sed glaber, nec ita umbellatus. In alpibus Austriæ.» *Alsine austriaca* M. & K.

XI.131. »Similis præcedentibus. In muris Valentiæ Gallorum.» Vielleicht *Alsine mucronata* L., aber nicht typisch.

XI.132. »Convenit cum antecedentibus. Nisi malis ad Alsinen referre. In monte Gletzscherbergk dicto a perpetuo durante ibi glacie.» *Alsine recurva* (All.) Wahlenb.

XI.133. »Nescio an sit idem cum superiori. In monte Gletzscherbergk.» *Alsine Cherleri* Fenzl.

XI.134. »Caryophyllus saxatilis Ericæfolius umbellatis corymbis Bauh. In vinea prope oppidum Vigan, qua Monspelio transit(ur) ad Hortum Dei. Inde Bauhino attuli.» *Arenaria aggregata* (L.) Lois. (Studien, p. 78.)

XI.135. »Caryophyllus saxatilis Ericæfolius ramosus repens Bauh. In Pyrenæis qua facie Hispaniam intuentur.» *Arenaria tetraquetra* L. (Studien, p. 78.)

XI.136. »Caryophyllus saxatilis foliolis acutis, rigidis, asperis, floribus Spergulæ &c. In monte Calcaris.» *Arenaria hispida* L. (Studien, p. 78.)

XI.137. »Caryophyllus minimus muralis Bauh. Tunica minima Lugdun. In arvis Misniæ, Helvetiæ &c.» *Gysophila muralis* L.

VOLUMEN XII.

Horti sicci seu stirpivm studio et labore D. Joachimi Burseri Camentio-Lusati, in Regia Nobilium Academia Sorana Medici et Physices prof. publ. per diversas regiones et loca collectarum et secundum seriem Pinacis Bauhiniani digestarum, Volumen XII. continens Sectionem 3. et 4. libri sexti illius Pinacis.

XII.1. »Antirrhinum maius rotundiore folio Bauh. Orandt. Sterkkrautt. In hortis Lusatiæ.» *Antirrhinum majus* L.

XII.2. »Antirrhinum maius alterum, folio longiore Bauh. In hortis Misniæ, Daniæ &c.» D:o.

XII.3. »Videtur idem cum præcedente. Florentiæ in mænibus sponte.» D:o.

XII.4. »Antirrhinum album Tab. Dresdæ in hortis.» D:o.

XII.5. »Antirrhinum luteo flore Bauh. Non procul Massilia sponte. Foliis subrotundis et hirsutis.» *Antirrhinum latifolium* DC.

XII.6. »Antirrhinum arvense maius Bauh. Hundesschedel. In Lusatia, Misnia, Bavaria, Helvetia, Dania.» *Antirrhinum orontium* L.

XII.7. »Antirrhinum arvense minus Bauh. In Misnia, Lusatia, Helvetia &c.» *Linaria minor* (L.) Desf.

XII.8. »Antirrhinum saxatile, foliis serpilli Bauh. Massiliæ in muris vetustis humectis. In Collendaneis (a la colle d'aniz) ad saxa, unde Bauhino attuli.» *Linaria origanifolia* (L.) DC. (Studien, p. 79.)

XII.9. »Antirrhinum saxatile foliis serpilli rotundioribus, flore majore, nonnihil hirsutum. In Pyrenæis Hispanicis.» D:o. (Studien, p. 79.)

XII.10. »Linaria latifolia Dalmatica magno flore Bauh. Florentiæ in hortis.» *Linaria dalmatica* (L.) Mill.

XII.11. »Linaria Americana, flore luteo Bauh. Accepi a Bauhino Basileæ.» Dürfte *Linaria genistifolia* var. *linifolia* (L.) Boiss. sein.

XII.12. »Linaria triphylla minor lutea Bauh. Linaria Valentina Clus. Lob. Basileæ in hort.» *Linaria triphylla* (L.) Mill.

XII.13. »Linaria Bellidis folio Bauh. Linaria odorata Clus. Figura e(st) in Prodromo. Ad montem Calcaris.» *Anarrhinum bellidifolium* (L.) Desf.

XII.14. »Linaria scoparia Bauh. Herba studiosorum Tab. Monspelii et Florentiæ in hortis.» *Kochia scoparia* (L.) Schrad.

XII.15. »Osyris frutescens baccifera Bauh. Casia Poëtica Monspeliens. Advers. Monspelii et Florentiæ sponte.» *Osyris alba* L.

XII.16. »Linaria vulgaris lutea, flore majore Bauh. Osyris major Tab. Harnkrautt. leinkrautt. In Lusatia, Helvetia, Dania.» *Linaria vulgaris* Mill.

XII.17. »Linaria lutea montana Genistæ tinctoriæ folio Bauh. Ad montem S. Bernhardt, qua parte Augustam Vallem spectat, unde Bauhino attuli.» *Linaria italica* Trevir. (Studien, p. 79.)

XII.18. »Linaria folioso capitulo luteo major Bauh. Osyris Austriaca Clus. Linaria aurea Tab. In Vallesia, Italia, Ungaria, GalloProvincia.» *Aster linosyris* (L.) Bernh.

XII.19. »Linaria folioso capitulo luteo minor Bauh. In Misnia.» D:o.

XII.20. »Linaria flore pallido rictu aureo Bauh. Linaria Pannonica major et I Clus. In Austria inferiori sponte.» Dürfte *Linaria genistifolia* (L.) Mill. sein.

XII.21. »Estne eadem cum præcedente? A parente.» Kaum bestimmbar.

XII.22. »Linaria purpurea major odorata Bauh. Linaria cærulea Camer. Lipsiæ in horto.» *Linaria purpurea* (L.) Mill.

XII.23. »Videtur eadem cum antecedente. Habet t(ame)n flore minores. Florentiæ in horto Magni Ducis.» *Linaria chalepensis* (L.) Mill.

XII.24. »Linaria capillaceo folio odora Bauh. Monspelii sponte.» *Linaria repens* (L.) Mill.

XII.25. »Linaria eadem cum præcedente, prout in hortum translata variat. Basileæ in horto Bauhini.» D:o.

XII.26. »Linaria arvensis cærulea Bauh. Linaria parva arvensis flore cæruleo Ioh. Franco. In arvis Lusatiæ.» *Linaria arvensis* (L.) Desf.

XII.27. »Linaria montana flosculis albicantibus Bauh. Linaria adulterina Tab. Ingolstadii, Basileæ &c.» Ein *Thesium, Th. montanum* Ehrh. ähnlich.

XII.28. »Linaria quadrifolia lutea Bauh. Linaria tetraphylla lutea Columnæ. In Gallo Provincia.» *Linaria arvensis* (L.) Mill.

XII.29. »Linaria pumila supina lutea Bauh. Osyris minor Tab. Non procul Tolosa Galliæ Narb.» *Linaria supina* (L.) Desf.

XII.30. »An Linaria foliis carnosis cinereis Bauh? Odorem habet Violæ Martiæ. In monte Lupi prope Monspelium.» *Linaria alpina* (L.) Mill.

XII.31. »Linaria cærulea arvensis Bauh. differens nonnihil ab ea, quæ sup(er)ius, q(ui)nto ab hinc folio postia e(st) Lusatia. In arvis GalloProvinciæ.» *Linaria Pelisseriana* (L.) Mill.

XII.32. »Linaria quadrifolia supina Bauh. Linaria Pannonica 2a, sive Linaria alpina pumila Clus. In Helvetia, Styria, Pyrinæis.» Ist vielleicht *Linaria petraea* Jord.

XII.33. »Linum sativum Bauh. Lein. Flachs. Passim.» *Linum usitatissimum* L.

XII.34. »Linum sylvestre cæruleum folio acuto Bauh. in prod. Linum syl. cæruleum, flore aureo Eid. in Pynace, ubi sine dubio e(st) sphalma typographicum. In montibus saxosis Galliæ Narbonensis, unde Bauhino attuli.» *Linum narbonense* L. (Studien, p. 79.)

XII.35. »Linum syl. cæruleum, folio acuto tenuiore et minore. Est planta æque perennis ut antecedens. In Gallia Narbonensi.» D:o. (Studien, p. 80.)

XII.36. »Linum syl. folio latiusculo, acuto, ex viridi flavescente, flore magno ruberrimo. In Gallia Narbonensi.» Dürfte eine rotblütige Form von *Linum alpinum* L. sein. (Studien, p. 80.)

XII.37. »Linum syl. latifolium luteum Bauh. Linum syl. Pannonicum Tab. In Calenberg et Badenæ Austriæ.» *Linum flavum* L.

XII.38. »Linum syl. luteum foliis subrotundis Bauh. Campanula lutea linifolia montis Lupi Advers. In GalloProvinciæ montibus.» *Linum campanulatum* L. (Studien, p. 80.)

XII.39. »Linum maritimum luteum Bauh. Linum marinum luteum Narbonense Lob. Monspelii. *Linum maritimum* L.

XII.40. »Chamælinum latifolium flavo flore: Nonnunquam t(ame)n flos albicat. Forentiæ sponte.» Dürfte *Linum liburnicum* Scop. sein. (Studien, p. 80.)

XII.41. »Linum syl. angustifolium flore magno Bauh. Linum syl. floribus albis Lob. In Gallia Narbonensi.» Dürfte *Linum salsoloides* Lam. sein.

XII.42. »Linum syl. angustifolium, floribus dilute purpurascentibus vel carneis Bauh. Prope Axellas (Aix) GalloProvinciæ.» D:o.

XII.43. »Linum sylvestre angustis et densioribus foliis, flore minore Bauh. Linum syl. tenuifolium Tab. Lob. Ingolstadii, Basileæ, In Italia, Gallia.» Dürfte *Linum tenuifolium* L. sein.

XII.44. »Linum syl. angustifolium, foliis rarioribus Bauh. Linum syl. II. Tab. In Austria inferiori.» *Linum austriacum* L.

XII.45. »Estne idem cum præcedente? In prato non longe Monspelio.» Vielleicht *Linum angustifolium* Huds.

XII.46. »Linum syl. minus Bauh. Linum syl. 5. Clus. pann. Flosculi sunt lutei, nec descriptu Clusii quoad folia quadrat. Considera an Florentinum supra folio abhinc sexto positum, sit cum hoc idem. q(uam)vis h(ui)us folia sint strictissima. Nisi cum maritimo idem velis. In Ceto Monspeliensi.» *Linum gallicum* L.

XII.47. »Linum minimum stellatum Bauh. Non procul Monspelio in saxoso monte, unde Bauhino transmiseram nomine Passerinæ minimæ saxatilis.» *Asterolinum linum stellatum* (L.) Duby.

XII.48. »Polygala major Bauh. Polygala major purpurea Tab. grosse Creutzblum. In Calenberg et prope Badenam Austriæ.» *Polygala vulgaris* L.

XII.49. »Polygala vulgaris Bauh. Polygala cærulea Tab. blauwe Creutzblümlin. In Germania (præcipue in Bavaria, alte excrescit et recta) Gallia, Dania.» *Polygala comosa* Schkuhr.

XII.50. »Polygala purpurea Tab. Braune Creutzblümlin. Ingolstadii. &c.» D:o.

XII.51. »Polygala alba Tab. Weisse Creutzblümlin. Ingolstadii &c.» *Polygala comosa* Schkuhr und *P. serpyllacea* Weihe.

XII.52. »Polygala lutea Bauh. gelbe Creutzblümlin. Non procul Florentiæ in monte.» Kann nicht Polygala monspeliaca L. sein, sondern wahrscheinlich *comosa*. Die Angabe über die Farbe scheint mir dubiös.

XII.53. »Polygala repens nivea Bauh. Krichende Creutzblümlin. In Lusatia.» *Illecebrum verticillatum* L.

XII.54. »Onobrychis arvensis, vel Campanula arvensis erecta Bauh. Viola arvensis, item Pentagonion Tab. Frauwen spiegel. Fünffeckichte veyel. In Bavaria, Helvetia.» *Campanula speculum* L.

XII.55. »Onobrychis arvensis flore albo. Basileæ.» D:o.

XII.56. »Glaux maritima Bauh. Glaux marina minor Tab. Ad mare Balticum Roschildiæ.» *Glaux maritima* L.

XII.57. »Glaux latiore folio Thuringiaca Bauh. Non habet latiora folia quam præcedens, quamvis in Thuringia legerim.» D:o.

XII.58. »Glaux, hauddubie in horto plantata. Annæbergæ accepi a Ludimoderatore.» D:o.

XII.59. »Alsine littoralis foliis Portulacæ Bauh. In Lolandia ad littus q(ui)d(e)m et

Roscheldiæ et alibi ad mare Balticum. Sedum maritimum a Medicis Rostochiensibus appellari relatum.» *Honckenya peploides* (L.) Ehrh.

XII.60. »Stoechas purpurea Bauh. Monspelii et prope Insulas stoechadas copiosissime, sed in ipsa Insula, quam perlustrabamus, nulla erat.» *Lavandula stoechas* L.

XII.61. »Stoechas flosculis albis. Prope Insulas Stoechadas.» D:o. (Studien, p. 80.)

XII.62. »Nomine Stoechadis accipiebam Basileæ a M. Urstisio, Londini Anglor. lectam. An Stoechas latifolia flore albo Bauh? Steril, Nicht bestimmbar.

XII.post 62. »Stoechas folio serrato Bauh. Stoechas crispo folio Clus. Ex horto Lugdunensi.» Steriler Ast von *Lavandula dentata* L.

XII.63. »Lavandula latifolia Bauh. lavandel. In hortis passim.» Dürfte *Lavandula vera* DC. sein.

XII.64. »Lavandula angustifolia Bauh. Spicke. In hortis.» *Lavandula vera* DC.

XII.65. »Lavandula folio dissecto Bauh. Lavandula multifido folio Clus. Lipsiæ in horto Medico.» *Lavandula multifida* L.

XII.66. »Rosmarinus hortensis angustiore folio Bauh. Rosmarin. In hortis passim.» *Rosmarinus officinalis* L.

XII.67. »Rosmarinus spontaneus latiore folio Bauh. Monspelii sponte.» D:o.

XII.68. »Rosmarinus spontaneus flore albo. Monspelii sponte.» D:o. (Studien, p. 80.)

Die Nummern 69—88 sind übersprungen.

XII.89. »Hyssopus officinar. cærulea sive spicata Bauh. Eisop. In Valle Augusta sponte.» *Hyssopus officinalis* L.

XII.90. »Hyssopus rubro flore Bauh. Hyssopus Arabum Tab. Roter Isop. In hortis Misniæ, Daniæ.» D:o.

XII.91. »Hyssopus vulgaris alba Bauh. Weisser Isop. In hortis passim.» D:o.

XII.92. »Hyssopus Cretica appellabatur Monspelii. An Hyssopus latifolia Bauh? Monspelii in horto Regio.» Vegetativer Spross von *Lythrum hyssopifolia* L.

XII.93. »Hyssopifolia Bauh. Hyssopoides Cam. in horto. Figura e(st) in Prodromo. Lipsiæ in paludibus.» *Lythrum hyssopifolia* L.

XII.94. »Hyssopifolia minima. Accepi Basileæ ab Urstisio.» D:o.

XII.95. »Satureia hortensis sive Cunila sativa Plinii Bauh. Satureij, Pfefferkrautt. Garttenhysop. In hortis passim.» *Satureja hortensis* L.

XII.96. »Satureia montana Bauh. Thymbra Tab. Florentiæ et Monspelii sponte.» *Satureja montana* L.

XII.97. »Satureia spicata Bauh. Satureia sive Thymbra vera S. Iuliani Advers. Florentiæ ad mænia.» *Satureja juliana* L.

XII.98. »Estne eadem cum præcedente? Florentiæ.» D:o.

XII.99. »Saxifragæ 2æ Matthioli nomine dedit Bauhinus Basileæ. An idem cum Satureia spicata Bauh?» D:o.

XII.post 99. »An Satureia Cretica Bauh? Thymum verum Dioscoridis nominabat Monachus, horti Præfectus. Pisis in horto Magni Ducis.» Steriler Zweig, vielleicht von *Thymbra spicata* L. (Studien, p. 81.)

XII.100. »An Satureia Thymi folio Bauh? A parente.» *Thymus vulgaris* L.

XII.101. »Thymus vulgaris folio tenuiore Bauh. Demuth Welscher Quendel. Florentiæ et Monspelii sponte.» D:o.

XII.102. »Thymus capitatus Bauh. Thymum lagitimum Clus. Basileæ co(mmun)icavit Reuchenius, Patavii acceptum.» *Thymus capitatus* (L.) Hffgg & Lk.

XII.103. »Thymum spinosum Creticum appellabat Monachus. In horto Pisano.» Steril, vielleicht *Satureja thymbra* L. (Studien, p. 81.)

XII.104. »Epithymum sive Cuscuta minor Bauh. Monspelii sponte.» Dürfte *Cuscuta epithymum* L. sein.

XII.105. »Cuscuta major Bauh. Nesselwinde. Flachsseyde. In Lusatia, Misnia, Helvetia, Dania &c.» *Cuscuta europaea* L.

XII.106. a) Epi Hyssopus. Non procul a S. Bernhardo.» Dürfte *Cuscuta epithymym* L. sein. b) »Epi Satureia. Ad S. Bernhardum.» D:o.

XII.107. »Epi Lavandula. Monspelii sponte.» D:o.

XII.108. »Epi Chamædrys. Prope S. Bernhardum.» D:o.

XII.109. »Epi Serpillum. Non procul a S. Bernhardo.» D:o.

XII.110. »Epi Erica. In Austria.» Dürfte *Cuscuta epithymum* L. sein.

XII.111. »Epi Gallium. Ad S. Bernhardum.» D:o.

XII.112. »Epi Tithymalus. Prope S. Bernhardum montem.» D:o.

XII.113. »Epi Dorycnium. In Austria.» Dürfte *Cuscuta Trifolii* Bab. sein.

XII.114. »Serpillum latifolium hirsutum Bauh. In Thuringia.» *Thymus serpyllum* L.

XII.115. »Serpillum vulgare maius Bauh. Quendel. Passim.» D:o.

XII.116. »Serpillum album Tab. In Misnia, Helvetia.» *Thymus chamaedrys* Fr.

XII.117. »Serpillum foliis citri odore Bauh. *Citronen Quendel.* Serpillum citratum Tab. In Lusatia, Misnia.» Wahrscheinlich *Thymus serpyllum* var. *citriodorus* (Schreb.).

XII.118. »Serpillum vulgare minus Bauh. Serpillum vulgare repens Clus. In Saxonia.» *Thymus serpyllum* var. *pannonicus* (All.).

XII.119. »Serpillum angustifolium hirsutum vel montanum repens hirsutum Bauh. Serpillum Pannonicum 3. Clus. In Vallesia.» *Thymus serpyllum* var. *lanuginosus* (Schkuhr).

XII.120. »Serpillum folio Thymi Bauh. Serpyllum Narbonense foliis et facie Thymi Lob. Prope Aixellas GalloProvinciæ.» *Thymus serpyllum* var. *angustifolius* (Pers.).

XII.121. »Polium Lavandulæ folio Bauh. In Thuringia, Bavaria, Helvetia.» *Teucrium montanum* L.

XII.122. »Polium montanum luteum Bauh. In GalloProvincia.» *Teucrium aureum* Schreb.

XII.123. »Polium montanum repens Bauh. Polium montanum minimum Tab. A parente.» *Teucrium montanum* var. *supinum* (L.).

XII.124. »Polium repens Imperati appellabatur a M. Miano, qui co(mmun)icabat Basileæ, sed Neapoli allatum. An sit idem cum p(ræ)cedente?» Steriler Spross.

XII.125. »Polium latifolium incanum Creticum Bauh. Basileæ dabat Reuchenius Patavio veniens.» *Teucrium polium* L.

XII.126. »Polium maritimum erectum Monspeliacum Bauh. Monspelii ad littus maris.» D:o.

XII.127. »Polium maritimum supinum Venetum Bauh. Basileæ dedit Bauhinus.» Steril, scheint *Teucrium montanum* L. zu sein.

XII.128. »Ageratum foliis serratis Bauh. Ackerbalsam. Klein Costenbalsam. Florentiæ sponte.» *Achillea ageratum* L.

XII.129. »Ageratum serratum alpinum Bauh. Ageratum purpureum Lugd. Prope Uri Helvetior. ut et in monte Wasserfall. Item in monte Calcaris versus oppidum Merues.» *Erinus alpinus* L.

XII.130. »Pulegium latifolium Bauh. Poleij. Pulegium regium Lob. Monspelii et Florentiæ sponte.» *Mentha pulegium* L.

XII.131. »Pulegium angustifolium Bauh. Pulegium angustifolium sive corvinum Lob. Monspelii sponte.» *Preslia cervina* (L.) Fres.

XII.132. »Dictamnus Creticus Bauh. Cretischer Diptam. Lipsiæ in horto Deurlingi.» *Origanum dictamnus* L.

XII.133. »Pseudodictamnus verticillatus inodorus Bauh. Lipsiæ et Florentiæ in hortis.» *Ballota pseudodictamnus* (L.) Benth.

XII.134. »Dictamnus albus vulgo, sive Fraxinella Bauh. Weisser Diptam. In hortis Lusatiæ, Misniæ &c. In Thuringia sponte.» *Dictamnus albus* L.

XII.135. »Origanum sylvestre, Cunila bubula Plinii Bauh. Wohlgemuth. braune Doste. In Germania, Dania &c.» *Origanum vulgare* L.

XII.136. »Origanum sylvestre album Bauh. In Misnia.» D:o.

XII.137. »Origanum sylvestre flore carneo. In Misnia.» D:o.

XII.138. »Origanum Heracleoticum Bauh. Lipsiæ in horto.» *Origanum vulgare* var., wohl zu var. *creticum* (L.) zu stellen.

XII.139. »Origanum Heracleoticum album. A parente.» D:o.

XII.140. »Origanum Creticum Bauh. Origanum Anglicorum Dod. Basileæ in horto Bauhini.» *Origanum onites* L.

XII.141. »Origanum onites Bauh. A parente.» D:o.

XII.142. »An Origanum onites floribus albicantibus Bauh? A parente.» *Origanum vulgare* L. var.

XII.143. »Origanum folio subrotundo Bauh. Origanum Monspeliacum Tab. Monspelii sponte.» *O. vulgare* var. *creticum* (L.).

XII.144. »Origanum folio subrotundo, flore albo. Monspelii sponte.» Dürfte eine weissblütige Form von *Origanum vulgare* var. *creticum* (L.) sein. (Studien, p. 81.)

XII.145. »Tragoriganum latifolium Bauh. Marum Matth. In Insulis stoechadibus sponte in copia. Florentiæ in horto Magni Ducis.» *Teucrium marum* L.

XII.146. »Tragoriganum Creticum Bauh. A parente.» *Satureja thymbra* L.

XII.147. »Samsuchus sive Marum, Mastichen redolens Bauh. Tragoriganum l. Clus. hist. Basileæ in horto.» *Thymus mastichina* L.

XII.148. »Majorana Syriaca vel Cretica Bauh. Marum Syriacum Tab. Basileæ dedit Mianus.» *Origanum maru* L.

XII.149. »Majorana tenuifolia Bauh. Klein Majoran. In hortis Lusatiæ, Bohemiæ &c.» *Origanum majorana* L.

XII.150. »Majorana vulgaris Bauh. Sampsuchus Lob. Majoran. In hortis passim. Majorana sive Amaracus major Tab.» D:o.

XII.151. »Majorana syl. perennis Bauh. Basileae dedit M. Urstisius Londino allatam, appellans Majoranam Anglicam folio luteo. Vide Bauh.» Steril.

XII.152. »Clinopodium Origano simile Bauh. Acinos Lob. Wirbel Dost. In Lusatia, Bohemia, Dania.» *Clinopodium vulgare* L.

XII.153. »Clinopodium arvense Ocymi facie Bauh. Acinos Dod. Steinpoleij. In Lusatia, Bavaria &c.» *Satureja acinos* (L.) Scheele.

XII.154. »Clinopodium arvense flosculis albis. In Rhætia prope Curiam metropolin et in Austria.» D:o.

XII.155. »Clinopodium montanum Bauh. Clinopodium Austriacum Clus. Florentiæ. In Austria. In alpibus Helveticis.» *Calamintha alpina* (L.) Lam.

XII.156. »Ocimum latifolium maculatum vel crispum Bauh. Ocymum crispum Hispan. Tab. Basilienkrautt. Monspelii in hortis. Pingitur in Prodromo.» Ein *Ocymum* mit eingeschnittenen, etwas krausen Blättern.

XII.157. »Ocimum caryophyllatum maximum Bauh. Monspelii in horto D. Du Rang.» *Ocymum basilicum* L.

XII.158. »Ocimum garyophyllatum maius Bauh. In hortis Lusatiæ, Misniæ, Daniæ.» D:o.

XII.159. »Ocimum citri odore Bauh. Ocimum medium sive citratum Tab. In hortis Misniæ.» *Ocymum.*

XII.160. »Ocimum vulgatius Bauh. In hortis passim.» Steril.

XII.post 160. »An Ocimum Anisi odore Bauh. Basilici Indici nomine venit ex horto Leydensi: q(uo)que nomine Clusius maculatum seu crispum dictum indigitat.» *Ocymum.*

XII.161. »Ocimum minimum Bauh. Ocimum minus garyophyllatum Tab. Basileæ in hortis.» Vielleicht *Ocymum minimum* L.

VOLUMEN XIII.

Horti sicci seu stirpivm, studio et labore D. Ioachimi Burseri, in Regia Nobilium Academia Sorana Medici et Phys. profess. publ. per diversas regiones et loca collectarum, et secundum seriem Pinacis Bauhiniani digestarum Volumen XIII. continens Sectionem 5. et 6. libri sexti Pinacis illius.

XIII.1. »Mentha hortensis corymbifera Bauh. Costus hortorum Lob. Balsammüntze. In hortis Germaniæ, Daniæ, Italiæ.» *Balsamita vulgaris* Willd.

XIII.2. »Mentha hortensis verticillata Ocymi odore Bauh. Mentha Romana angustifolia Lob. Lipsiæ in horto.» Scheint irgend ein *Mentha arvensis-viridis*-Bastard zu sein.

XIII.3. »Mentha crispa verticillata Bauh. Mentha vulgata rotundiore folio Lob. In hortis Lusatiæ, Daniæ &c. Krausemüntz.» Eine f. *crispa*, vielleicht eines Bastards von *M. arvensis* mit *viridis*.

XIII.4. »Mentha rotundifolia crispa spicata Bauh. Krause Müntze. In hortis Misniæ &c.» Dürfte *M. piperita* L. f. *crispa* sein.

XIII.5. »Mentha rotundifolia spicata altera Bauh. Monspelii sponte.» *Mentha rotundifolia* (L.) Huds.

XIII.6. »Mentha angustifolia spicata Bauh. Mentha acuta Tab. Basileæ in horto.» *Mentha viridis* L.

XIII.7. »Mentha spicata folio variegato Bauh. Mentastrum niveum Anglicum Lob. Florentiæ in horto.» Sterile Sprosse eibuntblättrigen *Mentha.*

XIII.post 7. »Menthastri nivei Anglici nomine allatum ex horto Leydensi. Videtur potius esse cattaria.» Junges Exemplar von *Nepeta nuda* L.

XIII.8. »Mentha sylvestris rotundiore folio Bauh. Mentastrum Tab. Fischmüntze.» In Bavaria sponte.» Ist vielleicht *Mentha rotundifolia* × *viridis.*

XIII.9. »Mentha sylvestris longiore folio Bauh. In Bohemia sponte.» *Mentha silvestris* L.

XIII.10. »Mentha montana verticillata Bauh. Menthastrum montanum Pannon. Clus. Lipsiæ in horto Deurlingi.» *Nepeta nuda* L. oder vielleicht deren var. *pannonica* (L.).

XIII.11. »Mentha tuberosa radice Bauh. Menthastrum tuberosa radice Clus. Lipsiæ in horto Deurlingi.» Junges Exemplar von *Nepeta nuda* L.

XIII.12. »Mentha rotundifolia palustris seu aquatica major Bauh. Calamintha aquatica Tabern. Bachmüntze. In Misnia, Helvetia, Dania.» *Mentha aquatica* L.

XIII.13. »Mentha cataria vulgaris et major Bauh. Katzenmüntz. Nept. In Thuringia, Seelandia. Nepeta vulgaris Tragi.» *Nepeta Cataria* L.

XIII.14. »Mentha cataria minor Bauh. Cataria tenuifolia Hispanica Clus. Lipsiæ in hort.» Rechts *Nepeta nepetella* L., links eine kleine *N. Cataria* L.

XIII.15. »Mentha cataria latifolia Bauh. Lipsiæ in horto Deurlingi.» *Nepeta Cataria* L.

XIII.16. »Mentha cataria angustifolia major Bauh. Lipsiæ in horto Deurlingi.» *Nepeta nepetella* L.

XIII.17. »Calamintha incana ocymi foliis Bauh. Monspelii sponte.» *Calamintha nepeta* (L.) Savi.

XIII.18. »Calamintha altera minoribus rugosioribusque foliis Ioh. Franco. In horto Camitiano(?).» *Calamintha nepeta* var. *nepetoides* (Jord.).

XIII.19. »Calamintha Pulegii odore, sive Nepeta Bauh. Bergmüntze. In hortis Lusatiæ, Misniæ.» D:o.

XIII.20. »Calamintha vulgaris, vel Officinarum Germaniæ Bauh. Basileæ sponte.» *Calamintha officinalis* Moench.

XIII.21. »Calamintha magno flore Bauh. Calamintha montana præstantior Lob. Edel Bergkmüntze. In hortis Lusatiæ, Helvetiæ, Italiæ.» *Calamintha grandiflora* (L.) Moench.

XIII.22. »Calamintha arvensis verticillata Bauh. Calamintha aquatica Matth. Ackermüntze. In Lusatia, Helvetia, Dania &c.» *Mentha arvensis* L.

XIII.23. »Melissa hortensis Bauh. Melissen. Bienenkrautt, Hertzensfreude. In hortis passim. Melissophyllum Tab.» *Melissa officinalis* L.

XIII.24. »Melissa peregrina folio oblongo Bauh. Melissa Turcica Tab. In hortis passim. Türckische Melisse.» *Dracocephalum moldavica* L.

XIII.25. »Melissa Turcica floribus albis. In hortis.» D:o.

XIII.26. »Melissa Moluccana odorata Bauh. Cardiaca Syriaca Tab. Syrisch Hertzgesperr. Basileæ in horto Bauh.» *Moluccella laevis* L.

XIII.27. »Melissa Moluccana fætida Bauh. Cardiaca Syriaca aspera Tab. Basileæ in horto Bauh.» *Moluccella spinosa* L.

XIII.28. »Marrubium Cardiaca dictum Bauh. Hertzgespan(?) Hertzgesperr. In Bavaria, Bohemia, Seelandia &c.» *Leonurus cardiaca* L.

XIII.29. »Cardiaca angustifolia et tenerior. Reor vix esse descriptam. In Bohemia.» *Leonurus marrubiastrum* L. (Studien, p. 81.)

XIII.30. »Marrubium palustre glabrum Bauh. Wasser Andorn. In Lusatia, Helvetia, Dania.» *Lycopus europaeus* L.

XIII.31. »Sideritis appellabatur Pisis a Monacho horti Præfecto. An Marrubium palustre hirsutum Bauh? Pisis in horto Magni Ducis.» Steriles Sprösschen, wahrscheinlich von *Lycopus exaltatus* L. f.

XIII.32. »Marrubium nigrum fætidum Bauh. Stickender Andorn. In Lusatia, Misnia, Helvetia, Seelandia. Ballote Matth. Marrubiastrum Tab.» *Ballota nigra* L.

XIII.33. »Marrubium nigrum humile. Nescio an descriptum. In oppido Bohemiæ Cadara prope ædes Carnificis.» *Ballota nigra* L. (Studien, p. 81.)

XIII.34. »Marrubium nigrum longifolium Bauh. Herba venti Rondeletii Lob. Monspelii sponte.» *Phlomis herba venti* L.

XIII.35. »Marrubium album vulgare Bauh. Weisser Andorn. In Germania, Dania &c.» *Marrubium vulgare* L.

XIII.36. »Marrubium album villosum Bauh. Parisiis sponte.» *Marrubium vulgare* β. *lanatum* Benth. Linné, Sp. Pl. Ed. II, p. 816, zitiert unter *M. vulgare* β.: »Burser.»

XIII.37. »An Marrubium album latifolium Bauh? Monspelii sponte.» Vegetative Sprosse von *Marrubium vulgare* L.

XIII.38. »Marrubium album angustifolium peregrinum Bauh. Marrubium Creticum Dod. Monspelii in horto Du Rang.» *Marrubium candidissimum* L.

XIII.39. »Marrubium pannonicum Clus. pann. An sit idem cum præcedente. In Austria inferiori sponte.» *Marrubium peregrinum* L.

XIII.40. »Lamium purpureum fætidum folio subrotundo Bauh. Taub nessel, Toder nessel. Passim. Galeopsis vulgaris fætens purpurea Lob.» *Lamium purpureum* L.

XIII.41. »Lamium purpureum non fætens folio oblongo Bauh. Toder nessel. Passim.» *Lamium maculatum* L.

XIII.42. »Lamium album Tab. Passim.» *Lamium album* L.

XIII.43. »Lamium vulgare luteo flore. In Lusatia, Misnia, Dania &c.» *Lamium galeobdolon* L.

XIII.post 43. »Lamium folio oblongo luteum Bauh. Urtica fatua aquatica Thalii πολύμορφος. In Lusatia, Misnia &c.» *Galeopsis speciosa* Mill.

XIII.44. »Lamium maculatum Bauh. Non nisi stigmatum ratione differt a Lamio luteo. In Lusatia, Misnia &c.» *Lamium galeobdolon* L., sterile Sprosse.

XIII.45. »An forsan Clusius hist. pann. p. 597. plantam hanc nomine Lamii III. hederæ terrestris folio proponere voluerit. Sed nec figura nec descriptio quadrat. In Gallo Provincia, non longe a Pyrenæis.» *Teucrium pyrenaicum* L.

XIII.46. »Lamium foliis caulem ambientibus maius Bauh. Marrubium χαμαιπελες Thalii. In Lusatia, Helvetia, Bohemia, Dania.» *Lamium amplexicaule* L.

XIII.47. »Lamium foliis caulem ambientibus flore albo. Monspelii.» D:o.

XIII.48. »Lamium maximum sylvaticum fætidum Bauh. Urtica Herculea Tab. Waldtnessel. In sylvis Misniæ, Helvetiæ, Daniæ &c.» *Stachys silvatica* L.

XIII.49. »Lamium montanum Melissæ folio Bauh. Melissophyllum Fuchsii. Florentiæ et Basileæ sponte. *Melittis melissophyllum* L.

XIII.50. »Lamium peregrinum sive Scutellaria Bauh. Florentiæ in hortis.» *Scutellaria peregrina* L.

XIII.51. »Videtur idem cum præcedente, nisi quod folia oblongiora, minus crassa &c. In Italia.» D:o var. *Columnae* (All.).

XIII.52. »Urtica urens maxima Bauh. grosse Brenn Nessel. Passim.» *Urtica dioica* L.

XIII.53. »Urtica urens brevioribus foliis, magis incisi &c. Florentiæ sponte. *Urtica atrovirens* Req. (Studien, p. 81.)

XIII.54. »Urtica urens minor Bauh. Heitter Nessel. Passim.» *Urtica urens* L.

XIII.55. »Urtica urens pilulas ferens Bauh. Urtica Romana Tab. Monspelii sponte.» *Urtica pilulifera* L.

XIII.56. »Urtica aculeata foliis serratis Bauh. Cannabis syl. spuria altera Lob. Wildt Hanpfkrautt. In arvis passim.» *Galeopsis tetrahit* L.

XIII.57. »Urtica aculeata foliis serratis altera Bauh. Alyssum arvense album Tab. In Lusatia, Misnia, Helvetia, Dania.» *Galeopsis dubia* Leers.

XIII.58. »Alyssum verticillatum foliis profunde incisis Bauh. Alysson Galeni Clus. Lob. Basileæ donavit Reuchenius, Patavii in horto lectum.» Kleiner steriler Spross, ohne Zweifel von *Marrubium alysson* L.

XIII.59. »Sideritis foliis hirsutis, profunde crenatis Bauh. Sideritis Monspeliaca scordioides Lob. Monspelii sponte.» *Sideritis hirsuta* L.

XIII.60. »Sideritis hirsuta procumbens altera Bauh. In Italia et Monspelii.» *Sideritis romana* L.

XIII.61. »Sideritis vulgaris hirsuta erecta Bauh. gliedekrautt. In Bavaria, Helvetia &c. Sideritis Heraclea Tab.» *Stachys recta* L.

XIII.62. »Sideritis alpina Hyssopifolia Bauh. In GalloProvincia.» *Sideritis hyssopifolia* L.

XIII.63. »Sideritis Alsine Trixaginis folio Bauh. In Seelandia.» *Stachys arvensis* L.

XIII.64. »Sideritis arvensis latifolia glabra Bauh. Alyssum maius Tab. Basileæ.» *Stachys annua* L.

XIII.65. »Sideritis arvensis angustifolia rubra Bauh. Ladanum segetum Plinii Lugd. Alyssum Galeni flore purpureo Tab. In Lusatia, Misnia, Helvetia &c.» *Galeopsis ladanum* L.

XIII.66. »Euphrasia Officinarum Bauh. Augentrost. Hirnkrautt, leuchte. Passim.» *Euphrasia brevipila* Burn. & Gr.

XIII.67. »Euphrasia alpina minima flosculis luteolis. In alpibus Helvetiæ.» *Euphrasia minima* Jacq. (Studien, p. 82.)

XIII.68. »Euphrasia pratensis rubra Bauh. Odontites Tab. Brauner augentrost. In Germania, Dania &c.» *Odontites rubra* Pers.

XIII.69. »Euphrasia pratensis Italica latifolia Bauh. Florentiæ prope arcem extra urbem.» *Bartsia latifolia* (L.) Sibth.

XIII.70. »Euphrasia Italica, latifolia altera Bauh. Hoc no(m)i(n)e dedit ipse Bauhinus.» D:o.

XIII.71. »Euphrasia cærulea Linariæ foliis. Nescio an descripta. Florentiæ sponte.» *Euphrasia tricuspidata* L. (Studien, p. 82.)

XIII.72. »Euphrasia pratensis lutea Bauh. gelber Augentrost. In Thuringia &c. Odontites flore luteo Tab.» *Odontites lutea* (L.) Rchb.

XIII.73. »Euphrasia lutea Alsinefolia, radice squamata Bauh. In alpibus Helveticis, Austriacis, Pyrenæis.» *Tozzia alpina* L. (Studien, p. 82.)

XIII.74. »Eadem cum præcedente. Prope Miete montem Helvetiæ.» D:o.

XIII.75. »Melampyrum purpurascente coma Bauh. Triticum vaccinum Dod. Kuheweitzen. In Germania, Dania &c.» *Melampyrum arvense* L.

XIII.76. »Melampyrum coma carnei coloris, alioqui non differens a p(ræ)cedente.» In Bavaria, Seelandia.» D:o.

XIII.77. »Melampyrum cærulea coma Bauh. Parietaria syl. I. Clus. Wildt Tag vnndt nachtkrautt. In Germania, Dania &c.» *Melampyrum nemorosum* L.

XIII.78. »Melampyrum luteum latifolium Bauh. Cratæogonon Lob. Waldt Hirsen In Lusatia, Misnia, Seelandia.» *Melampyrum pratense* L. (Studien, p. 82.)

XIII.79. »Melampyrum luteum alpinum. A præcedente differt exilitate, et foliorum angustia. In Sneeberg Austriæ inferioris.» *Melampyrum barbatum* W. &. K.

XIII.80. »Melampyrum luteum angustifolium Bauh. Melampyrum cristatum Iungermanni. In Thuringia, Seelandia.» *Melampyrum cristatum* L.

XIII.81. »Melampyrum luteum minimum Bauh. In GalloProvincia.» *Ceratocephalus falcatus* (L.) Pers.

XIII.82. »Melampyrum Brasilianum Cyanifolium. Liceat interim sic appellare plantam hanc, a pharmacopæo mihi datam Lutetiæ, quam apud Toupinambaultios legerat.» *Castilleja coccinea* (L.) Spreng. (Studien, p. 82, wo die Worte »interim» und »Lutetiæ» ausgefallen sind.)

XIII.83. »Betonica purpurea Bauh. Betonien. Bateninge. In Lusatia, Bohemia &c.» *Stachys officinalis* (L.) Trevis.

XIII.84. »Serratula Bauh. Serratula tinctoria Tabern. Scharttenkrautt. Farbenschartten. In Lusatia, Seelandia.» *Serratula tinctoria* L.

XIII.85 ist übersprungen.

XIII.86. »Videntur folia Serratulæ. Prope oppidum Merues ad montem Calcaris.» Blätter von *Serratula tinctoria* L.

XIII.87. »Serratula flore albo. In Thuringia.» Dieselbe Art.

XIII.(87 b). »Been album Officinarum. Non est nisi radix Papaveris spumei. Ex Officina.» Ein Stück Wurzelrinde. Das offizinelle Behen album soll von *Centaurea behen* L. herrühren. Sonst bezeichnen beide Namen *Silene inflata* Sm.

XIII.(87 c). »Been rubrum Officinarum. Videtur esse radix Valerianæ rubræ. Ex officina.» Nach Linnés Materia medica wäre »Behen rubrum» eine Statice aus Arabien. Valeriana rubra ist *Centranthus ruber* (L.) DC.

XIII.88. »Scrophularia nodosa fætida Bauh. Brauwnwurtz, Seuwwurtz, Rangwurtz. In Lusatia, Misnia, Seelandia &c.» *Scrophularia nodosa* L.

XIII.89. »Scrophularia aquatica major Bauh. Betonica aquatica Lob. In Bohemia, Seelandia.» *Scrophularia aquatica* L. var *appendiculata* Mér.

XIII.90. »Scrophularia folio Urticæ Bauh. Scrophularia peregrina Camer. Florentiæ et in GalloProvincia sponte.» *Scrophularia peregrina* L.

XIII.91. »Scrophularia flore luteo Bauh. Figura e(st) in Prodromo. Basileæ in hor. Habui et(iam) Soræ A(nn)o 1633.» *Scrophularia vernalis* L.

XIII.92. »Scrophularia foliis laciniatis Bauh. Hafniæ in horto D. Fürenii.» Steriler Spross, vielleicht von *Scrophularia sambucifolia* L.

XIII.93. »Scrophulariæ præcedentis flores decidui quæ Scrophularia Indica appellabatur. Parisiis in horto Robini.» Blumenkronen von *Scrophularia sambucifolia* L.

XIII.94. »Scrophularia, Ruta canina dicta, vulgaris Bauh. Sideritis III. Matth. Florentiæ sponte.» *Scrophularia canina* L. var. *dissecta*.

XIII.95. »Stachys major Germanica Bauh. Pseudostachys Matth. Feldt Andorn. In Lusatia, Misnia, Helvetia &c.» *Stachys germanica* L.

XIII.96. »Pseudostachys alpina Bauh. In monte Helvetior. Wasserfall. Prope Mommorancium oppidum Galliæ.» *Stachys alpina* L.

XIII.97. »Stachys minor Italica Bauh. Stachys spuria Flandror. Lob. Florentiæ in horto Monachorum.» *Sideritis syriaca* L. (oder *sicula* Ucr., die ich von *syriaca* nicht unterscheiden kann).

XIII.98. »Stachys spinosa Cretica Bauh. Reuchenius dedit Basileæ, allatam Patavio.» *Stachys spinosa* L.

XIII.99. »Videtur eadem cum præcedente. Florentiæ in horto.» *Stachys glutinosa* L.

XIII.100. »Stachys palustris fætida Bauh. Brauner Wasser Andorn. In Lusatia, Misnia, Seelandia &c.» *Stachys palustris* L.

XIII.101. »Salvia major Bauh. Salvia latifolia Trago. Salbeij. In Languedocia sponte, non longe Massilia.» *Salvia officinalis* L.

XIII.102. »Salvia nigra Bauh. Parisiis in horto pulverum.» Steriler Spross derselben Art.

XIII.103. »Salvia minor aurita et non aurita Bauh. Kreutz Salbeij. In hortis passim.» *Salvia triloba* L. f.

XIII.104. »Salvia minor altera Bauh. Salvia odore Absynthii. Basileæ in horto Heinzmanni.» Dürfte *Salvia officinalis* L. sein.

XIII.post 104. »Salvia folio tenuiore Bauh. Salvia Indica Tab. Ex horto medico Lugdunensi.» *Salvia triloba* L. f.

XIII.post 104 (bis). »An Salvia Cretica angustifolia Clusii? Salviæ arborescentis nomine accepi ex horto Leidensi.» Scheint mir *Salvia triloba* L. f. zu sein.

XIII.105. »Salvia baccifera Bauh. Salvia Cretica Tab. Florentiæ in hortis.» Scheint mir auch *S. triloba* zu sein.

XIII.106. »Horminum sativum Bauh. Römischer Scharlach. Florentiæ et Lipsiæ in hortis.» *Salvia horminum* L.

XIII.(106 bis). »Horminum sativum summitate rubra. Ex horto Leydensi.» Dieselbe Art.

XIII.107. »Horminum Syriacum Bauh. Lipsiæ in horto Deurlingi.» *Salvia spinosa* L.

XIII.108. »Horminum Sclarea dictum Bauh. Scharlach. In hortis passim. Florentiæ sponte.» *Salvia sclarea* L.

XIII.109. »Horminum luteum glutinosum Bauh. Colus Iovis Lob. Prope Ganges oppidum Gallo Provinciæ sponte qdm et in Gothardo Rhætorum.» *Salvia glutinosa* L.

XIII.110. »Horminum syl. latifolium verticillatum Bauh. Wilder Scharlach. In Austria et Misnia sponte.» *Salvia verticillata* L.

XIII.111. »Horminum pratense foliis serratis Bauh. In Bavaria, Misnia, Helvetia &c. sponte.» *Salvia pratensis* L.

XIII.112. »Horminum pratense flore rubicundo. Friburgi ad Danubium et Lunellæ GalloProvinciæ. sed et prope Basileam.» Dieselbe Art.

XIII.113. »Horminum pratense niveum foliis incanis Bauh. Sclarea sylvestris flore albo Tab. Prope Basileam.» Dieselbe Art.

XIII.114. »Horminum syl. maius, foliis profundius incisis. Monspelii.» *Salvia verbenaca* L. oder *clandestina* L.

XIII.115. »Estne idem cum præcedente? Existit pumilum, flore dilute cæruleo &c. Estne Horminum angustifolium laciniatum Bauh? Genuæ.» *Salvia clandestina* L.

XIII.116. »Horminum syl. Lavandulæ flore Bauh. Sclarea Hispanica Tab. In Bavaria.» *Salvia verticillata* L.

XIII.117. »Horminum syl. Salvifolium maius vel maculatum Bauh. Verbascum nigrum Salvifolium Lob. In Austria inferiori.» *Salvia silvestris* L.

XIII.118. »Horminum syl. Salvifolium minus Bauh. In Bohemia; et Austria inferiori.» Dieselbe Art.

XIII.119. »An Horminum minus album Betonicæ facie Bauh? An Sideritis quædam alpina? Cum figura Salviæ alpinæ apud Tabernæmont. c(on)venit. In montibus GalloProvinciæ.» *Stachys alopecuros* (L.) Benth. (Studien, p. 83.)

XIII.120. »An sit idem cum præcedente? In Italia.» Nur eine Blattrosette, wie es scheint, von *Stachys germanica* L.

XIII.121. »Videtur convenire cum præcedentibus. Nisi malis Betonicam alpinam albam appellare. In Austriæ superioris alpibus.» *Stachys alopecuros* (L.) Benth.

XIII.122. »Verbascum mas latifolium Bauh. Wullkrautt. Königskertz. In Misnia, Helvetia, Seelandia &c.» *Verbascum thapsus* L.

XIII.123. »Exilius est præcedente. Bormii ad Insulas stoechadas.» *Verbascum majale* DC.

XIII.124. »An Verbascum mas angustioribus foliis, floribus pallidis Bauh? Basileæ, Lipsiæ.» *Verbascum lychnitis* L.

XIII.125. »An Verbascum fæmina flore luteo magno Bauh? In Austria.» *Verbascum phlomoides* L.

XIII.126. »Verbascum lychnitis flore albo parvo Bauh. Verbascum fæmina Lob. In Bavaria et Bohemia sponte.» *Verbascum lychnitis* L.

XIII.127. »Verbascum nigrum foliis papaveris corniculati Bauh. Verbascum Intubaceum Tab. Florentiæ et Monspelii.» *Verbascum sinuatum* L.

XIII.128. »Verbascum nigrum, flore ex luteo purpurascente Bauh. In Lusatia &c.» *Verbascum nigrum* L.

XIII.129. »An Verbascum foliis subrotundis flore Blattariæ Bauh? Ex semine Blattariæ, Lipsia misso, crevit simul cum Blattaria in horto meo Annæberg.» Ohne Zweifel ein Bastard zwischen *Verbascum blattaria* L. und einer Art der Thapsus-Gruppe, aber zu wenig entwickelt um eine genaue Bestimmung zu ermöglichen.

XIII.130. »Verbascum humile Creticum laciniatum Bauh. Dedit Bauh. Basileæ.» *Celsia arcturus* L.

XIII.131. »Verbascum latis Salviæ foliis Bauh. Parisiis, Monspelii, Florentiæ, Lipsiæ &c. in hortis.» *Phlomis fruticosa* L.

XIII.132. »Verbascum angustis Salviæ foliis Bauh. Phlomis Lychnitis Lob. Monspelii sponte.» *Phlomis lychnitis* L.

XIII.133. »Blattaria lutea folio longo laciniato Bauh. Mottenkrautt. Schabenkrautt. Ingolstadii sponte.» *Verbascum blattaria* L.

XIII.134. »Blattaria floribus incarnatis Ioh. Franco. Lipsiæ in hortis.» Dieselbe Art.

XIII.135. »Blattaria purpurea Bauh. Blattaria phœnicea Tab. In Lusatia inferiori et Bohemia sponte.» *Verbascum phoeniceum* L.

XIII.136. »Aethyopis foliis sinuosis Bauh. Mohrenkrautt. Lipsiæ, Basileæ etc. in hortis.» *Salvia aethiopis* L.

XIII.137. »Verbasculum pratense odoratum Bauh. Primula veris Matth. In Germania, Dania &c. Himmelschlüssel.» *Primula officinalis* (L.) Hill.

XIII.138. »Verbasculum pratense vel sylvaticum inodorum Bauh. Primula pratensis inodora luteopallida Lob. Passim.» Dieselbe Art.

XIII.139. »Verbasculum sylvarum maius singulari flore Bauh. Primula sylvarum Lob. Non procul Valentia Gallor. et in Italia et Dania.» *Primula acaulis* (L.) Hill.

XIII.140. »Verbasculum sylvarum albo flore. Non procul Valentia Galliæ.» Dieselbe Art.

XIII.141. »Verbasculum hortense multiplex Bauh. Basileæ in hortis.» *Primula officinalis* mit doppelter Krone.

XIII.142. »Verbasculum syl. magno plenoque flore Bauh. Primula veris multiflora syl. Tab. Basileæ in hort.» Blüten von *Primula acaulis* mit doppelter Krone.

XIII.143. »An Verbasculum syl. minus singulari flore Bauh.? Habet flores plenos, sed binos. Heidelbergæ in horto pharmacopæi.» F. *calycanthema* einer Primula.

XIII.144. »Verbasculum proliferum Bauh. Heidelbergæ in horto pharmacopæi.» F. *calycanthema* einer Primula, wahrscheinlich *officinalis* L.

XIII.145. »Verbasculum umbellatum alpinum minus Bauh. Sanicula alpina minor Lob. In alpibus Helveticis, Austriacis, Pyrenæis.» *Primula farinosa* L.

XIII.146. »Verbasculum alpinum umbellatum maius Bauh. Primula alpina angustifolia Tab. Prope Ingolstadium in pratis.» Dieselbe Art.

XIII.147. »Verbasculum alpinum umbellatum flore suaviter rubente seu diluto. Ingolstadii.» Dieselbe Art.

XIII.148. »Verbasculum alpinum umbellatum flore candido. Ingolstadii in pratis.» Dieselbe Art.

XIII.149. »Sanicula alpina lutea Bauh. Beer Sanickel. In alpibus Austriæ superioris et non longe a Schonneck(?) Rhætiæ. Auricula ursi Dod.» *Primula auricula* L.

XIII.150. »Sanicula alpina purpurea Bauh. Primula alpina latifolia Tab. Basileæ in horto.» *Primula pubescens* Jacq. (*auricula* × *hirsuta*).

XIII.151. »Sanicula alpina foliis rotundis Bauh. In Gothardo Rhætorum.» *Primula hirsuta* All.

XIII.152. »Sanicula alpina minima carnea Bauh. Potius rubri coloris e(st) q(uam) carnei. In altissimo monte prope salinas Austriæ sup(er)ioris, qua tenditur in Styriam.» Das Exemplar fehlt jetzt, scheint aber von Linné als *Primula minima* L. erkannt worden zu sein. (Studien, p. 83.)

XIII.153 fehlt.

XIII.154. »Sanicula alpina pumila tenuifolia lutea, non descripta. In Pyrenæis Hispanicis.» Scheint *Douglasia Vitaliana* (L.) Bth. & Hook. zu sein. (Studien, p. 83.)

XIII.155. »Sanicula montana latifolia laciniata Bauh. Cortusa Matth. Bergk Sanickel. Wund glöcklin. In monte Draunstein prope Gmundam Austriæ sup(er)ioris.» *Cortusa Matthioli* L.

XIII.156. »Sanicula montana rotundifolia major Bauh. Caryophyllata sive Geum alpinum Advers. In Italia, montibus Helveticis, Rhæticis, Austriacis.» *Saxifraga rotundifolia* L.

XIII.157. »Sanicula montana flore calcari donato Bauh. Pinguicula Gesneri Clus. In alpibus Austriæ, Rhætiæ, item in Seelandia.» *Pinguicula vulgaris* L.

XIII.158. »Pinguicula flore majore cæruleo. In Pyrenæis.» *Pinguicula grandiflora* Lam. (Studien, p. 83.)

XIII.159. »Digitalis purpurea folio aspero Bauh. brauner Fingerhutt. In hortis Misniæ, Seelandiæ &c.» *Digitalis*, aber keine typische *purpurea*.

XIII.160. »Digitalis purpurea floribus et foliis latioribus, hisque crenatis. Non procul a monte Calcaris sponte.» *Digitalis purpurea* L.

XIII.161. »Digitalis alba folio aspero Bauh. Weisser Fingerhutt. Lipsiæ in hort.» *Digitalis ambigua* Murr.

XIII.162. »Digitalis lutea magno flore Bauh. gelber Fingerhutt. In Austria, Bohemia, Helvetia sponte.» Dieselbe Art.

XIII.163. »Digitalis major lutea vel pallida parvo flore Bauh. In Italia et Basileæ sponte.» *Digitalis lutea* L.

XIII.164. »Digitalis angustifolia flore ferrugineo Bauh. In Italia sponte, qdm et p(ro)pe Soloturnum Helvetiorum. Lipsiæ in hortis.» *Digitalis ferruginea* L.

VOLUMEN XIV.

Horti sicci seu stirpivm, studio et labore D. Ioachimi Burseri Camentio-Lusati, in Academia Regia Nobilium Sorana Medici et professoris Phys. publ. per diversas regiones et loca collectarum ac secundum seriem Pinacis Bauhiniani digestarum Volumen XIV. continens Sectionem 1. et 2:am libri 7. Pinacis eiusdem.

XIV(1)1. »Lysimachia lutea major Bauh. geeler Weijderich. In Germania, Dania &c.» *Lysimachia vulgaris* L.

XIV(1)2. »Lysimachia lutea minor, foliis nigris punctis notatis Bauh. Lysimachia altera flavo flore Clus. Lipsiæ in horto Deurlingi.» *Lysimachia punctata* L.

XIV(1)3. »Lysimachia bifolia flore globoso luteo Bauh. Lysimachia lutea altera Lob. In Lusatia inferiori, Misnia, Seelandia.» *Lysimachia thyrsiflora* L.

XIV(1)4. »Lysimachia lutea corniculata Bauh. Lysimachia Virginiana. In hortis Misniæ, Seelandiæ. Præsens exemplar attulit Pharmacopæus Parisiensis ex Brasilia.» *Oenothera* sp. Nicht näher bestimmbar, weil die Blüten durch Mottenfrass zerstört sind. Es ist nicht Oe. biennis L.

XIV(1)5. »Lysimachia siliquosa hirsuta magno flore Bauh. grosse Weijderich rösslin. In Misnia, Bohemia, Seelandia.» *Epilobium hirsutum* L.

XIV(1)6. Lysimachia siliquosa hirsuta parvo flore Bauh. In Bohemiæ, paludibus.» *Epilobium* sp. (roseum?).

XIV(1)7. »Lysimachia siliquosa glabra major Bauh. In Misnia, Lusatia &c.» *Epilobium roseum* Schreb.

XIV(1)8. »Lysimachia siliquosa glabra minor Bauh. In Misnia, Bohemia, Helvetia &c.» *Epilobium collinum* Gmel.

XIV(1)9. »Lysimachia siliquosa glabra, angustifolia Bauh. In Lusatia, Misnia, Bohemia, Dania.» *Epilobium palustre* L.

XIV(1)10. »Lysimachia Chamænerion dicta latifolia Bauh. Feuwerkrautt. In Lusatia, Misnia, Helvetia, Dania.» *Epilobium angustifolium* L.

XIV(1)11. »Lysimachia Chamænerion dicta angustifolia Bauh. Basileæ ad rivum novæ domus dictæ.» *Epilobium Dodonaei* Vill.

XIV(1)12. »Lysimachia Chamænerion dicta alpina Bauh. Vix a(u)t(em) differt a p(ræ)cedente, nisi quod non ita alte excrescat. In Vallesia, Comitatu Tyrolensi &c.» Dieselbe Art.

XIV(1)13. »Lysimachia spicata purpurea Bauh. brauner Weyderich. In Lusatia, Bohemia, Helvetia, Dania.» *Lythrum salicaria* L.

XIV(1)14. »Lysimachia spicata purpurea subrotundo incano folio. Prope Encausæ oppidum GalloProvinciæ. Steril, nicht bestimmbar. (Studien, p. 84.)

XIV(1)15. »Lysimachia spicata cærulea Bauh. In Misnia, Helvetia, Saxonia inferiori. Ungaria.» *Veronica longifolia*, L., eine Form mit dreiblättrigen Wirteln. (Studien, p. 84.)

XIV(1)16. »Lysimachia spicata cærulea angustifolia. An differt a præcedente? In interamni Ungariæ copiose.» D:o, mit langen und schmalen Blättern. (Studien p. 84.)

XIV(1)17. »An Lysimachia rubra non siliquosa Bauh? an vero vulgaris purpurea spicata? In Seelandia.» *Lythrum salicaria* L.

XIV(1)18. »Lysimachia cærulea galericulata Bauh. Tertianaria Tab. Feberkrautt. In Lusatia, Misnia, Seelandia.» *Scutellaria galericulata* L.

XIV(1)19. »An Veronica mas erecta Bauh? In Misnia.» *Veronica officinalis* L., eine grossblättrige Form.

XIV(1)20. »Veronica mas supina et vulgatissima Bauh. Ehrenpreiss. In Misnia, Bohemia, Helvetia, Dania &c.» Dieselbe Art.

XIV(1)21. »Veronica vulgaris flore candido. In Austria superiori.» Dieselbe Art.

XIV(1)22. »Veronica spicata latifolia Bauh. Auffrechtstehender Ehrenpreyss. In Bavaria, Helvetia.» *Veronica spicata* L.

XIV(1)23. »Veronica spicata angustifolia Bauh. Veronica recta Tab. Basileæ.» Dieselbe Art.

XIV(1)24. »Veronica spicata minor Bauh. Veronica recta minor Tab. Wittebergæ, Ingolstadii, Curiæ Rhætor. &c.» Dieselbe Art.

XIV(1)25. »Veronica pratensis serpillifolia Bauh. Ehrenpreiss Weiblin. In Lusatia, Misnia, Helvetia, Dania &c.» *Veronica serpyllifolia* L.

XIV(1)26. »Veronica alpina frutescens Bauh. In alpibus Helveticis, Austriacis, Pyrenæis &c.» *Veronica fruticulosa* L.

XIV(1)27. »Veronica Bellidis folio hirsuta Bauh. In alpibus Helveticis et Pyrenæis.» *Veronica bellidioides* L. (Studien, p. 84.)

XIV(1)28. »Præcedenti affinis. Vide infra Chamædryn alpinam minimam hirsutam. In altissimo monte ad Thermas Fabarias Helvetior.» (Der Hinweis gilt Nr. 48.) *Veronica aphylla* L.

XIV(1)29. »Veronica alpina cærulea Bellidis folio non ita crasso, glabro, vix crenato, caule folioso &c. non descripta. In eodem monte prope Thermas Fabarias seu Piperinas.» *Veronica alpina* L. (Studien, p. 84.)

XIV(1)30. »Eadem cum præcedente, sed minoribus et angustioribus foliis. In montibus Austriæ superioris.» D:o (Studien, p. 85).

XIV(1)31. »Veronica alpina cærulea serpillifolia minor. In monte Calcaris.» Scheint *Veronica apennina* Tausch zu sein. (Studien, p. 85.)

XIV(1)32. »Teucrium Bauh. Teucrium vulgare fruticans Clus. gross Bathengel. In hortis Lusatiæ, Misniæ &c.» *Teucrium flavum* L.

XIV(1)33. »Videtur idem cum præcedente, licet folia habeat latiora. Non procul Monspelio sponte. item Romæ in summitate Colisæi seu Amphitheatri.» Dieselbe Art.

XIV(1)34. »Teucrium peregrinum folio sinuoso Bauh. Teucrium Bæticum Clus. Tab. grichischer Bathengel. Pisis Italiæ in horto Magni Ducis.» *Teucrium fruticans* L.

XIV(1)35. »Teucrium alpinum inodorum magno flore Bauh. In Valle Augusta prope S. Bernhard.» *Scutellaria alpina* L. (Studien, p. 85.)

XIV(1)36. »Teucrium alpinum coma purpurocærulea Bauh. Clinopodium alpinum Ponæ ap(ud) Clus. In alpibus Helvetiæ, Austriæ, Pyrenæis.» *Bartsia alpina* L.

XIV(1)37. »Scordium Bauh. Wasser batenig lachen knoblauch Lipsiæ, Monspelii, Varingi Seelandiæ.» *Teucrium scordium* L.

XIV(1)38. »Scordium minus Tab. In Austria Inferiori.» Dieselbe Art.

XIV(1)39. »Scordium lanuginosum Bauh. Ad Thermas Belilucanas in Gallia Narbonensi.» Dieselbe Art.

XIV(1)40. »Scordium alterum, sive Salvia sylvestris Bauh. Wilde Salbey. In Misnia, et Helvetia.» *Teucrium scorodonia* L.

XIV(1)41. »Chamædrys major repens Bauh. Gamanderlen. In Bavaria, Helvetia &c.» *Teucrium chamaedrys* L.

XIV(1)42. »Chamædrys flore candido. In Vallesia.» Dieselbe Art.

XIV(1)43. »An Chamædrys minor repens Bauh. In valle cava dicta, aliquot milliaribus Monspelio distante.» *Veronica prostrata* L.

XIV(1)44. »Chamædrys spinosa Bauh. Figura e(st) in Prodromo. Dedit mihi Bauhinus.» *Teucrium spinosum* L.

XIV(1)45. »Chamædrys alpina Cisti flore Bauh. Argentina Monspeliaca Tabern. Bergk Gamanderlein. In alpibus passim.» Das Exemplar fehlt, es ist wahrscheinlich Dryas octopetala L. gewesen.

XIV(1)46. »Chamædrys alpina saxatilis Bauh. Veronica petræa sempervirens Ponæ. Dedit Bauhinus Basileæ.» *Paederota Bonarota* L.

XIV(1)47. »Videtur eadem cum præcedente. Basileæ dedit Bauhinus, asserens eam sibi missam pro Scorodonia Penæ.» *Prasium majus* L.

XIV(1)48. »Chamædrys alpina minima hirsuta Bauh. In alpibus Austriæ et Pyrenæis.» *Veronica aphylla* L.

XIV(1)49. »Chamædrys unicaulis spicata Bauh. Trixago Apula Columnæ. In Gallo-Provincia.» Blüten sehr beschädigt; dürfte *Bartsia trixago* L. sein.

XIV(1)50. »Præcedenti affinis. Parisiis accepi a quodam Doctore.» Unvollständiges und sehr beschädigtes Exemplar.

XIV(1)51. »Chamædrys spuria major latifolia Bauh. Veronica maxima Lugdunens. In Helvetia p(ro)pe Lucernam, et Austria superiori.» *Veronica urticifolia* Jacq.

XIV(1)52. »Chamædrys spuria major altera sive frutescens Bauh. Erdt Weyrauch. In Misnia, Bohemia &c.» *Veronica teucrium* L.

XIV(1)53. »Chamædrys spuria major angustifolia Bauh. In Bavaria &c.» Dieselbe Art.

XIV(1)54. »Chamædrys spuria minor rotundifolia Bauh. Teucrium pratense officinar. Lob. Wildt Gamanderle. In Lusatia, Misnia, Helvetia, Dania.» *Veronica chamaedrys* L.

XIV(1)55. »Chamædrys spuria minor latifolia. Wittebergæ.» Dürfte *Veronica prostrata* L. sein.

XIV(1)56. »Chamædrys spuria minor angustifolia Bauh. Basileæ.» Eine Form von *Veronica prostrata* L., vielleicht v. *saturejifolia* Poit. & Turp.

XIV(1)57. »Chamæpitys incana exiguo folio Bauh. Chamæpitys I. Dioscor. Lob. Pro hac dedit mihi Bauhinus Basileæ, sed non respondet figuræ.» *Cressa cretica* L.

XIV(1)58. »Chamæpitys moschata, foliis serratis Bauh. Iva moschata Monspeliensium Tab. In Gallia Narbonensi.» *Ajuga iva* (L.) Schreb.

XIV(1)59. »Chamæpitys moschata flore albo. In Cetio non longe Monspelio.» *Ajuga iva* (L.) Schreb. (Studien, p. 85.)

XIV(1)60. »Chamæpitys lutea vulgaris, sive folio trifido Bauh. Erdtkijfer. Schlagkreuttlin. Basileæ. Monspelii. Aiuga sive Chamæpitys mas Dioscorid. Lob.» *Ajuga chamaepitys* (L.) Schreb.

XIV(1)61. »Chamæpitys cærulea Austriaca Bauh. Giessæ in horto Medico.» *Dracocephalum austriacum* L.

XIV(1) (61 bis). »Præcedenti similis est. Co(mmun)icavit illam mihi Clariss. Dn. D. Otto Sperling, ex Norwegia allatam, qui dubitabat, essetne Chamæpitys Austriaca, an Prunella Hyssopifolia.» *Dracocephalum ruyschiana* L.

XIV(1)62. »Chamæpitys spuria multifido folio Lamii flore Bauh. Chamæpitys adulterina Lob. Florentiæ.» *Ajuga chamaepitys* (L.) Schreb.

XIV(1)63. »Alsine hederulæ folio Bauh. Hünnerdarm mitt Ephewsblettern. Passim.» *Veronica hederifolia* L.

XIV(1)64. »Alsine Veronicæfoliis, flosculis cauliculis adhærentibus Bauh. Passim.» *Veronica arvensis* L.

XIV(1)65. »Alsine Chamædryfolia, flosculis pediculis oblongis insidentibus. Alsine foliis Trissaginis Tab. Hünerdarm mitt Gamanderle blettern. Passim.» *Veronica polita* Fr.

XIV(1)66. »Alsine Chamædryfolia minor, flosculis saturate cæruleis, foliis crassis &c. Non procul Aureliis primo vere in arvis.» *Veronica acinifolia* L. (Studien, p. 85.)

XIV(1)67. »Alsine triphyllos cærulea Bauh. Alsine recta Tab. Hüner Rautten. In Lusatia, Misnia, Bavaria, Helvetia &c.» *Veronica triphyllos* L.

XIV(1)68. »Alsine scandens baccifera Bauh. Alsine repens Clus. gross krichend Vogelkrautt. Basileæ, Wittebergæ.» *Cucubalus baccifer* L.

XIV(1)69. »Alsine altissima nemorum Bauh. gross Vogelkrautt. In Misnia, Bohemia, Helvetia &c. Dania.» *Stellaria nemorum* L.

XIV(1)70. »An Alsine angustifolia Bauh. an potius Gramen floridum minus? In Lusatia.» *Stellaria graminea* L.

XIV(1)71. »Alsine major Bauh. Passim.» *Stellaria media* (L.) Cyr.
XIV(1)72. »Alsine media Bauh. Passim.» *Moehringia trinervia* (L.) Clairv.
XIV(1)73. »Alsine minor multicaulis Bauh. In Lusatia, Misnia &c.» *Arenaria serpyllifolia* L.
XIV(1)74. »Alsine minor Lini capitulis Bauh. In Misnia, Lusatia, Helvetia, Dania.» *Linum catharticum* L.
XIV(1)75. »Alsine verna Androsaces capitulis Bauh. Non longe Herbipoli ad pagum Markersen. Quod minus ex Thuringia. Utriusque meminit Bauhinus in Prodromo, nec videntur multum differre.» *Androsace septentrionalis* L., von Würzburg, und *A. elongata* L., aus Thüringen. (Studien, p. 85.)
XIV(1)76. »Alsine affinis Androsace dicta major Bauh. Androsace altera Matth. Lutetiæ in horto Robini.» *Androsace maxima* L.
XIV(1)77. »Alsine Spergula dicta major Bauh. Sagina Spergula Lob. In Lusatia, Misnia, Helvetia, Dania.» *Spergula arvensis* L.
XIV(1)78. »An Alsine Spergulæ facie media Bauh. Monspelii.» *Spergularia salina* Pr.
XIV(1)79. »Alsine Spergulæ facie minor Bauh. In Bohemia.» *Spergularia campestris* (L.) Aschers.
XIV(1)80. »Alsine aquatica media Bauh. Alsine fontana Tab. In Lusatia &c.» *Moehringia trinervia* (L.) Clairv.
XIV(1)81. »Alsine palustris minor folio oblongo Bauh. Portulaca aquatica Thalii. In Misnia, Lusatia, Bohemia.» *Montia fontana* L.
XIV(1)82. »Alsine palustris minor Serpillifolia Bauh. In Lusatia, Misnia, Helvetia, Seelandia.» *Peplis portula* L.
XIV(1)83. »Alsine nodosa Germanica Bauh. In Lusatia, Misnia, Seelandia.» *Sagina nodosa* L.
XIV(1)84. »Alsine tenuifolia muscosa Bauh. In Misnia, Bohemia, Seelandia &c.» *Sagina procumbens* L.
XIV(1)85. »Alsine alpina glabra Bauh. In Pyrenæis.» *Silene rupestris* L.
XIV(1)86. »Alsine alpina iunceo folio Bauh. In alpibus Helvetiæ &c.» *Moehringia muscosa* L.
XIV(1)87. »Alsine alpina minima glabra Bauh. In Austria superiori.» *Androsace obtusifolia* All.
XIV(1)88. »Alsine alpina minima repens rotundifolia flosculis albis &c. In alpibus.» *Arenaria biflora* L. (Studien, p. 86.)
XIV(1)89. »Præcedenti affinis, licet non ita procumbat. In Pyrenæis.» *Arenaria ciliata* L. (Studien, p. 86.)
XIV(1)90. »Alsine alpina perennis radice lignosa, flosculis albis, facie Sempervivi minoris. In Pyrenæis versus Hispaniam.» D:o. (Studien, p. 86.)
XIV(1)91. »Major inter hasce duas videtur cum præcedente coincidere. In alpibus Austriæ.» *Alsine ciliata* L. und *Alsine sedoides* (L.) Schultz. (Studien, p. 87.)
XIV(1)92. »Alsine hirsuta magno flore Bauh. Meuseöhrlin. In Germania, Dania, Italia &c.» *Cerastium arvense* L. und *caespitosum* Gilib.
XIV(1)93. »Alsine hirsuta altera viscosa Bauh. Passim.» *Cerastium glutinosum* Fr.
XIV(1)94. »Anagallis phæniceo flore Bauh. Roter gauchheil. Roter meijer. In Lusatia, Bohemia, Seelandia.» *Anagallis arvensis* L.
XIV(1)95. »Anagallis cæruleo flore Bauh. In Lusatia, Misnia, Helvetia.» D:o var. *caerulea* (Schreb.).
XIV(1)96. »Anagallis lutea nemorum Bauh. In sylvis Misniæ, Bohemiæ. Ad oppidum Brunen Helvetiæ.» *Lysimachia nemorum* L.

XIV(1)97. »Anagallis aquatica major folio subrotundo Bauh. Pfunde. Berula Tab. In Germania, Dania &c.» *Veronica beccabunga* L.

XIV(1)98. »Anagallis aquatica minor folio subrotundo Bauh. Bachbungen. In Lusatia.» Dieselbe Art.

XIV(1)99. »Anagallis aquatica major folio oblongo Bauh. In Germania, Dania &c.» *Veronica anagallis aquatica* L.

XIV(1)100. »Anagallis aquatica folio rotundo non crenato Bauh. In Bavaria, Thuringia, GalloProvincia, Seelandia.» *Samolus Valerandi* L.

XIV(1)101. »Anagallis aquatica angustifolia scutellata Bauh. In Lusatia, Helvetia, Seelandia. Considerandum an non sit potius ad Chamædryn spuriam referenda.» *Veronica scutellata* L.

XIV(1)102. »Elatine folio subrotundo Bauh. In Thuringia. In Helvetia. In Italia.» *Linaria spuria* (L.) Mill.

XIV(1)103. »Elatine folio acuminato, in basi auriculato, flore luteo Bauh. In Bavaria, Thuringia &c.» *Linaria elatine* (L.) Mill.

XIV(2)1. »Heliotropium maius Dioscor. Bauh. Krebsblumen, Scorpionkrautt. Basileæ, Florentiæ.» *Heliotropium europaeum* L.

XIV(2)2. »Heliotropium minus supinum Bauh. Monspelii in littore maris.» *Heliotropium supinum* L.

XIV(2)3. »Heliotropium tricoccum Bauh. Monspelii sponte.» *Chrozophora tinctoria* (L.) Juss.

XIV(2)4. »Echium scorpioides arvense Bauh. Auricula muris cærulea Tabern. Blauwe Meussöhrlin. Passim.» *Myosotis collina* Hoffm.

XIV(2)5. »Echium scorpiodes arvense flore albo. In Austria.» Wahrscheinlich *Myosotis alpestris* Schmidt. (Studien, p. 87.)

XIV(2)6. »Echium scorpioides minus floribus luteis Bauh. Ad oppidum Merues non longe a monte Calcaris in GalloProvincia.» Wahrscheinlich *Myosotis versicolor* (Pers.) Sm. (Studien, p. 87, wo ich Menier statt Merues gelesen habe; das Wort ist recht undeutlich geschrieben).

XIV(2)7. »Echium Scorpioides palustris Bauh. Euphrasia cærulea Tabern. blauwer Augentrost. Vergiss mein nicht. Passim.» *Myosotis palustris* (L.) Hill.

XIV(2)8. »Echium scorpioides palustre flore carneo Bauh. In Misnia.» Dieselbe Art.

XIV(2)9. »Echium maius et asperius flore albo Bauh. Florentiæ sponte.» *Echium italicum* L.

XIV(2)10. »Echium vulgare Bauh. Wilde Ochsenzung. Passim.» *Echium vulgare* L.

XIV(2)11. »Echium vulgare floribus carneis. In Pannonia.» Dürfte auch *Echium vulgare* L. sein.

XIV(2)12. »Echium vulgari minus et asperius. flos t(ame)n major est. Non p(ro)cul Monspelio, et Genuæ.» *Echium pustulatum* Sibth. und *E. plantagineum* L. (Studien, p. 87.)

XIV(2)13. »Echium valde hirsutum, flore sanguineo (licet inter siccandum amiserit colorem). An Echium Creticum angustifolium rubrum Bauh? Bormii GalloProvinciæ, prope Insulas stoechadas.» Scheint mir *Echidium creticum* L. zu sein.

XIV(2)14. »Echium parvum, non ramosum, amplo flore. Olbiæ in Gallia Narbonensi.» Dürfte zu *Echium plantagineum* L. gehören. (Studien, p. 87.)

XIV(2)15. »An Echium pumilum flore luteo Bauh? In arvis GalloProvinciæ.» *Lithospermum apulum* L.

XIV(2)16. »Anchusa lutea major Bauh. In Vallesia prope Sedunum (Sion, Sitten). In Gallia Narbon. ad Aquas mortuas oppidum.» *Onosma echioides* L.

XIV(2)17. »Anchusa angustifolia Bauh. Anchusa lignosior Advers. Monspelii sponte.» *Lithospermum fruticosum* L.

XIV(2)18. »Lycopsis Bauh. Monspelii.» Ist vielleicht *Echium italicum* L.

XIV(2)19. »Buglossum latifolium, Borrago Bauh. Borragen. Borretsch. In hortis passim.» *Borrago officinalis* L.

XIV(2)20. »Borrago flore candido. In hortis.» D:o.

XIV(2)21. »Buglossum latifolium semper virens Bauh. Lipsiæ in horto Deurlingi. Lutetiæ in horto Medico.» *Anchusa sempervirens* L.

XIV(2)22. »Buglossum angustifolium maius Bauh. Buglossa Italica Tab. Welsche Ochsenzung. Monspelii et Florentiæ sponte.» *Anchusa italica* Retz.

XIV(2)23. »Buglossum angustifolium minus Bauh. Ochsenzunge. In Misnia, Bohemia, Rhætia, Dania.» *Anchusa officinalis* L.

XIV(2)post 23. »Buglossum angustifolium minus flore albo. In Seelandia.»

XIV(2)post 23. »Buglossum angustifolium minus flore albo. In Seelandia.» Scheint eine kleinblütige Form von *Anchusa officinalis* L. zu sein. (Studien, p. 87.)

XIV(2)24. »Buglossum angustifolium minimum. D. Weckerlinus Argentinensis misit, in Belgio lectum.» *Alkanna tinctoria* (L.) Tausch. (Studien, p. 88.)

XIV(2)25. »Buglossum syl. maius nigrum Bauh. In Thuringia, Bohemia.» *Nonnea pulla* (L.) DC.

XIV(2)26. »Buglossum syl. minus Bauh. Borrago sylvestris Trago. In Misnia, Helvetia, Dania.» *Lycopsis arvensis* L.

XIV(2)27. »Buglossum sylvestre minimum. In GalloProvincia.» Scheint *Lycopsis arvensis* L. zu sein. (Studien, p. 88.)

XIV(2)28. »Buglossum syl. caulibus procumbentibus Bauh. Aparine major Plinii Tab. Wittebergæ, Ingolstadii. In Seelandia.» *Asperugo procumbens* L.

XIV(2)29. »Cynoglossum maius vulgare Bauh. Hundeszung. In Germania, Dania &c.» *Cynoglossum officinale* L.

XIV(2)30. »Cynoglossum minus, foliis obtusioribus, atrovirentibus, magis procumbens &c. In GalloProvincia.» Vielleicht *Cynoglossum pictum* Ait., doch kaum sicher bestimmbar. (Studien, p. 88.)

XIV(2)31. »Cynoglossum sylvaticum rubente caule Bauh. Cynoglossum sylvaticum Harcynicum Thalii. In Thuringia.» *Cynoglossum germanicum* Jacq.

XIV(2)32. »Cynoglossum Creticum argenteo angusto folio Bauh. Monspelii.» *Cynoglossum cheirifolium* L.

XIV(2)33. »Cynoglossum Creticum longifolium foetidum Bauh. A parente.» Dürfte ein Gartenexemplar derselben Art sein.

XIV(2)34. »Cynoglossum minus Bauh. Cynoglossum pumilum Clus. In Helvetia, Bohemia, Dania.» *Echinospermum lappula* (L.) Lehm.

XIV(2)35. »Cerinthe seu Cynoglossum montanum maius Bauh. Senis Italiæ, et in GalloProvincia.» *Cerinthe major* L.

XIV(2)36. »Cerinthe flore ex rubro purpurascente Bauh. Basileae in hortis, ut et Soræ.» Dieselbe Art.

XIV(2)37. »An Cerinthe flore flavo asperior Bauh? Locus natalis excidit.» *Cerinthe minor* L.

XIV(2)38. »Cerinthe minor Bauh. In Bohemia sponte.» Dieselbe Art.

XIV(2)39. »Lithospermum arundinaceum Bauh. Lachryma Iob Clus. Accepi Basileæ a M. Miano.» *Coix lacryma Jobi* L.

XIV(2)40. »Lithospermum maius erectum Bauh. Milium Solis Trago. Meerhirse. In Bavaria, GalloProvincia, Seelandia.» *Lithospermum officinale* L.

XIV(2)41. »Lithospermum minus repens latifolium Bauh. In GalloProvincia.» *Lithospermum purpurocaeruleum* L.

XIV(2)42. »Lithospermum repens flore albo. In Gallia Narbonensi.» D:o. (Studien, p. 88.)

XIV(2)43. »Lithospermum arvense radice rubra Bauh. Anchusa arvensis minor, facie Milii Solis Tab. In arvis Lusatiæ, Misniæ, Seelandiæ. Schmincke.» *Lithospermum arvense* L.

XIV(2)44. »Lithospermum arvense flosculis cæruleis. Monspelii.» D:o. (Studien, p. 88.)

XIV(2)45. »Lithospermum Linariæ folio Germanicum Bauh. Passerina Trago. In Helvetia, Vallesia, GalloProvincia.» *Thymelaea passerina* (L.) Lange.

XIV(2)46. »Lithospermum Linariæ folio Monspeliacum Bauh. Passerina Linariæ folio Lob. In Cetio Monspessulano.» *Linum strictum* L.

XIV(2)47. »Passerina minima ramosa, subrotundis foliolis Alsines minimæ, semper alternatim et confuse positis, quorum foliolorum singulis supernascitur vel ramulus vel flosculus, subsequente sphærico seminis conceptaculo sine pedicello, quos tamen calyculo ex 4. foliolis acuminatis conflato includitur &c. In arvis Lusatiæ, Misniæ, fere semper cum Millegrana minima Lobelii in eodem loco.» *Centunculus minimus* L. (Studien, p. 88.)

XIV(2)48. »Symphytum, Consolida major Bauh. Schwartzwurtz. Wallwurtz. Beinwelle. In Misnia, Bavaria, Helvetia, Seelandia.» *Symphytum officinale* L.

XIV(2)49. »Symphytum maius flore albo. In Bavaria, Helvetia &c.» Dieselbe Art.

XIV(2)50. »Symphytum maius tuberosa radice Bauh. Monspelii sponte.» *Symphytum tuberosum* L.

XIV(2)post 50. »Symphytum minus Borraginis facie Bauh. Borraginis altera species Dod. Ex Belgio.» *Omphalodes verna* Moench.

XIV(2)51. »Symphytum maculosum sive Pulmonaria latifolia Bauh. lungenkrautt Florentiæ, Monspelii in horto Regio.» Eine *Pulmonaria* mit gefleckten Blättern, vielleicht *P. tuberosa* Schrank.

XIV(2)52. »Pulmonaria angustifolia rubente cæruleo flore Bauh. Pulmonaria non maculosa Franco. In Misnia, Helvetia, Dania.» Ohne Grundblätter und kaum sicher bestimmbar, vielleicht *Pulmonaria mollis* Wolf.

XIV(2)53. »Symphytum maculosum, sive Pulmonaria angustifolia cærulea Bauh. In Misnia, GalloProvincia, Seelandia.» Dürfte *Pulmonaria angustifolia* L. sein.

XIV(2)54. »Consolida media pratensis cærulea Bauh. Bugula Dod. gülden günsel. In Lusatia, Misnia, Dania.» *Ajuga reptans* L.

XIV(2)55. »Consolida media strigosior, magisque laciniata. In Helvetia.» *Ajuga genevensis* L. (Studien, p. 89.)

XIV(2)56. »Consolida media pratensis purpurea Bauh. Vix nisi floris colore differt a vulgaris. In Austria, Misnia.» *Ajuga reptans* L.

XIV(2)57. »Brunella major folio non dissecto Bauh. Consolida minor Matth. Braunelle. Passim.» *Prunella vulgaris* L. (Studien, p. 89.)

XIV(2)58. »Brunella elatior flore lacteo. Ingolstadii.» D:o. (Studien, p. 89.)

XIV(2)59. »Brunella folio laciniato Bauh. Symphytum petræum Lob. Ingolstadii, Basileæ.» *Prunella alba* Pall.

XIV(2)60. »Brunella Hyssopifolia Bauh. Brunella minor folio rigido integro Eid(em) in Phytopinace. Monspelii.» *Prunella hyssopifolia* L.

XIV(2)61. »Brunella cæruleo magno flore Bauh. Prunella major Clus. In Bohemia, Helvetia.» *Prunella grandiflora* (L.) Jacq.

XIV(2)62. »Bellis sylvestris caule folioso major Bauh. Genseblum. Passim. Bellium maius Tab.» *Chrysanthemum leucanthemum* L.

XIV(2)63. »Bellis syl. major, humilis, procumbens &c. an eadem cum vulgari. Ad Castellum novum dictum non longe Monspelio in vignis.» D:o. (Studien, p. 89.)

XIV(2)64. »Bellis maxima ramosa. An Bellis alpina major rigido folio Bauh? In montibus Misniæ, nominatim Annæbergæ ad patibulum. Ad binos cubitos excrescit, multosque ramos habet.» Dürfte *Chrysanthemum maximum* Ram. sein (Studien, p. 89.)

XIV(2)65. »An hæc potius sit Bellis alpina major rigido folio Bauh? Vide figuram in Prodromo. In alpibus Austriæ, Helvetiæ &c.» Dürfte *Chrysanthemum atratum* L. sein.

XIV(2)66. »An sit Bellidis majoris species? Folia sunt acuta et spinosa. Florentiæ.» Steril, kaum bestimmbar.

XIV(2)67. »Forsan est Bellis aliqua alpina? In Pyrenæis.» Sehr junge Exemplare, vielleicht von *Senecio Tournefortii* Lap.

XIV(2)68. »Bellis syl. media, caule carens Bauh. Sed cur vocat caule carentem? Prope Lucernam Helvetiorum, et in alpibus Austriæ.» *Bellidiastrum Michelii* Cass.

XIV(2)69. »Bellis sylvestris minor Bauh. Wilde masslieben. Wildt Tausendtschön. Passim.» *Bellis perennis* L.

XIV(2)70. »Bellis maritima foliis Agerati Bauh. In littore maris prope Insulas stoechadas.» *Bellis annua* L. (Studien, p. 89.)

XIV(2)71. »Bellis hortensis flore pleno Bauh. gefülltes Tausentschön. In hortis passim.» *Bellis perennis* L.

XIV(2)72. »Bellis hortensis flore pleno albo. In hortis Misniæ.» D:o.

XIV(2)73. »Bellis hortensis multiplex flore variegato. In hortis.» D:o.

XIV(2)74. »Bellis hortensis flore simplici rubro. In hortis Misniæ &c.» D:o, f. flosc. tubulosis. (Studien, p. 89.)

XIV(2)75. »Bellis cærulea caule nudo Bauh. In montibus Austriæ, et Pyrenæis.» *Globularia nudicaulis* L.

XIV(2)76. »Bellis cærulea caule folioso Bauh. Blauwe Masslieben. Ingolstadii.» *Globularia vulgaris* L.

XIV(2)77. »Bellis cærulea montana frutescens Bauh. Scabiosa montana minor repens Clus. In monte Wasserfall et prope Uri Helvetiorum. Item in Vallesia, Pyrenæis.» *Globularia cordifolia* L.

XIV(2)78. »Bellis montana frutescens flore albo. Inter exsiccandum amisit colorem, qui in recenti prorsus albus erat. In Pyrenæis.» *Globularia cordifolia* L. (Studien, p. 90.)

XIV(2)79. »Bellis lutea foliis profunde incisis major Bauh. Chrysanthemum segetum Lob. Goldtblum. In Bavaria, Gallia, Dania.» *Chrysanthemum segetum* L.

XIV(2)80. »Bellis lutea foliis subrotundis Bauh. Basileæ co(mmun)icavit Bauhinus.» *Chrysanthemum myconis* L.

XIV(2)81. »Bellis spinosa foliis Agerati. Pisis et Florentiæ in hortis Magni Ducis.» *Chrysanthemum flosculosum* L. (= *Plagius ageratifolius* L'Hér.).

VOLUMEN XV.

Horti sicci, seu stirpivm, studio et labore D. Ioachimi Burseri, Camentio-Lusati, in Regia Nobilium Academia Sorana Medici, et Physices professoris publ. per diversas regiones et loca collectarum et secundum seriem Pinacis Bauhiniani digestarum Volumen XV. continens Sectionem 3. et 4. libri septimi illius Pinacis.

XV(1)1. »Pilosella major repens hirsuta Bauh. Auricula muris minor Trago. Meuseöhrlin. In Lusatia, Helvetia, Dania &c.» *Hieracium pilosella* L. (Fries, p. 2.)

XV(1)2. »Pilosella major repens minus hirsuta Bauh. In Misnia, Lusatia, &c.» *Hieracium auricula* L. (Fries, p. 14.)

XV(1)3. »Pilosella major erecta Bauh. gross Meuseöhrlin. In Bohemia, Lusatia, Dania &c.» *Hieracium pratense* Tausch. (Fries, p. 209.)

XV(1)4. »An Pilosella major erecta altera Bauh. In Lusatia.» *Hieracium collinum* Fr. (Fries, p. 209.)

XV(1)5. »Alia Pilosellæ species, in campis Aurelianis collecta. Dedit Basileæ M. Urstisius.» *Hieracium stoloniflorum* W. &. K. (Fries, p. 5.)

XV(1)6. »Gnaphalium maritimum Bauh. Monspelii in littore maris.» *Diotis maritima* (L.) Sm.

XV(1)7. »Gnaphalium latifolium Americanum Bauh. Basileæ in horto Bauh. Attulit quoque pharmacopæus Parisiensis ex Brasilia.» *Anaphalis margaritacea* (L.) Bth. & Hook.

XV(1)8. »Gnaphalium vulgare maius Bauh. Ruhrkrautt. In Lusatia, Misnia, &c.» *Filago germanica* L.

XV(1)9. »Gnaphalium medium Bauh. In Lusatia, Pyrenæis &c.» *Gnaphalium uliginosum* L. und *G. supinum* L.

XV(1)10. »Gnaphalium minus repens Bauh. In Lusatia, Misnia &c.» *Filago spathulata* Pr.

XV(1)11. »Gnaphalium minus latioribus foliis Bauh. Gnaphalium Plateau III. Clus. In monte Calcaris.» *Filago minima* Fr.

XV(1)12. »Gnaphalium roseum Bauh. Figura e(st) in Prodromo. Massiliæ sponte.» *Evax pygmaea* (L.) Pers.

XV(1)13. »Gnaphalium maius lato oblongo folio Bauh. Gnaphalium Plateau II Clus. hist. In Lusatia inferiori, Rhætia, Gallia Narbonensi.» *Gnaphalium luteoalbum* L.

XV(1)14. »Gnaphalium maius angusto oblongo folio alterum Bauh. Gnaphalium maius Tab. gross Ruhrkrautt. In Misnia, Lusatia, Pyrenæis, Dania.» *Gnaphalium silvaticum* L.

XV(1)15. »Gnaphalium montanum flore rotundiore Bauh. Weiss Engelblümlin. In Lusatia, Misnia, Dania.» *Antennaria dioica* (L.) Gaertn., männlich.

XV(1)16. »Gnaphalium montanum suaverubens Tabern. In Lusatia &c.» D:o.

XV(1)17. »Gnaphalium montanum longiore et folio et flore Bauh. In Lusatia, Misnia &c.» D:o, weiblich und männlich.

XV(1)18. »Gnaphalium alpinum magno flore, folio oblongo Bauh. löwenfüsse. In Carinthia, et prope montem Gletzscher in Vallesia. Leontopodium Matth.» *Leontopodium alpinum* Cass.

XV(1)19. »Elichryson foliis Abrotani Bauh. Arelati Gallorum.» *Tanacetum annuum* L.

XV(1)post 19. »Videtur idem cum præcedente, prout in hortis provenit. Ex horto Lugdunensi. Helychysium.» Dieselbe Art.

XV(1)20. »Elichrysum foliis oblongis, Stoechadi citrinæ similis Bauh. Florentiæ. Ex Istria quoque attulit D. Weckerlinus.» *Helichrysum angustifolium* DC.

XV(1)21. »Elychrysum non ita tomentosum, foliis longioribus, Rosmarini æmulis &c. An Elichrysum foliis oblongis paucis Stoechadi citrinæ angustioribus Bauh? Non procul Tolosa GalloProvinciæ.» Scheint *Helichrysum serotinum* Boiss. zu sein. (Studien, p. 90.)

XV(1)22. »Elichrysum vel Stoechas citrina angustifolia Bauh. Chrysocome, aureave coma Lob. In Insulis stoechadibus.» *Helichrysum stoechas* (L.) Gaertn.

XV(1)23. »Elichrysum Orientale Bauh. Florentiæ in horto Magni Ducis.» *Helichrysum orientale* (L.) Gaertn.

XV(1)post 23. »Chrysocome pumila, capitulo singularis turbinato &c. an Elichrysum Creticum Bauh. Ex horto Robini, Botanici Regii Parisiensis.» Scheint eine monströse Form derselben Art zu sein.

XV(1)24. »Elichryson sive Stoechas citrina latifolia Bauh. Amaranthus luteus I. Tab. Reinblumen. Mottenblumen. In Misnia, Bohemia, Helvetia, Seelandia.» *Helichrysum arenarium* (L.) DC.

XV(1)25. »Elichryson syl. angustifolium capitulis conglobatis Bauh. Stoechas citrina sive Chrysocome Monspeliaca Tab. Monspelii.» *Phagnalon sordidum* (L.) DC.

XV(1)26. »Elichrysum sylvestre flore oblongo Bauh. Stoechas citrina altera inodora Advers. Prope Cetium non longe Monspelio.» *Staehelina dubia* L.

XV(1)27. »Elichryso sylvestri flore oblongo similis Bauh. Figura e(st) in Prodromo. Bormii prope Insulas stoechadas.» *Phagnalon saxatile* (L.) Cass.

XV(1)28. »Conyza mas Theophrasti, Major Dioscoridis Bauh. Conyza major Clus. Florentiæ et Monspelii.» *Inula viscosa* (L.) Ait.

XV(1)29. »Conyza fæmina Theoph.: minor Diosc. Bauh. Conyza minor Clus. Monspelii, Florentiæ.» *Inula graveolens* (L.) Desf.

XV(1)30. »Conyza major vulgaris Bauh. Baccharis Monspeliensium Lob. In Lusatia, Helvetia.» *Inula conyza* DC.

XV(1)31. »Conyza Pannonica lanuginosa Bauh. In Austria.» *Inula oculus Christi* L.

XV(1)32. »Conyza cærulea acris Bauh. Beruffskrautt. In Lusatia, Misnia, Bohemia, Dania.» *Erigeron acre* L.

XV(1)33. »Conyza cærulea alpina major Bauh. In Austria superiori et prope montem S. Bernhardi, unde Bauhino communicavi.» Dürfte *Erigeron alpinus* L. sein. (Studien, p. 90.)

XV(1)34. »Conyza cærulea alpina minor Bauh. In Gothardo Rhætor. et alpibus Austriæ, unde Bauhinus a me accepit.» *Erigeron uniflorus* L. (Studien, p. 90.)

XV(1)35. »Conyza alpina pilosissima Bauh. In alpibus passim.» *Hieracium villosum* L. (Fries, p. 51.)

XV(1)36. »An Conyzis affinis Bauh? An potius Aster Pannonicus Clus? In Pannonia.» Später hinzugefügt: »britannica» (ob von Linné?). *Inula britannica* L.

XV(1)37. »Conyza media Asteris flore luteo vel tertia Dioscor. Bauh. Dürrwurtz. In Lusatia.» *Pulicaria dysenterica* (L.) Gaertn.

XV(1)38. »Conyza major flore globose Bauh. Conyza minor Tabern. In Lusatia, Misnia &c. klein dürrwurtz.» *Pulicaria vulgaris* Gaertn.

XV(1)39. »Conyza aquatica laciniata Bauh. Wasser Dürrwurtz. In Lusatia inferiori, Seelandia.» *Senecio palustris* (L.) DC.

XV(1)40. »Conyza palustris serratifolia Bauh. gross wasser Dürrwurtz. In Lusatia inferiori. Consolida palustris Tab.» *Senecio paludosus* L.

XV(1)41. »Conyza aquatica, Asteris flore aureo Bauh. In Vallesia prope urbem Sitten (Sedunum).» *Inula britannica* L., eine Form mit stärkerer Behaarung (Studien, p. 90.)

XV(1)42. »Conyzæ affinis Germanica Bauh. Herba vulneraria ad fluvium die Pfriem vocatum nascens, Trago. In Misnia et Pannonia.» *Inula germanica* L.

XV(1)43. »Aster luteus, foliolis ad florem rigidis Bauh. Aster atticus legitimus Clus. Florentiæ, Monspelii. Sternkrautt.» *Asteriscus spinosus* (L.) Gr. & G.

XV(1)44. »Aster atticus foliis circa florem mollibus Bauh. Folia s(un)t glabra, nec circa florem acuminata. In Cetio prope Monspelium.» *Asteriscus aquaticus* (L.) Moench.

XV(1)45. »Aster luteus radice odora Bauh. Bormii Galliæ Narb.» Junge Individuen, wahrscheinlich von *Pulicaria odora* (L.) Rchb. (Studien, p. 91.)

XV(1)46. »Videtur convenire cum præcedenti. In Italia.» *Pulicaria odora* (L.) Rchb.

XV(1)47. »An Aster luteus major foliis succisæ Bauh? In Bohemia.» Ist vielleicht *Inula britannica* L.

XV(1)48. »Aster montanus luteus hirsuto Salicis folio Bauh. In Bavaria.» *Inula hirta* L. (Studien, p. 91.)

XV(1)49. »Videtur idem cum præcedente. Cremsæ in vineis.» *Inula hirta* L. (Studien, p. 91.)

XV(1)50. »Aster luteus folio glabro et crenato Bauh. In Misnia,» *Inula salicina* L. (Studien, p. 91.)

XV(1)51. »Aster montanus luteus Salicis glabro folio Bauh. Bubonium luteum Tabern. In Misnia, Horto Dei dicto, Seelandia.» Dieselbe Art.

XV(1)52. »An Aster luteus angustifolius Bauh. In Italia.» *Puphthalmum grandiflorum* L.

XV(1)53. »Aster luteus Linariæ rigido glabro folio Bauh. Badenæ Austriæ inferioris.» *Inula ensifolia* L.

XV(1)54. »Aster montanus luteo magno flore Bauh. In Lusatia, Bavaria &c.» *Inula britannica* L. (Studien, p. 91.)

XV(1)55. »an Aster atticus luteus montanus villosus magno flore Bauh. In Lusatia.» *Buphthalmum salicifolium* L.

XV(1)56. »An hic potius sit Aster atticus luteus montanus villosus Bauh? In Vallesia.» *Inula montana* L.

XV(1)57. »Aster montanus luteus flore pallido foliis non ita rigidis, leviter hirsutis una cum caule &c. prope Thermas Badenses Helvetiæ.» *Buphthalmum salicifolium* L. (Studien, p. 91.)

XV(1)58. »Aster luteus supinus Bauh. Massiliæ.» *Asteriscus maritimus* (L.) Moench.

XV(1)59. »Aster atticus cæruleus latifolius vulgaris Bauh. blauw Sternkrautt. In Austria inferiori et Helvetia.» *Aster amellus* L.

XV(1)60. »Aster cæruleus latifolius, forte ob culturam, c(ui)us meminit Bauhinus. Monspelii in horto Regio.» Dieselbe Art.

XV(1)61. »Aster hirsutus Austriacus cæruleus magno flore Bauh. In Austria superiori, Vallesia, Pyrenæis Hispanicis.» *Aster alpinus* L.

XV(1)62. »Aster Tripolii flore Bauh. In Ungaria interamni. Monspelii in saltu Rovigo.» *Aster sedifolius* L. Sp. pl. Ed. I, 874 (= *A. acris* Sp. pl. Ed. II). Linné zitiert für diese Art Bauh:s Name und den Fundort »in Hungariæ interamni», was sich offenbar auf dieses Exemplar bezieht.

XV(1)63. »Tripolium maius cæruleum Bauh. Monspelii in littore. et in Dania.» *Aster tripolium* L.

XV(1)64. »Tripolium minus Bauh. Coldinborgi Seelandiæ.» Kleine Exemplare derselben Art.

XV(1)65. »Virga aurea major, vel Doria Bauh. Panax Chironeum Theophrasti Tab. Monspelii sponte. Florentiæ, Parisiis, Basileæ in hortis.» *Senecio doria* L.

XV(1)66. »Virga aurea latifolia serrata Bauh. gülden rutte. Basileæ.» *Solidago virgaurea* L.

XV(1)post 66. »Virga aurea Americana. Chrysocomes Americanæ nomine accepi ex horto Lugdunensi. Hafniæ quoque in horto suo alit Clariss. Dn. D. Ol. Wormius.» Nur Fragmente, vielleicht von *Solidago caesia* L.

XV(1)67. »Virgæ aureæ latifoliæ affinis quædam, Aster aut Conyza. In Carinthia.» Steril und kaum bestimmbar.

XV(1)68. »Virga aurea angustifolia serrata Bauh. Solidago Sarracenica Trago. Heidnisch Wundkrautt. In sylvis Misniæ, Bohemiæ. Item in monte Wasserfall.» *Senecio Fuchsii* Gmel.

XV(1)69. »Affinis est præcedenti. In Ungariæ interamni.» *Senecio sarracenicus* L.

XV(1)70. »Virga aurea angustifolia minus serrata Bauh. In Austria, Helvetia, Dania.» *Solidago virgaurea* L.

XV(1)70. »Virga aurea Virginiana. Hoc nomine allata est ex horto Leidensi. Est levissime serrata.» Ist vielleicht *Aster ericoides* L.

XV(2)1. »Verbena communis cæruleo flore Bauh. Eisenkrautt. In Lusatia, Bohemia, Dania &c.» *Verbena officinalis* L.

XV(2)2. »Succisa glabra Bauh. Morsus diaboli Tab. Lob. Teuffels Abbiss. In Lusatia, Misnia, Dania &c.» *Succisa pratensis* Moench.

XV(2)3. »Succisa flore carneo. In Misnia.» Dieselbe Art.

XV(2)4. »Succisa flore albo. In Lusatia.» Dieselbe Art.

XV(2)5. »Scabiosa pratensis hirsuta Bauh. Scabiosen. Scabiosa major arvensis Tab. In Misnia, Bohemia, Dania &c.» *Knautia arvensis* (L.) Duby.

XV(2)6. »Scabiosa pratensis flore albo. In Misnia.» Dieselbe Art.

XV(2)7. »Scabiosa major squammatis capitulis Bauh. Iacea nigra major laciniosa Advers. In Lusatia, Misnia, Dania &c.» *Centaurea scabiosa* L.

XV(2)8. »Scabiosa majorsquammatis capitulis flore albo. In Saxonia.» Dieselbe Art.

XV(2)9. »Scabiosa major altera squammatis capitulis, sive Iacea rubra latifolia laciniata Bauh. In Lusatia.» Dieselbe Art.

XV(2)10. »Scabiosa multifido folio flore flavescente Bauh. Scabiosa ὀχράνθεμος Iungermanni. In Misnia, Thuringia, Bavaria.» Dürfte *Scabiosa columbaria* L. var. *ochroleuca* (L.) sein.

XV(2)11. »An Scabiosa flore globoso niveo Bauh. Etsi albus sit flos, non t(ame)n niveus. Monspelii in collibus aridioribus.» *Cephalaria leucantha* (L.) Schrad. (Studien, p. 91.)

XV(2)12. »Scabiosa alpina foliis Centaurei majoris Bauh. Lipsiæ et Basileæ in hortis.» *Cephalaria alpina* (L.) Schrad.

XV(2)13. »Scabiosa montana glabra, foliis Scabiosæ vulgaris Bauh. In Austria.» *Scabiosa columbaria* L.

XV(2)14. »Scabiosa montana latifolia non laciniata Bauh. Ad Carolinas in Bohemia.» Der Blütenstand ist weggefallen; es scheint *Knautia silvatica* (L.) Duby zu sein.

XV(2)15. »Scabiosa argentea angustifolia Bauh. Figura e(st) in Prodromo. In Italia.» *Scabiosa graminifolia* L.

XV(2)16. »An Scabiosa montana minor capitulo squammoso Bauh? Scabiosa montana o(mn)ium minima Advers. Nisi sit Carduus mollis I. Clus. pann. In Pyrenæis, qua in Hispaniam declives sunt.» *Jurinea humilis* DC.

XV(2)17. »Scabiosa peregrina rubra, capitulo oblongo Bauh. Scabiosa Indica Clus. Lipsiæ et Monspelii in hortis.» *Scabiosa maritima* L. var. *atropurpurea* (L.).

XV(2)18. »Scabiosa capitulo globoso major Bauh. Scabiosa minor Lob. Monspelii sponte.» *Scabiosa columbaria* L.

XV(2)19. »Eadem cum præcedente, pinguiore solo nata. Monspelii.» *Scabiosa maritima* L.

XV(2)20. »Scabiosa capitulo globoso minor Bauh. Scabiosa minor Tab. In Lusatia, Bohemia, Dania &c.» *Scabiosa columbaria* L.

XV(2)21. »Scabiosa capitulo globoso, foliis in tenuissimas lacinias divisis Bauh. In Lusatia.» Wahrscheinlich dieselbe Art.

XV(2)22. »Scabiosa stellata folio laciniato major Bauh. Scabiosa Hispanica major Clus. Spanische Scabiosen. Monspelii, Parisiis, Florentiæ in hortis.» *Scabiosa stellata* L.

XV(2)23. »Scabiosa stellata minima Bauh. In GalloProvincia sponte.» Sehr kleine Exemplare derselben Art.

XV(2)24. »Scabiosa stellata folio non dissecto Bauh. Scabiosa arborea nominabatur a Monacho horti Præfecto. Pisis in horto Magni Ducis.» *Scabiosa cretica* L.

XV(2)25. »Iacea nigra pratensis latifolia Bauh. Flockenblum. In Lusatia, Bohemia, Dania.» *Centaurea jacea* L.

XV(2)26. »Iacea nigra angustifolia vel Lithospermi arvensis folio Bauh. Monspelii.» *Centaurea amara* L.

XV(2)27. »Habet florem album, et longiora folia quam præcedens. Basileæ.» Ist vielleicht *Centaurea decipiens* Thuill.

XV(2)28. »Iacea fruticans Pini folio Bauh. Basileæ accepi a Bauhino.» *Cirsium chamaepeuce* (L.) Ten.

XV(2)29. »Iacea integrifolia humilis Bauh. Prope oppidum Melck Austriæ.» Scheint *Centaurea axillaris* Willd. zu sein. (Studien, p. 92.)

XV(2)30. »Iacea latifolia capite hirsuto Bauh. Iacea Austriaca villoso capite Clus. In pratis montosis Misniæ, Bohemiæ.» Dürfte *Centaurea pseudophrygia* C. A. M. sein.

XV(2)31. »Iacea angustifolia capite hirsuto Bauh. Prope Gothardum Rhaetiæ.» Dieselbe Art.

XV(2)32. »Iacea alba hirsuto capite Bauh. In montibus Misniæ.» Eine hellfarbige Form derselben Art.

XV(2)33. »An Iacea nigra laciniata Bauh? Iacea montana hirsuto capite Clus. pann. Basileæ.» *Centaurea nigra* L.

XV(2)34. »Iacea humilis alba Hieracii folio Bauh. Iacea pumila, humilis, serpens, acaulis ferme Advers. In horto acq(ui)sivit caulem altiorem. Monspelii in horto Regio, et Soræ in meo horto.» *Centaurea pullata* L.

XV(2)35. »Iacea lutea capite spinoso Bauh. Monspelii sponte.» *Centaurea collina* L.

XV(2)36. »Sola cultura differt a præcedente. In hortis Misniæ.» Gehört vielleicht derselben Art.

XV(2)37. »Præcedenti affinis. Scabiosæ spinosæ Clusii nomine dedit M. Urstisius Basileæ.» Zu wenig entwickelt, vielleicht dieselbe Art.

XV(2)38. »Iacea Cyanoides echinato capite Bauh. Iacea major Lob. Monspelii.» *Centaurea aspera* L.

XV(2)39. »An sint folia inferiora præcedentis seu primum nascentia? Monspelii.» Nur Blätter.

XV(2)40. »Iacea Cyanoides flore albo. Monspelii.» *Centaurea aspera* L.

XV(2)post 40. »Iaceæ marinæ nomine dabat Bauhinus. Basileæ.» Scheint mir eine Form von *Centaurea paniculata* L. mit fast ganzrandigen Schuppen zu sein.

XV(2)41. »Iacea montana incana mollis capitulis hispidis Bauh. In valle cava dicta, non longe Monspelio.» *Centaurea pectinata* L.

XV(2)42. »Iacea montana incana aspera capitulis hispidis Bauh. Ad oppidum Vigant GalloProvinciæ. Folia prorsus carent pediculis, secus quam in præcedente.» Dieselbe Art.

XV(2)43. »Iacea montana candidissima Stoebes foliis Bauh. Figura e(st) in Prodromo. Basileæ dedit Bauhinus Norinberga allatam.» *Centaurea cineraria* L.

XV(2)44. »Iacea montana incana, capite Pini Bauh. Chamæleon non aculeatus, sive Iacea montana et Carduus Pinus Narbonens. Advers. Monspelii.» *Leuzea conifera* (L.) DC.

XV(2)45. »an Iacea montana incana odora Bauh? Iacea montana Narbonensis Lob. prope Vormatiam.» Blattrosetten, möglicherweise der vorigen Art.

XV(2)46. »Iacea oleæ folio, capitulis simplicibus Bauh. Ptarmica Austriaca Clus. Monspelii, Florentiæ, et in Rhætia.» *Xeranthemum cylindraceum* S. & Sm. und *X. inapertum* L.

XV(2)47. »Exilitate differt a præcedente. an Iacea Oleæ folio, minore flore Bauh? Florentiæ.» *Xeranthemum cylindraceum* S. & Sm.

XV(2)48. »Stoebe major foliis Cichoraceis, mollibus lanuginosis Bauh. Stoebe major Tab. Monspelii.» *Microlonchus salmanticus* (L.) DC.

XV(2)(48 bis). »Eadem cum præcedente prout v(idelicet?) in hortis p(ro)venit. Hafniæ in horto Clariss. Dn D. Olai Wormii.» Dieselbe Art.

XV(2)49. »Stoebe vel Iacea, vel Centaurium. Florentiæ.» Nur ein Blatt.

XV(2)50. »Stoebe major calyculis non splendentibus Bauh. In Bavaria.» *Centaurea maculosa* Lam.

XV(2)51. »Stoebe calyculis argenteis minor Bauh. Iacea alba Tab. Monspelii.» *Centaurea paniculata* L. und vielleicht *C. maculosa* Lam.

XV(2)52. »Stoebe calyculis argenteis minor flore albo. Parisiis.» *Centaurea paniculata* L. (nicht maculosa Lam., wie ich in Studien, p. 92, angegeben habe).

XV(2)53. »Stoebe quædam capitulis argenteis splendentibus. Monspelii.» *Centaurea jacea* L., forma (Studien, p. 92).

XV(2)54. »Stoebe spinosa maritima Bauh. Basileæ dedit Bauhinus.» Ein kleiner steriler Zweig, vielleicht von *Centaurea spinosa* L.

XV(2)55. »An sit folium infimum præcedentis? Iaceæ spinosæ nomine dabat Monachus, horti præfectus. Pisis in horto Magni Ducis.» Nur ein Blatt.

XV(2)56. »Cyanus montanus latifolius: vel Verbasculum Cyanoides Bauh. Cyanus major Lob. grosse Kornblumen. In Helvetia et Austria superiore sponte.» *Centaurea montana* L.

XV(2)57. »Cyanus segetum Bauh. Kornblumen. Passim.» *Centaurea cyanus* L.

XV(2)58. »Cyanus hortensis flore simplici Bauh. In hortis passim.» Dieselbe Art.

XV(2)59. »Cyanus hortensis flore albo. In hortis.» Dieselbe Art.

XV(2)60. »Cyanus hortensis flore albo, fundo cæruleo. In hortis.» D:o.

XV(2)61. »Cyanus hort. albus fundo carneo. In hortis.» D:o.

XV(2)62. »Cyanus hortensis flore carneo, fundo rubro. In hortis.» D:o.

XV(2)63. »Tragopogon pratense luteum maius Bauh. Bocksbarth, Morgenstern. In Misnia, Bavaria, Dania.» *Tragopogon pratensis* L.

XV(2)64. »Tragopogon laciniatum luteum Bauh. Chondrilla coronopifolia Iungermanni. Lipsiæ sub stillicidiis, et ad fossas urbis.» *Podospermum laciniatum* (L.) DC.

XV(2)65. »Tragopogon laciniatum luteum humile aliud, nonnihil lanuginosum. Monspelii sponte.» *Podospermum laciniatum* (L.) DC. (Studien, p. 92.)

XV(2)66. »Tragopogon laciniatum luteum erectius et altius. Florentiæ.» D:o, oder vielleicht *P. Jacquinianum* Koch. (Studien, p. 92.)

XV(2)67. »Tragopogon luteum minimum procumbens, foliolis iunceis. Chondrilla pumila graminea. Ad pagum Fünffhunden, non procul Cadana Bohemiæ in pratis.» *Podospermum laciniatum* var. *integrifolium* Led. (Studien, p. 92.)

XV(2)68. »Tragopogon gramineo folio radice villosa Bauh. Barbula hirci minor Tab. Lipsiæ in horto Deurlingi.» Nur ein Blütenstengel einer *Scorzonera*.

XV(2)69. »Tragopogon purpurocæruleum porri folio, quod Artifi vulgo Bauh. Monspelii et Hafniæ sponte.» *Tragopogon porrifolius* L.

XV(2)70. »Scorzonera latifolia sinuata Bauh. Scorzonera Hispanica Tab. Schlangenwurtz. Argentorati in horto D. Oberndorfferi. Hafniæ in horto D. Fürenii. q(ui)dem et Soræ in meo.» *Scorzonera hispanica* L.

XV(2)71. »Scorzonera latifolia altera Bauh. Scorzonera Germanica Tab. Ingolstadii.» *Scorzonera humilis* L.

XV(2)72. »Scorzonera latifolia humilis nervosa Bauh. In Colleudaneis GalloProvinciæ montibus.» *Scorzonera austriaca* Willd.

XV(2)73. »Scorzonera angustifolia I. Bauh. Scorzonera Pannonica III. Clus. In Gallia, Seelandia.» *Scorzonera humilis* L. var. *angustifolia*.

XV(2)74. »An Scorzonera angustifolia altera Bauh. In GalloProvincia.» *Scorzonera hirsuta* L.

XV(2)75. »Scorzonera angustifolia subcærulea Bauh. Lipsiæ co(mmun)icavit Iungermannus.» Unvollständiges Exemplar, wahrscheinlich *Scorzonera purpurea* L.

XV(2)76. »Caltha vulgaris Bauh. Calendula Dod. Ringelblumen. In hortis passim.» *Calendula officinalis* L.

XV(2)77. »Caltha polyanthos maxima Bauh. grosse gefültte Ringelblumen. In hortis Misniæ.» D:o fl. pleno.

XV(2)78. »Caltha polyanthos major Bauh. Basileæ &c. in hortis.» D:o.

XV(2)79. »Caltha prolifera majoribus floribus Bauh. Calendula prolifera Tabern. In hortis passim.» D:o f. prolifera.

XV(2)80. »Caltha prolifera minoribus floribus Bauh. Basileæ in hort.» D:o.

XV(2)81. »Caltha arvensis Bauh. Monspelii.» *Calendula arvensis* L.

XV(2)82. »Caltha palustris flore simplici Bauh. Populago Tab. Dotterblumen. In Germania, Dania.» *Caltha palustris* L.

XV(2)post 82. »Caltha palustris flore magno, violam redolente. Ex Belgio.» *Caltha palustris* L. (Studien, p. 93.)

XV(2)83. »Caltha palustris flore pleno Bauh. Populago multiflora Tab. Basileæ et Hafniæ in hortis.» D:o fl. pleno.

XV(2)84. »Helenium vulgare Bauh. Alandtwurtz. Enula campana. Passim in hortis. In Seelandia sponte.» *Inula helenium* L.

XV(2)85. »Helenium Indicum maximum Bauh. Helianthemum Peruvianum Cam. in ep. Matth. Sonnenblum. Passim in hortis.» *Helianthus annuus* L.

XV(2)86. »Helenium Indicum ramosum Bauh. Monspelii in hort.» *Helianthus* spec.
XV(2)87. »Helenium Indicum minus Bauh. Florentiæ in hort.» *Helianthus annuus* L.
XV(2)(87 bis). »Hoc potius est Helenium Indicum minus Bauh. Ex horto Leydensi.» *Helianthus* spec.
XV(2)88. »Helianthemum Indicum tuberosum Bauh. Artischocken. Vutter der erden. In hortis Galliæ, Italiæ, Germaniæ, Daniæ.» *Helianthus tuberosus* L.

VOLUMEN XVI.

Horti sicci, seu stirpivm, studio et labore D. Ioachimi Burseri Camentio-Lusati, in Regia Nobilium Academia Sorana Medici et professor. Phys. publici, per diversas regiones et loca collectarum et secundum seriem Pinacis Bauhiniani digestarum, Volumen XVI. continens Sectionem 5. et 6. libri septimi Pinacis dicti.

XVI(1)1. »Perfoliata vulgatissima, sive arvensis Bauh. Durchwachs. In Bavaria, Helvetia sponte.» *Bupleurum rotundifolium* L. (Studien, p. 93.)
XVI(1)2. »Perfoliata montana latifólia Bauh. Perfoliata mont. Gesn. Camer. in icon. A parente.» *Bupleurum longifolium* L. (Studien, p. 93.)
XVI(1)3. »An Perfoliata alpina latifolia minor Bauh. Erphordia accepi a Schadio.» *Bupleurum longifolium* L.
XVI(1)4. »Perfoliata alpina angustifolia major, sive folio anguloso Bauh. In monte Tarbo Pyrenæorum.» *Bupleurum angulosum* L. (Studien, p. 93.)
XVI(1)5. »Perfoliata alpina angustifolia media Bauh. In Rhætia prope Gothardum, unde Bauhino attuli.» *Bupleurum stellatum* L. (Studien, p. 93.)
XVI(1)6. »Perfoliata alpina angustifolia minor Bauh. In alpibus Vallesiæ, unde Bauhino co(mmun)icavi.» *Bupleurum ranunculoides* L., vielleicht var. *caricinum* DC. (Studien, p. 94.) Linné zitiert diese Nr. unter B. angulosum var. β. Von dieser Var. sagt Richter. Codex Linn., p. 254: »Car. β. specie diversa est B. Burserianum Willd. enum.» Dies ist ein nomen nudum im Supplement zu Willd:s Enum. hort. Berol., p. 14, aber in Syst. Veg. ed. Roem. et Schult., vol. VI, p. 367, sagt Sprengel unter B. angulosum: »B. Burserianum W. nil aliud est.»
XVI(1)7. »Perfoliata minor angustifolia Bupleuri folio Bauh. Dedit Bauhinus Basileæ.» *Bupleurum odontites* L. oder *aristatum* Bartl. (Studien, p. 94.)
XVI(1)8. »Perfoliata alpina angustifolia minima: vel Bupleurum angustifolium Pyrenæum Bauh. In Pyrenæis, unde Bauhino attuli.» Kaum sicher bestimmbar; vielleicht dieselbe wie Nr. 6. (Studien, p. 94.)
XVI(1)9. »Bupleuron folio rigido Bauh. Hasenöhrlin. Monspelii.» Das Exemplar ist nicht mehr da, nach den Spuren zu urteilen kann es *Bupleurum rigidum* L. gewesen sein. (Studien, p. 94.)
XVI(1)10. »Bupleuron folio subrotundo, sive vulgatissimum Bauh. Herba vulneraria Trago. Basileæ, et ad Pfortam, scholam Electoralem in Misnia.» *Bupleurum falcatum* L. (Studien, p. 94; dort steht unrichtig Elegantem.)
XVI(1)11. »Bupleuron angustissimo folio Bauh. Halæ Saxonum et ad Frontignanum Galliæ Narb.» Das Exemplar fehlt jetzt. (Studien, p. 94.)
XVI(1)12. »Centaurium minus Bauh. Tausendgüldenkrautt. Passim.» *Erythraea centaurium* (L.) Pers. (Studien, p. 4.)

XVI(1)13. »Centaurium minus flore albo. In Lusatia. Florentiæ. In Seelandia.» *Erythraea centaurium* (L.) Pers. und *E. linariifolia* Pers. (Studien, p. 95.)

XVI(1)14. »Centaurium minus spicatum album Bauh. Figuram habet Prodromus. Dedit Bauhinus, sibi Monspelio missum.» *Erythraea spicata* (L.) Pers. (Studien, p. 95.)

XVI(1)15. »Centaurium perfoliatum Bauh. Basileæ. Item in Vallesia, et pratis Tyrolensibus.» *Chlora perfoliata* L. (Studien, p. 95.)

XVI(1)16. »Gratiola Centauroides Bauh. Aurin. In Lusatia, Gallia.» *Gratiola officinalis* L.

XVI(1)17. »Idem cum antecedente. Parisiis, Monspelii. Item in Helvetia non longe ab oppido Einsidel.» D:o. (Studien, p. 95.)

XVI(1)18. »Hypericum vulgare Bauh. Herba perforata Trag. S. Johannskrautt. Passim.» *Hypericum quadrangulum* L.

XVI(1)19. »Hypericum caule quadrato, prout scil. in palustribus nascitur. Passim.» *Hypericum tetrapterum* Fr.

XVI(1)20. »Hypericum Numulariæ folio Bauh. In Pyrenæis.» Nur wenig ist übrig, es ist gewiss *Hypericum nummularium* L. (Studien, p. 95.)

XVI(1)21. »Hypericum minus erectum Bauh. Cremsæ in Austria.» *Hypericum veronense* Schrank (nicht elegans Steph.).

XVI(1)22. »Hypericum minus supinum, vel supinum glabrum Bauh. In Lusatia, Misnia, Helvetia, Dania.» *Hypericum humifusum* L.

XVI(1)23. »Hypericum supinum tomentosum minus vel Monspeliacum Bauh. Monspelii. *Hypericum tomentosum* L.

XVI(1)24. »Ascyrum sive Hypericum bifolium glabrum, non perforatum Bauh. Harttheuw in hecken. Passim.» *Hypericum quadrangulum* L.

XVI(1)25. »Ascyron magno flore Bauh. In Pyrenæis.» *Hypericum Burseri* (DC.) Spach. (Studien, p. 95.)

XVI(1)26. »Androsæmum hirsutum Bauh. Harttheuw. Passim.» *Hypericum hirsutum* L.

XVI(1)27. »Androsæmum maximum frutescens Bauh. Herba Siciliana Tabern. In Gallia Narbonensi sponte.» *Androsaemum officinale* All.

XVI(1)28. »Androsæmum fætidum, capitulis longissimis filamentis donatis Bauh. Basileæ in horto.» *Androsaemum hircinum* (L.) Spach.

XVI(1)29. »Coris lutea Bauh. A parente.» *Hypericum coris* L.

XVI(1)30. »Coris cærulea maritima Bauh. Coris Monspeliaca Tabern. Erdtkifer. Monspelii.» *Coris monspeliensis* L.

XVI(1)31. »Symphytum petræum Matth. Dabat Bauhinus Basileæ, asserens eodem quo Matthiolus dicit loco fuisse lectum. Sed videtur esse Satureia.» Vom Exemplar ist nichts mehr da.

XVI(1)32. »Polygonum latifolium Bauh. Weggrass. Passim.» *Polygonum aviculare* L.

XVI(1)33. »Polygonum oblongo angusto folio Bauh. In Lusatia.» *Polygonum heterophyllum* Lindm. var. *angustissimum* (Meissn.).

XVI(1)34. »Polygonum brevi angustoque folio Bauh. In Misnia &c.» *Polygonum calcatum* Lindm.

XVI(1)35. »Polygonum maritimum latifolium Bauh. Meerweggrass. Monspelii et in Italia.» *Polygonum maritimum* L.

XVI(1)36. »An Polygonum cocciferum Bauh? A parente.» *Polycnemum arvense* L.

XVI(1)37. »Simile præcedenti. aut est Camphorata Monspeliaca. Prope Comonam Ungariæ.» *Camphorosma ovata* W. & K.

XVI(1)38. »Polygonum angustissimo et acuto vel gramineo folio minus, repens Bauh. Knauwel. In Lusatia, Misnia, Gallia, Dania &c. Polygonum minus polycarpon Tab.» *Scleranthus perennis* L. und *S. annuus* L.

XVI(1)39. »Anglica Saxifraga Advers. videtur quam Bauhinus cum præcedente eandem facit, cum tamen hæc sit perennis. Ad oppidum Merues prope Hortum Dei.» *Alsine rostrata* Koch.

XVI(1)40. »Polygonum gramineo folio maius erectum Bauh. Anthyllis Valentina Clus. In Vallesia.» *Alsine fasciculata* M. & K.

XVI(1)41. »Simile præcedenti. Monspelii.» *Buffonia tenuifolia* L.

XVI(1)42. »Polygono angustissimo folio affinis Bauh. Hæmorrhoidalis. Ingolstadii, et in Vallesia.» *Tunica saxifraga* (L.) Scop.

XVI(1)43. »Polygonum minus candicans Bauh. Paronychia Hispanica Clus. In GalloProvincia.» *Paronychia capitata* Lam.

XVI(1)44. »Polygonum littoreum minus flosculis spadiceo albicantibus Bauh. In Lusatia inferiori et Basileæ.» *Corrigiola littoralis* L.

XVI(1)45. »Polygonum minus lentifolium Bauh. Florentiæ. Monspelii.» *Polycarpon tetraphyllum* L.

XVI(1)46. »Polygonum maritimum minus foliolis serpilli Bauh. Dedit ipse Bauhinus cum nomine.» *Frankenia hirsuta* L. var. *laevis* (L.).

XVI(1)47. »Præcedenti simile. Massiliæ prope portum.» *Frankenia hirsuta* L.

XVI(1)48. »Polygonum minus seu Millegrana major Bauh. Herniaria Tab. Harnkrautt. In Helvetia, Bohemia, Dania.» *Herniaria glabra* L.

XVI(1)49. »Herniaria hirsuta. Basileæ.» *Herniaria hirsuta* L.

XVI(1)50. »Polygonum minimum, sive Millegrana minima Bauh. In Lusatia, Misnia.» *Radiola linoides* Gmel.

XVI(1)51. »an Anthyllis maritima Chamæsycæ similis Bauh? Florentiæ.» *Euphorbia chamaesyce* L.

XVI(1)52. »Sedum maius arborescens flosculis candidis Bauh. Haussloch, grosse hausswurtz. Florentiæ in horto.» Rosette von *Sempervivum arboreum* L.

XVI(1)53. »Sedum maius vulgare Bauh. Passim.» Rosette eines *Sempervivum*.

XVI(1)54. »Sedum maius montanum dentatis foliis Bauh. Cotyledon altera montana Clus. Ad radicem Taureri Rastadiensis.» *Sempervivum hirtum* L.

XVI(1)55. »Sedum maius montanum, foliis bon dentatis, floribus rubentibus Bauh. In montibus Helveticis.» *Sempervivum arachnoideum* L.

XVI(1)56. »Sedum minus teretifolium album Bauh. In Lusatia, Helvetia, Dania.» *Sedum album* L.

XVI(1)57. »Sedum minus teretifolium alterum Bauh. In Pyrenæis, flosculis albis.» Oben ein Exemplar mit abgefallenen Blättern, wahrscheinlich *Sedum anglicum* Huds. Unten *Sedum dasyphyllum* L.

XVI(1)58 »Videtur idem cum præcedente. Prope Miele montem Helvetiæ, non longe ab Einsidel.» *Sedum hispanicum* L.

XVI(1)59. »Sedum minus teretifolium luteum Bauh. In Germania, Gallia &c.» *Sedum reflexum* L.

XV(1)60. »An Sedum minus folio circinato Bauh? In Italia. flosculis albis.» *Sedum dasyphyllum* L.

XVI(1)61. »Sedum minus album, ramulis reflexis Bauh. In Helvetia.» *Sedum acre* L.

XVI(1)62. »Sedum arvense flore rubente Bauh. Prope Pyrenæos. Florentiæ.» *Sedum rubens* L.

XVI(1)63. »Sempervivum minus vermiculatum acre Bauh. Mauwerpfeffer. Katzentreublin. Passim.» *Sedum acre* L.

XVI(1)64. »Sempervivum minus vermiculatum insipidum Bauh. Legi hoc exemplar in Pyrenæis.» *Sedum alpestre* Vill.

XVI(1)65. »Sedum minus fruticosum Bauh. Sedum minimum arborescens vermiculatum Lob. Prope Arelatum Gallor. sponte.» *Suaeda fruticosa* (L.) Forsk.

XV(1)66. »an Sedum minus fruticosum alterum Bauh? In horto Regio Monspelii. Item Florentiæ, Pisis in hortis.» *Suaeda fruticosa* (L.) Forsk.

XVI(1)67. »An Sedum alpinum Saxifragæ albæ flore vel grandiflorum Bauh? In Pyrenæis.» *Sedum hirsutum* All. (Studien, p. 95.)

XVI(1)68. »An hoc potius sit Sedum alpinum grandiflorum Bauh. In Taurero Rastadiensi.» *Saxifraga Burseriana* L. (Studien, p. 96.)

XVI(1)69. »Convenit cum præcedente. Prope Thermas fabarias Helvet.» *Saxifraga bryoides* L. (Studien, p. 96.)

XVI(1)70. »Sedum alpinum album foliolis compactis Bauh. In montibus Helvetiæ, Austriæ, Pyrenæis.» *Saxifraga caesia* L.

XVI(1)71. »Sedum saxatile humillimum, foliolis densissime compactis, flosculum fere sine pediculo proferens &c. In alpibus Vallesiæ prope Gletzscher et montibus Austriæ.» *Aretia imbricata* (Lam.) Pax. (Studien, p. 96.) Dieses Blatt folgt nach Nr. 72. Burser hat »71» geschrieben, Rudbeck hat es mit »72 b» ersetzt.

XVI(1)72. »Sedum alpinum hirsutum lacteo flore Bauh. In Pyrenæis.» *Androsace chamaejasme* Host.

XVI(1)73. »Sedum alpinum gramineo folio flore lacteo Bauh. In Draunstein monte Austriæ sup(er)ioris.» Vom Exemplar ist wenig übrig, es dürfte *Androsace lactea* L. sein.

XVI(1)74. »Sedum alpinum flore pallido Bauh. Sedum alpinum I. Clus. pann. In alpibus passim. Flos ex luteo pallescit.» *Saxifraga aizoides* L.

XVI(1)75. »An Sedum alpinum angustissimo folio, flore carneo Bauh? In Pyrenæis.» *Androsace carnea* L.

XVI(1)76. »Sedum saxatile atrorubentibus floribus Bauh. In alpibus Austriæ, Helvetiæ, et Pyrenæis.» *Sedum atratum* L. (Studien, p. 96.)

XVI(1)77. »An Sedum saxatile variegato flore Bauh? In altissimo Vallesiæ monte, im Loch dicto.» *Aretia alpina* L. (Studien, p. 97.)

XVI(1)78. »Sedum alpinum hirsutum luteum Bauh. In montibus Helvetiæ.» Drei Exemplare sind *Draba aizoides* L., das vierte hat kurze und breite Blätter und ist villeicht *D. Zahlbruckneri* Host.

XVI(1)79. »An Sedum alpinum foliis crenatis asperis Bauh. Quamvis in Prodromo flores purpurascentes ei tribuat, cum t(ame)n candidi sint. Prope Gothardum.» *Saxifraga aspera* L.

XVI(1)80. »Sedum alpinum ericoides purpurascens Bauh. In Pyrenæis.» *Saxifraga oppositifolia* L.

XVI(1)81. »Sedum alpinum ericoides cæruleum Bauh. In Gothardo. Item in altissimo quodam monte inter Rhætiam et Vallesiam sito.» *Saxifraga oppositifolia* L.

XVI(1)82. »Præcedenti simile est. In Pyrenæis.» Vegetative Sprosse derselben Art.

XVI(1)83. »Sedum alpinum trifido folio Bauh. In Pyrenæis, et in alpibus Austriæ.» *Saxifraga muscoides* Wulf.

XVI(1)84. »Videtur idem cum præcedente.» In Gothardo et Pyrenæis.» Ähnelt am meisten *Saxifraga nervosa* Lap., wohl also aus den Pyrenäen.

XVI(1)85. »Sedum alpinum Aiugæ folio nonnihil hirsutum, flosculis albis. In Gallo-Provinciæ montibus.» Dürfte *Saxifraga hypnoides* L. sein. (Studien, p. 97.)

XVI(1)86. »An Saxifraga alba petræa Ponæ apud Clus. hist. p. CCCXXXVII. Differt a subsequente potiss. floribus. folia etiam (si bene memini) adhærebant instar Aparines. In Pyrenæis.» *Saxifraga geranioides* L. (Studien, p. 98.)

XVI(1)87. »Sedum tridactylites alpinum majus album Pyrenaicum Bauh. c(ui)us in Prodromo meminit. In Pyrenæis, unde Bauhino attuli.» *Saxifraga aquatica* Lap. (Studien, p. 98, wo ich »III» anstatt »cuius» gelesen habe.)

XVI(1)88. »Sedum tridactylites alpinum pallide luteum Bauh. In Taurero Rastadiensi.» Ist *Saxifraga exarata* Vill. sehr ähnlich, obgleich die Nervatur der Blätter nur wenig hervortritt.

XVI(1)89. »Sedum tridactylites alpinum caule folioso. In Taurero Rastadiensi.» *Saxifraga adscendens* L. (Studien, p. 98.)

XVI(1)90. »Sedum tridactylites alpinum minus Bauh. In Gothardo, et in moenibus oppidi Merues prope montem Calcaris in Gallia Narbonensi.» *Saxifraga exarata* Vill.

XVI(1)91. »Sedum tridactylites tectorum Bauh. Paronychia altera rutaceo folio Lob. Monspelii, Ingolstadii, Roscheldiæ.» *Saxifraga tridactylites* L.

XVI(1)92. »Sedum palustre subhirsutum purpureum Bauh. Prope Einsidel oppidum Helvetiæ. Item in Austria, Bohemia.» *Sedum villosum* L.

XVI(1)93. »Cotyledon major Bauh. Nabelkrautt. Florentiæ. Monspelii. Umbilicus ♀. Tab.» *Umbilicus pendulinus* DC.

XVI(1)post 93. »Cotyledon minus montanum Sedi folio Lobel. Hoc nomine accepi ex Belgio. An differat a præcedente?» Zusammengefügt aus zwei Stammblättern von *Umbilicus pendulinus* DC. und der Inflorescenz einer anderen Pflanze.

XVI(1)94. »Cotyledon media foliis subrotundis Bauh. In Rhætia.» *Saxifraga cotyledon* L.

XVI(1)95. »An hoc potius sit Cotyledon media foliis subrotundis Bauh? An Cotyledon minor foliis subrotundis serratis Bauh. In Rhætia. Inter Logan et Belinzonam.» *Saxifraga cuneifolia* L.

XVI(1)96. »Similis præcedenti. In Pyrenæis.» *Saxifraga umbrosa* L.

XVI(1)97. »Cotyledon media foliis oblongis serratis Bauh. Palmaria Tabern. In monte Wasserfall Helvetiæ. klein Nabelkrautt.» *Saxifraga aizoon* Jacq.

XVI(1)98. »Cotyledon media floribus luteis. In Helvetia, Vallesia, Carinthia.» *Saxifraga mutata* L. (Studien, p. 98.)

XVI(1)99. »Cotyledon media subhirsuta floribus punctatis Bauh. Prope oppidum Merues in Sevenis. Minimum accepi ex Norwegia.» Das grössere Ex. ist *Saxifraga stellaris* L. oder die nah vewandte *S. Clusii* Gou., das kleinere ist *S. stellaris* L.

XVI(1)100. »Convenit cum præcedente, nisi quod glabrior sit. In alpibus Helvetiæ et Styriæ.» *Saxifraga stellaris* L.

XVI(1)101. »Cotyledon stellata Bauh. Aizoon peregrinum Cam. Lipsiæ et Basileæ in hortis.» *Sedum stellatum* L.

XVI(1)102. »Cotyledon Anglica. An cum præcedente eadem? Basileæ dedit M. Urstisius.» Vegetativer Spross, der vorhergehenden Art ähnlich.

XVI(1)103. »Aloë vulgaris Bauh. Monspelii in hortis.» Ein Blatt von *Aloë* und ein Blatt einer anderen monokotyledonen Pflanze.

XVI(1)104. »Aloë folio in oblongum aculeum abeunte Bauh. Aloë Americana Clus. Monspelii et Florentiæ in hortis.» Das Blatt einer *Agave*.

XVI(1)105. »Aloë palustris Bauh. Sedum aquatile Dod. In Lusatia inferiori et Seelandia.» *Stratiotes aloides* L.

XVI(2)1. »Rhodia radix Bauh. Rosenwurtz. In alpibus Carinthiæ et Pyrenæis alias in hortis passim.» *Rhodiola rosea* L.

XVI(2)2. »Telephium vulgare Bauh. Fette henne. Passim.» Dürfte *Sedum purpureum* (L.) Link.

XVI(2)3. »Telephium purpureum maius Bauh. Basileæ.» *Sedum purpureum* (L.) Link.

XVI(2)4. »Telephium repens folio deciduo Bauh. Telephium minus Tabern. Lipsiæ et Basileæ in hortis.» *Sedum anacampseros* L.

XVI(2)5. »Telephium repens folio non deciduo Bauh. Telephium legitimum Imp(er)ati Clus. In GalloProvincia sponte.» *Telephium Imperati* L.

XVI(2)6. »Telephium Dioscoridis seu scorpioides Bauh. Scorpionkrautt. Monspelii et Florentiæ sponte.» *Coronilla scorpioides* (L.) Koch.

XVI(2)7. »Scorpioides Bupleuri folio Bauh. Raupenkrautt. In hortis Germaniæ, Helvetiæ, Daniæ.» *Scorpiurus subvillosus* L.

XVI(2)8. »Hauddubie idem cum p(ræ)cedente. In GalloProvincia sponte.» *Scorpiurus subvillosus* L.

XVI(2)9. »Portulaca latifolia seu sativa Bauh. Burtzelkrautt. In hortis passim.» *Portulaca oleracea* L. var. *sativa* (Haw.).

XVI(2)10. »Portulaca angustifolia sive sylvestris Bauh. In Italia sponte.» *Portulaca oleracea* L.

XVI(2)11. »Cepæa Bauh. &c. In Gallia et Italia. Welsch Harnkrautt.» *Sedum cepaea* L.

XVI(2)12. »Crithmum sive Foeniculum maritimum minus Bauh. Meerfenchel. Ad muros arcis Magalonæ prope Monspelium.» *Crithmum maritimum* L.

XVI(2)13. »Crithmum maritimum flore Asteris attici Bauh. Crithmum chrysanthemum Tab. Monspelii in littore. Item inter Pisas et Liburnum Italiæ.» *Inula crithmoides* L.

XVI(2)14. »Crithmum maritimum spinosum Bauh. Pastinaca marina Lob. Meer Pastenach. Stechend Bacillen. Monspelii in littore.» *Echinophora spinosa* L.

XVI(2)15. »Kali maius cochleato semine Bauh. Monspelii in littore.» *Salsola soda* L.

XVI(2)16. »Kali aliud ex Anglia. Basileæ dedit M. Urstisius.» Junger vegetativer Spross mit opponierten Blättern.

XVI(2)17. »Kali minus album semine splendente Bauh. Monspelii ad mare, et ad salinas Saxonicas. In Dania.» *Suaeda maritima* (L.) Dum.

XVI(2)18. »Kali minus alterum Bauh. Anthylloides Tahlii. Ad salinas Saxonicas.» *Spergularia marginata* (DC.) Kitt.

XVI(2)19. »Kali minus villosum Bauh. Monspelii in littore, et in Dania.» *Kochia hirsuta* (L.) Nolte.

XVI(2)20. »Kali gramineo folio Bauh. In Italia, et prope Salinas Saxonicas.» Vegetativer Spross, wahrscheinlich von *Salsola kali* L. var. *tragus* (L.).

XVI(2)21. »Kali Crassulæ minoris foliis Bauh. Kali II. Aegyptiacum Alpini appellabat mihi Bauhinus, cum plantam co(mmun)icaret Basileæ.» *Mesembrianthemum nodiflorum* L.

XVI(2)22. »Kali geniculatum maius Bauh. Monspelii in littore, et circa mare Balthicum.» *Salicornia fruticosa* L.

XVI(2)23. »Idem cum præcedente, non ita adultum. Ad salinas Saxonicas.» *Salicornia herbacea* L.

XVI(2)24. »Kali spinosum cochleatum Bauh. Drypis Theophrasti Tab. Monspelii. et in Dania.» *Salsola kali* L.

XVI(2)25. »Vix differt a præcedente. Prope Comonam Ungariæ.» D:o.

XVI(2)26. »Kali spinoso affinis Bauh. Tragum Matth. Tab. &c. In Italia.» Auch *Salsola kali* L.

XVI(2)27. »Tithymalus Characias amygdaloides Bauh. Wolffsmilch. A celle neufve non longe Monspelio.» *Euphorbia amygdaloides* L.

XVI(2)28. »An hic potius sit Tithymalus Characias amygdaloides Bauh? Ad oppidum Signo in GalloProvincia.» Dürfte *Euphorbia nicaeebsis* All. sein.

XVI(2)29. »Affinis præcedenti. Prope Ieres sive Olbyam GalloProvinciæ.» Scheint mir auch *Euphorbia nicaeensis* zu sein.

XVI(2)30). »Tithymalus Characias rubens peregrinus Bauh. Monspelii et in Italia. *Euphorbia characias* L.

XVI(2)31. »Tithymalus Characias folio serrato Bauh. Monspelii.» *Euphorbia serrata* L.

XVI(2)32. »Tithymalus Myrtifolius arboreus Bauh. Tithymalus dendroides Matth. Lob. Ad portum Veneris dictum non procul Genua. Prægrandis.» *Euphorbia dendroides* L.

XVI(2)33. »Videtur idem cum præcedente. Prope Insulas stoechadas.» Dieselbe Art.

XVI(2)34. »Tithymalus Myrsinites latifolius Bauh. Basileæ in hortis.» *Euphorbia myrsinites* L.

XVI(2)35. »Tithymalus Myrsinites angustifolius Bauh. Prope Spiram.» *Euphorbia Gerardiana* Jacq. (Studien, p. 98.)

XVI(2)36. »Præcedenti similis. In GalloProvincia.» D:o. (Studien, p. 98.) XVI(2) 36 b. »Præcedenti similis. In Austria.» D:o.

XVI(2)37. »Tithymalus Myrsinites angustioribus foliis et procerior. Monspelii.» D:o. (Studien, p. 98.)

XVI(2)38. »Tithymalus Myrsinites, fructu verruca simili Bauh. Ingolstadii, Florentiæ.» *Euphorbia verrucosa* L.

XVI(2)39. »Tithymalus maritimus Bauh. Monspelii et Liborni.» *Euphorbia paralias* L.

XVI(2)40. »An Tithymalo maritimo affinis Linariæ folio Bauh? Florentiæ in horto Magni Ducis.» Nur Reste von äusserst schmalen Blättern sind übrig.

XVI(2)41. »An sit Tithymalus amygdaloides angustifolius Tab., quem Bauhinus existimat coincidere cum præcedente? In Thuringia.» *Euphorbia Gerardiana* Jacq.

XVI(2)42. »Tithymalus maritimus spinosus Bauh. Pisis in horto Magni Ducis.» *Euphorbia spinosa* L.

XVI(2)43. »Tithymalus maritimus purpurascentibus floribus Bauh. Esula rara e Lio Venetorum Insula Lob. Florentiæ et Lipsiæ in hortis.» *Apocynum venetum* L.

XVI(2)44. »Pro Esula rara e Lio mittebatur a D. Weckerlino, qui forte in Belgio legerat. Sed videtur esse Myrtus Brabantica.» *Spiraea media* F. W. Schm. (Myrtus Brabantica ist Myrica gale.)

XVI(2)45. »Tithymalus latifolius Hispanicus Bauh. In alpibus Austriæ, Pannoniæ, et Pyrenæis.» *Euphorbia hyberna* L.

XVI(2)46. »Tithymalus arvensis latifolius Germanicus Bauh. Lipsiæ. Ingolstadii.» *Euphorbia platyphyllos* L.

XVI(2)47. »Præcedenti similis. Florentiæ.» *Euphorbia esula* L.

XVI(2)48. »Pityusa arvorum perennis repens Lud. Iungermanni. Lipsiæ in arvis et Ingolstadii.» Nur vegetative Sprosse.

XVI(2)post 48. »Pityusæ nomine accepi.» Wie vorige.

XVI(2)49. »Tithymalus helioscopius Bauh. Passim.» *Euphorbia helioscopia* L.

XVI(2)50. »Tithymalus Cyparissias, foliis punctis croceis notatis Bauh. Non est nisi monstrum sequentis, cum quo ex eadem radice nascitur, ut sæpe vidi. In Bohemia, Helvetia &c.» Über »monstrum» steht ein deutsches Wort, das ich nicht deuten konnte. Sprosse von *Euphorbia cyparissias*, von Aecidien eines *Uromyces* befallen.

XVI(2)51. »Tithymalus Cyparissias Bauh. In Misnia, Bohemia, Helvetia &c.» *Euphorbia cyparissias* L.

XVI(2)52. »Similis præcedenti. A Celle neuffe p(ro)pe Monspelium.» Links *Euphorbia Gerardiana* Jacq., rechts *E. segetalis* L.

XVI(2)53. »Tithymalus sive Esula exigua Bauh. In Lusatia, Bavaria, Helvetia.» *Euphorbia exigua* L.

XVI(2)54. »Tithymalus sive Esula exigua foliis obtusis Bauh. Ad tuguriola (a les Cabanes) non longe Massilia.» *Euphorbia exigua* L. var. *retusa* L.

XVI(2)55. »Tithymalus exiguus saxatilis Bauh. Prope Monspelium in monte saxoso, unde Bauhino transmisi.» *Euphorbia exigua* L., forma. (Studien, p. 99.)

XVI(2)56. »An Tithymalus foliis Pini Bauh. A parente.» *Euphorbia esula* L.

XVI(2)57. »Tithymalus palustris fruticans Bauh. Ingolstadii ad Danubium. In Lusatia inferiori.» Von anderer Hand: »Oelandicus». *Euphorbia palustris* L. (von Rudbeck Tithymalus maximus oelandicus genannt).

XVI(2)58. »Tithymalus montanus non acris Bauh. Esula dulcis Lob. In Misnia, Lusatia &c.» *Euphorbia dulcis* L.

XVI(2)59. »Tithymalus foliis brevibus aculeatis Bauh. Massiliæ et in Italia.» *Euphorbia pithyusa* L.

XVI(2)60. »Peplus sive Esula rotunda Bauh. Runde Wolffsmilch. In Lusatia, Misnia &c.» *Euphorbia peplus* L.

XVI(2)61. »Videtur eadem cum præcedente. Florentiæ.» Dieselbe Art.

XVI(2)62. »Peplis maritima folio obtuso Bauh. kleine Hundtsmilch. Monspelii in littore.» *Euphorbia peplis* L.

XVI(2)63. »Chamæsyce Bauh. &c. Monspelii. Kriechende kleine Hundtsmilch.» *Euphorbia chamaesyce* L.

XVI(2)64. »Lathyris major Bauh. Cataputis minor Lob. Sprengksteinkrautt. In hortis passim.» *Euphorbia lathyris* L.

VOLUMEN XVII.

Hortus siccus, seu stirpivm, studio et labore D. Ioachimi Burseri Camentio-Lusati, in Regia Nobilium Academia Sorana Medici et professoris Physices publ. per diversas regiones et loca collectarum et secundum seriem Pinacis Bauhiniani digestarum Volumen XVII, continens Sectionem 1. 2. 3. et 4. libri octavi Pinacis illius.

XVII.1. »Scammonia Syriaca Bauh. Dedit Bauh. Basileæ.» Dürfte *Convolvulus scammonia* L. sein.

XVII.2. »Scammonia Monspeliaca, foliis rotundioribus Bauh. Monspelii in littore.» *Cynanchum acutum* L. var. *monspeliacum* (L.) .

XVII.3. »Convolvulus major albus Bauh. grosse Winde. Zaunglocken. In Lusatia, Misnia, Helvetia, Dania &c.» Volubilis major Tabern.» *Convolvulus sepium* L.

XVII.4. »Convolvulus minor arvensis Bauh. kleine Winde. Volubilis arvensis Tabern. In Lusatia, Misnia, Bohemia, Helvetia, Dania &c.» *Convolvulus arvensis* L.

XVII.5. »Convolvulus minor, semine triangulo Bauh. Buchwinde. In Lusatia, Helvetia, Dania &c. Volubilis nigra Tabern.» *Polygonum convolvulus* L.

XVII.6. »Convolvulus cæruleus hederaceus anguloso folio Bauh. Blauwe Winde. Florentiæ et Basileæ in hort.» *Ipomoea hederacea* (L.) Jacq.

XVII.7. »Convolvulus purpureus folio subrotundo Bauh. Braune Winde. Basileæ in hort.» *Ipomoea purpurea* (L.) Lam.

XVII.8. »Convolvulus peregrinus cæruleus, folio oblongo Bauh. Kleine blauwe Winde. Parisiis et Basileæ in hort. Semen attuli Bauhino ex horto Robini.» *Convolvulus tricolor* L.

XVII.9. »Convolvulus argenteus Althææ folio Bauh. In GalloProvincia, et Genuæ Italiæ.» *Convolvulus althaeoides* L.

XVII.10. »Idem cum præcedente, licet folia obesiora hirsutiora obtineat. Iisdem locis.» Dieselbe Art.

XVII.11. »Convolvulus Linariæ folio Bauh. Convolvulus minimus Spicæfolius Lob. Cantabrica quorundam Clus. Monspelii.» *Convolvulus cantabrica* L.

XVII.12. »Est major præcedente et hirsutissimus. Florentiæ. Badenæ. Austriæ. Accepi quoque Patavio, et ex Istria.» Dieselbe Art.

XVII.13. »Soldanella vel Brassica maritima major Bauh. Meerwinde. Monspelii in littore.» *Convolvulus soldanella* L.

XVII.14. »Soldanella maritima minor Bauh. Brassica marina Matth. Monspelii in littore.» Dieselbe Art.

XVII.15. »Soldanella alpina rotundifolia Bauh. In Gothardo, S. Bernhardo, montibus Austriæ, et Pyrenæis.» *Soldanella alpina* L.

XVII.16. »A præcedente nonnihil evariat. In sylva quadam Styriæ.» Nur ein Blatt ist übrig. Es ist *Soldanella alpina* L. oder *montana* Willd.

XVII.17. »Smilax aspera fructu rubente Bauh. A parente.» *Smilax aspera* L.

XVII.18. »Smilax aspera minus spinosa, fructu nigro Bauh. Stechende Winde. Monspelii sponte.» Dieselbe Art.

XVII.19. »Eadem cum præcedente, quamvis foliis ludat. Monspelii sponte.» *Smilax aspera* L. var. *mauritanica* (Desf.).

XVII.20. »Smilax aspera Peruviana, sive Salsaparilla Bauh. In officinis.» Ein Rhizomstück mit ansitzenden blattlosen Stammstücken, wahrscheinlich von einem *Smilax*.

XVII.21. »China radix Bauh. In Officinis pharmaceuticis.» Nur ein Stück von einer Knolle.

XVII.22. »Bryonia aspera sive alba baccis rubris Bauh. Vitis alba Matth. Zaunrübe. In Bohemia, Gallia Narbonensi, Dania.» Scheint *Bryonia alba* L. zu sein.

XVII.23. »An sit eadem cum præcedente? sed solo squalidiore nata? Monspelii.» Eine Form von *Bryonia dioica* L., deren Blätter in schmale Lappen tief geteilt sind.

XVII.24. »An Bryonia alba baccis nigris Bauh? Florentiæ.» Wahrscheinlich *Bryonia alba* L.

XVII.25. »Bryonia lævis, sive nigra, racemosa Bauh. Vitis nigra Tabern. Basileæ, Monspelii, Genuæ.» *Tamus communis* L., männlich.

XVII.26. »Bryonia lævis, sive nigra, baccifera Bauh. In GalloProvincia.» Dieselbe Art, weiblich.

XVII.27. »Bryonia Mechoucana alba Bauh. In Officinis pharmaceuticis.» Ein Schnitt von einer Knolle.

XVII.28. »Lupulus mas Bauh. Hopffen. In Lusatia, Bohemia, Dania &c.» *Humulus lupulus* L., weiblich.

XVII.29. »Lupulus fæmina Bauh. Femmelhopffen. Passim.» Dieselbe Art, männlich.

XVII.30. »Vitis vinifera Bauh. Weinstock. In Bohemia. Et quidem pro peculiari specie ibi colitur.» *Vitis vinifera* L. (mit einem *Erineum*).

XVII.31. »Alia vitis viniferæ species peculiaris. Monspelii in horto Regio.» Ein Blatt, ohne Zweifel derselben Art.

XVII.32. »Vitis Apifolia Ioh. Bauh. Basileæ accepi a Miano, una cum nomine.» *Vitis vinifera* L. var. *laciniosa* (L.).

XVII.33. »Uvæ passæ minores, vel Passulæ Corinthiacæ Bauh. Corinthen. kleine Rosinen. In horto Nobilis c(ui)usdam, non longe Lipsia.» Zwei Blätter von *Ribes rubrum* L.

XVII.34. »Vitis sylvestris, Labrusca Bauh. Wilde trauben. In Helvetia et Comitatu Tyrolensi sponte.» *Vitis vinifera* L.

XVII.post 34. »Vitis Peruana. Hoc nomine venit ex horto Medico Lugdunensi. Hafniæ etiam alebat in horto suo Clariss. Dn. D. Wormius.» *Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch.

XVII.35. »Clematitis syl. latifolia Bauh. Viorna vulgi Lob. Waldt Rebe. Basileæ, Ingolstadii.» *Clematis vitalba* L.

XVII.36. »Clematis sive Flammula repens Bauh. Brennwurtz. Blatter Zugk. In Bohemia, et Saxonia inferiori sponte. uti et Herbipoli.» Scheint mir *Clematis recta* L. zu sein.

XVII.37. »Clematis maritima repens Bauh. Monspelii sponte.» *Clematis flammula* L. var. *maritima* (L.).

XVII.38. »Flammula recta Bauh. In hortis Lusatiæ.» *Clematis recta* L.

XVII.39. »Clematis alpina Geranifolia Bauh. In alpibus Austriæ superioris.» *Clematis alpina* (L.) Mill. (Studien, p. 99.)

XVII.40. »Clematis cærulea recta Bau. Ungrisch Blauwe Waldtrebe. Lipsiæ, Basileæ &c. in hortis.» *Clematis integrifolia* L.

XVII.41. »Clematis cærulea vel purpurea repens Bauh. Braun Waldtrebe. Lipsiæ et Basileæ in hort. ut et in Fionia.» *Clematis viticella* L.

XVII.42. »Clematis cærulea flore pleno Bauh. Basileæ in hort.» Eine gefüllte Blüte, wahrscheinlich derselben Art.

XVII(42 bis). »An Clematis trifolia flore roseo clavato Bauh? Flos Passionalis &c. Parisiis misit figuram hanc sine nomine (cuius t(ame)n descriptionem se post communicaturum promisit) Clariss. d:nus Henricus Ernstius (?) Ill:mi Comitis (?) Waldemari præceptor.» Nur ein Kupferstich, eine stilisierte *Passiflora* darstellend.

XVII.43. »Clematis daphnoides minor Bauh. Vinca pervinca Advers. Ingrün. Beerwinck. Basileæ sponte.» *Vinca minor* L.

XVII.44. »Clematis daphnoides minor flore candido. Florentiæ in hortis.» Dürfte dieselbe Art sein.

XVII.45. »Clematis daphnoides major Bauh. Florentiæ, Romæ, Monspelii sponte.» *Vinca major* L.

XVII.46. »Clematis daphnoides major flore candido. Monspelii in horto Regio.» *Vinca media* Lk & Hoffm.

XVII.47. »Periclymenum non perfoliatum Germanicum Bauh. Specklilien, Zaunlilien, Geissbladt. In Helvetia, Dania sponte. Caprifolium Dod.» *Lonicera periclymenum* L.

XVII.48. »Periclymenum perfoliatum Bauh. Romae sponte prope arcum triumphalem Vespasiani.» *Lonicera caprifolium* L.

XVII.49. »Periclymenum humile Norvegicum Bauh. Ex Norvegia Rostochium allatum accepi a Friderico Lubino Med. Cand. Chamæpericlymenum Clus.» *Cornus suecica* L.

XVII.(49 bis). »Idem cum præcedente, sed florens. Ex Norwegia attulit mihique co(mmun)icavit Clariss. Dn. D. Sperlingius. Reperi postea copiose in Fionia.» *Cornus suecica* L.

XVII.50. »Apocynum folio subrotundo Bauh. Florentiæ, Parisiis in hort.» *Marsdenia erecta* (L.) R. Br.

XVII.51. »Apocynum folio oblongo Bauh. Periploca altera Dod. Basileæ in horto.» *Periploca graeca* L.

XVII.52. »Asclepias albo flore Bauh. Schwalbenwurtz. In Misnia, Bavaria, Seelandia. Vincetoxicum Matth.» *Cynanchum vincetoxicum* (L.) Pers.

XVII.53. »Videtur eadem cum præcedente, licet non alte excrescat. In GalloProvincia.» Dieselbe Art.

XVII.54. »Asclepias nigro flore Bauh. In hortis Lusatiæ, Misniæ.» *Cynanchum nigrum* (L.) Mnch.

XVII.55. »Polygonatum latifolium vulgare Bauh. Weisswurtz. In Lusatia, Misnia, Helvetia, Dania.» *Polygonatum officinale* All.

XVII.56. »Polygonatum vulgatius Cam. in Ep. Matth. Videtur idem cum præcedente, licet folia angustiora. In Lusatia.» *Polygonatum multiflorum* (L.) All.

XVII.57. »Polygonatum latifolium maximum Bauh. In Lusatia, Misnia.» Dieselbe Art.

XVII.58. »An Polygonatum latifolium, Ellebori albi foliis Bauh? Lutetiæ in horto Robini.» *Polygonatum latifolium* (Jacq.) Desf.

XVII.59. »an Polygonatum latifolium flore majore odoro Bauh. In Misnia, Thuringia.» *Polygonatum officinale* All.

XVII.60. »Polygonatum latifolium minus flore majore Bauh. Badenæ Austriæ in monte.» Dieselbe Art.

XVII.61. »Polygonatum latifolium perfoliatum Brasilianum Bauh. Per pharmacopæum quendam Lutetiæ accepi ex Brasilia.» *Uvularia grandiflora* Sm. (Studien, p. 99.)

XVII.62. »Polygonatum latifolium Brassilianum flore racemoso muscoso. Ex eodem cum præcedente loco.» *Smilacina racemosa* (L.) Desf.

XVII.63. »Polygonatum latifolium ramosum Bauh. Laurus Alexandrina Matth. In Sylva Bohemica, et prope Salinas Austriæ superioris.» *Streptopus amplexifolius* (L.) DC.

XVII.64. »Polygonatum angustifolium non ramosum Bauh. In Misnia et Helvetia.» *Polygonatum verticillatum* (L.) All.

XVII.65. »Polygonatum angustifolium ramosum Bauh. In Misnia.» Dieselbe Art.

XVII.66. »Lilium convallium album Bauh. Zaucken. Meijenblümlin. In Lusatia, Bohemia, Dania.» *Convallaria majalis* L.

XVII.67. »Lilium convallium alpinum Bauh. Habet flores sine ordine positos. Basileæ in horto Heinzmanni.» Dieselbe Art.

XVII.68. »Lilium convallium flore rubente Bauh. Basileæ in horto Heinzmanni.» Dieselbe Art.

XVII.69. »Lilium convallium minus Bauh. Monophyllon recentior. Lob. Einbladt. In Lusatia, Misnia, Bohemia, Helvetia, Dania &c.» *Majanthemum bifolium* (L.) F. W. Schm.

XVII.70. »Laurus Alexandrina, fructu folio insidente Bauh. Zäpfflinkrautt. Northusii in Thuringia in horto. Hafniæ in horto Regio. Uvularia Tabern. Hippoglossum Matth.» *Ruscus hypoglossum* L.

XVII.71. »Hedera arborea Bauh. Epheuw. In Gallia, Italia, Dania sponte.» *Hedera helix* L., fruktifizierender Spross.

XVII.72. »Hedera major sterilis Bauh. Hedera helix Tabern. In Lusatia, Misnia, Bohemia, Dania.» D:o, vegetativer Spross.

XVII.73. »Hedera terrestris vulgaris Bauh. Gunderman. In Germania, Italia, Gallia, Dania.» *Glechoma hederacea* L.

XVII.74. »Hedera terrestris montana Bauh. In Misnia.» Grossblättriger vegetativer Spross derselben Art (mit *Puccinia glechomatis* DC).

XVII.75. »Hedera saxatilis magno flore Bauh. Asarina sterilis Lob. In GalloProvincia.» *Antirrhinum asarina* L.

XVII.76. »Hederacea quædam planta ex Brassilia. Apud Toupinambaultios legit pharmacopæus Parisiensis.» Zusatz (von Linné?): »Thiarella». Ist *Tiarella cordifolia* L.

XVII.77. »Cum præcedente quandam similitudinem gerit. Ex eodem loco.» *Mitella diphylla* L.

XVII.78. »Cymbalaria Bauh. &c. Florentiæ sponte.» *Linaria cymbalaria* (L.) Mill.

XVII.79. »Nasturtium Indicum maius Bauh. Indianische Kresse. In hortis Misniæ, Helvetiæ, Italiæ, Galliæ, Daniæ.» *Tropaeolum minus* L.

XVII.80. »Balsamina rotundifolia repens sive mas Bauh. Balsamäpffel. Lipsiæ et Basileæ in hort. Momordica.» *Momordica balsamina* L.

XVII.81. »Balsamina fæmina Bauh. Balsamkrautt weiblin. Northusii et Basileæ in hortis. Habui etiam Soræ.» *Impatiens balsamina* L.

XVII.82. »Balsamina lutea, sive Noli me tangere Bauh. Springsamenkrautt. Judenhüttlin. In Lusatia, Misnia, Helvetia, Dania. Persicaria siliquosa Lob.» *Impatiens noli tangere* L.

XVII.83. »Aristolochia rotunda, flore ex purpura nigro Bauh. Runde Osterluceij. Basileæ in hort.» *Aristolochia rotunda* L.

XVII.84. »Aristolochia rotunda, flore ex albo purpurascente Bauh. Ad speluncam D. Magdalenæ in GalloProvincia.» *Aristolochia pallida* Willd.

XVII.85. »Aristolochia longa vera Bauh. lange Osterluceij. Ad oppidum Bellilus in Gallia Narbonensi.» *Aristolochia clematitis* L.

XVII.86. »Aristolochia Clematitis recta Bauh. Mediolani sponte.» Dieselbe Art.

XVII.87. »Aristolochia Clematitis serpens Bauh. Basileæ dedit Bauh.» *Aristolochia rotunda* L.

XVII.88. »Aristolochia Pistolochia dicta Bauh. In Gallia Narbonensi.» *Aristolochia pistolochia* L.

XVII.89. »Cyclamen orbiculato folio, inferne purpurascente Bauh. Schweinbrodt. Ad montem Draunstein Austriæ sup(er)ioris. In montibus Tyrolensibus. Florentiæ.» *Cyclamen europaeum* L.

XVII.90. »Cyclamen folio anguloso Bauh. Romæ in colle sylvoso, La vigna della Madonna dicto. in Februario.» *Cyclamen neapolitanum* Ten.

XVII.post 90. »Cyclamen angustifolium folio Ophioglossi. Hoc nomine accepi Lutetiæ ex horto Robini.» Nur ein Blatt.

XVII.91. »Gramen Parnassi albo simplici flore Bauh. Weiss leberblümlein. In Lusatia, Misnia, Helvetia, Dania.» *Parnassia palustris* L.

XVII.92. »Saxifraga rotundifolia alba Bauh. Weisse Steinbrech. In Lusatia, Bohemia, Helvetia, Dania.» *Saxifraga granulata* L.

XVII.93 fehlt.

XVII.94. »Chelidonia rotundifolia minor Bauh. Schorbockkrautt. Feygwartzkrautt. In Germania, Dania &c.» *Ficaria verna* Huds.

XVII.95. »Nummularia najor lutea Bauh. Egelkrautt. Pfennigkrautt. In Lusatia, Helvetia, Dania &c.» *Lysimachia nummularia* L.

XVII.96. »Nummularia minor purpurascente flore Bauh. Figura exstat in Prodromo. Ad Castellum novum dictum prope Monspelium, unde Bauhino attuli.» *Anagallis tenella* L.

XVII.97. »Cucumis sativus vulgaris Bauh. Kurken. In hortis passim.» *Cucumis sativus* L.

XVII.post 97. »Cucumis dulcis Americanus. Hoc nomine venit ex horto Amstelodamensi.» *Passiflora incarnata* L.

XVII.98. »Melo vulgaris Bauh. Melonen. In hortis passim.» *Cucumis melo* L.

XVII.99. »Pepo minor clypeatus Bauh. Monspelii in hortis.» *Citrullus vulgaris* Schrad.

XVII.100. »Melopepo clypeiformis Bauh. Monspelii in hort.» Zwei Stücke von der Fruchtwand einer Kürbis, wahrscheinlich *Cucurbita pepo* L. var. *melopepo* (L.).

XVII.101. »Anguria Citrullus dicta Bauh. Citrullen. Florentiæ in hortis.» In der Blattform *Citrullus colocynthis* (L.) Schrad. sehr ähnlich.

XVII.102. »Cucurbita major sessilis flore albo Bauh. Kürbiss. In hortis Bohemiæ.» *Lagenaria vulgaris* Ser.

XVII.103. »Cucurbita major rotunda, flore luteo, folio aspero Bauh. In hortis passim.» *Cucurbita pepo* L.

XVII.104. »Cucurbita lagenaria flore albo, folio molli Bauh. Lipsiæ in hort.» Wahrscheinlich *Lagenaria vulgaris* Ser.

XVII.105. »Cucurbita oblonga flore albo, folio molli Bauh. Florentiæ in hortis.» *Lagenaria vulgaris* Ser.

XVII.106. »Cucurbita capitata Bauh. Lipsiæ et Annæbergæ in hortis.» *Cucurbita pepo* L.

XVII.107. »Cucumis sylvestris, asininus dictus Bauh. Eselskürbiss. Springkürbiss. Florentiæ et Monspelii sponte.» *Ecballium elaterium* (L.) A. Rich.

VOLUMEN XVIII.

Hortus siccus, seu stirpivm, studio et labore D. Ioachimi Burseri Camentio-Lusati, in Regia Nobilium Academia Sorana Medici et professoris publici per diversas regiones et loca collectarum et secundum seriem Pinacis Bauhiniani digestarum Volumen XVIII, continens Sectionem 5. et 6. libri octavi Pinacis illius.

XVIII(1)1. »Malva syl. folio rotundo Bauh. Malva sylvestris repens pumila Lob. Gensepappel. Passim.» *Malva neglecta* Wallr.

XVIII(1)2. »Malva syl. folio sinuato Bauh. Malva vulgaris procerior Lob. Rosspappel. Passim.» *Malva silvestris* L.

XVIII(1)3. »Malva Americana Bauh. Hafniæ in horto D. Wormii.» *Lavatera trimestris* L.

XVIII(1)(3 bis). »Videtur eadem cum antecedente. Ex horto Lugdunensi.» Blüte einer *Lavatera* und 2 Blätter (ob derselben Pflanze?).

XVIII(1)4. »Malva peregrina folio rotundo crasso etc. Hafniæ in horto D. Olai Wormii.» Nur das Blatt einer Malvacee.

XVIII(1) (4 bis). »Videtur eadem cum præcedente. Ex horto Leydensi.» *Lavatera trimestris* L.

XVIII(1)5. »Malva hederaceo folio Bauh. Nisi potius sit Malva arborea. Ingolstadii.» *Lavatera arborea* L.

XVIII(1)6. »Malva foliis crispis Bauh. Krause pappeln. In hortis passim.» *Malva crispa* L.

XVIII(1)(6 bis). »An Malva trimestris pumila Clus. Malvæ Baeticæ nomine accepi ex horto Leydensi.» Scheint mir *Lavatera trimestris* zu sein.

XVIII(1)7. »Malva rosea folio subrotundo Bauh. Einfache rothe Wintter Rose. In hortis passim.» *Althaea rosea* (L.) Cav.

XVIII(1)8. »Malva rosea simplex incarnata. Basileæ in hort.» D:o.

XVIII(1)9. »Malva rosea simplex alba. In hortis Misniæ, Daniæ.» D:o.

XVIII(1)10: »Malva rosea folio subrotundo, flore pleno Bauh. Doppelte Wintterrose. In hortis.» Zwei gefüllte Blüten derselben Art.

XVIII(1)11. »Malva rosea multiplex alba. In hortis.» D:o.

XVIII(1)12. »Malva rosea multiplex purpurea. In hortis Misniæ.» D:o.

XVIII(1)13. »Malva rosea folio ficus Bauh. Basileæ in horto.» *Althaea rosea* (L.) Cav. var. *ficifolia* (L.)

XVIII(1)14. »Malva arborea, Veneta dicta, parvo flore Bauh. Hafniæ in horto D. Wormii. quæ postmodum et(iam) in meo horto crevit.» Ein Blatt, wahrscheinlich von *Lavatera arborea* L.

XVIII(1)15. »Althæa Dioscoridis et Plinii Bauh. Eibisch. In hortis passim.» *Althaea officinalis* L.

XVIII(1)16. »Althæa flore majore Bauh. Althæa Thuringiaca Camer. In Thuringia.» *Lavatera thuringiaca* L.

XVIII(1)17. »Althæa altera Clus. pann. diversa a p(ræ)cedente Thuringiaca. In Moravia.» Blüte und Blatt einer Malvacee.

XVIII(1)18. »Althæa laciniato folio Bauh. In Calenberg Austriæ, ubi collecto semine postea in horto plantavi.» *Lavatera thuringiaca* L.

XVIII(1)19. »Althæa frutescens folio rotundiore incano Bauh. Althæa arborescens Clusii Tab. Non longe Monspelio.» *Lavatera maritima* Gouan.

XVIII(1)20. »Althæa frutescens folio acuto, parvo flore Bauh. Althæa arborescens Tabern. Olbyæ in GalloProvincia, et in vicinis Insulis stoechadis.» *Lavatera olbia* L.

XVIII(1)21. »Althæa palustris Bauh. Basileæ in horto Bauh.» *Hibiscus moscheutos* L. (Studien, p. 100.)

XVIII(1)22. »Althæa Theophrasti flore luteo Bauh. Abutilon Dod. Basileæ in horto Bauhini. Crevit et(iam) in meo horto A(nn)o 1635.» *Abutilon Avicennae* Gaertn.

XVIII(1)23. »Alcea vulgaris major Bauh. Sigmarswurtz. In Lusatia, Bohemia, Seelandia.» *Malva alcea* L. (Studien, p. 100.)

XVIII(1)24. »Alcea vulgaris minor Bauh. In Lusatia.» D:o. (Studien, p. 100.)

XVIII(1)25. »Alcea tenuifolia Cam. in horto. an Alcea folio rotundo laciniato Bauh? Caulis valde pilosus est. Prope Ilfeldam Thuringiæ.» *Malva moschata* L. (Studien, p. 100.)

XVIII(1)26. »Alcea cannabina Bauh. Alcea fruticosior Lob. Lipsiæ in horto.» *Althaea cannabina* L.

XVIII(1)27. »Eadem cum præcedente, prout sponte provenit. Monspelii.» D:o.

XVIII(1)28. »Alcea arborescens Syriaca Bauh. Basileæ. Monspelii, Parisiis, Florentiæ in hortis.» *Hibiscus syriacus* L.

XVIII(1)29. »Alcea vesicaria Bauh. Wetter röslin. Hypecoum Matth. In hortis Germaniæ, Daniæ.» *Hibiscus trionum* L.

XVIII(1)30. »Alcea hirsuta Bauh. »Florentiæ, Parisiis. In Austria infetiori, unde semen in hortum transtuli.» *Althaea hirsuta* L.

XVIII(1)31. »Alcea Indica magno flore Bauh. Sabdariffa Lob. Alcea Americana Clus. Basileæ dedit Mianus.» Blatt und Blüte, wie es scheint von *Hibiscus cannabinus* L.

XVIII(1)32. »Alcea Indica parvo flore Bauh. Bamia Alpini. Basileæ accepi a Bauhino.» Nur ein Blatt.

XVIII(1)33. »Alcea Aegyptiaca villosa Bauh. Belmusius Aegyptorum Belli. Communicavit Bauhinus, sibi ab Honorio Bello missam.» Ein Blatt, vielleicht von *Hibiscus abelmoschus* L.

XVIII(1)34. »Corcorus Plinii Bauh. Corcorus sive Melochia Cam. Basileæ in hort.» *Corchorus olitorius* L.

XVIII(1)35. »Geranium batrachiodes folio Aconiti Bauh. Storchenschnabel. In Bohemia, Helvetia, Seelandia.» *Geranium palustre* L.

XVIII(1)36. »Geranium batrachiodes hirsutum flore atrorubente Bauh. Geranium pullo flore Clus. In alpibus Austriæ, Pyrenæis &c.» *Geranium phæum* L. (Studien. p. 100.)

XVIII(1)37. »Geranium batrachiodes odoratum Bauh. Geranium batrachioides longius radicatum Lob. Lipsiæ in horto Medico, Lutetiæ in horto pulverum. Etiam in hortis Daniæ.» *Geranium macrorrhizum* L.

XVIII(1)38. »Geranium sanguineum maximo flore Bauh. Geranium hæmatodes Clus. In Lusatia, Helvetia, Seelandia.» *Geranium sanguineum* L.

XVIII(1)39. »Geranium batrachiodes Gratia Dei Germanorum Lob. Bauh. Gottesgnad. Lipsiæ et Basileæ in hortis. Geranium sanguinarium Tab.» *Geranium pratense* L.

XVIII(1)40. »Geranium batrachiodes flore variegato Bauh. Basileæ in hort.» D:o f. fol. varieg.

XVIII(1)41. »Geranium batrachiodes, Collum gruis Germanorum Bauh. Kranichhals. In Lusatia, Misnia &c.» *Geranium dissectum* L.

XVIII(1)42. »Geranium batrachiodes flore fere carneo, sed repando, qualiter Tabern. pingit suum maculatum et Lob. fuscum. In Gemme, altissimo Vallesiæ monte.» *Geranium phaeum* L.

XVIII(1)43. »Geranium tuberosum maius Bauh. Monspelii in horto Regio.» *Geranium tuberosum* L.

XVIII(1)44. »An Geranium radice grumosa Bauh. Florentiæ.» *Geranium striatum* L.

XVIII(1)45. »Geranium batrachiodes cæruleum a præcedentibus diversum. In sylvis Bohemiæ, in alpibus Austriæ, Pyrenæis.» *Geranium silvaticum* L.

XVIII(1)46. »Geranium batrachiodes parvo flore. In sylvis Helvetiæ.» Scheint eine Form von *Geranium palustre* L. zu sein (Studien, p. 100), die Blütenstile sind aber drüsig behaart, wie bei *G. silvaticum*.

XVIII(1)47. »Geranium nodosum Bauh. In Pyrenæis et horto Medico Parisino.» *Geranium nodosum* L.

XVIII(1)48. »Geranium lucidum saxatile Bauh. Ad radicem Broccenbergi, et in Pyrenæis.» *Geranium lucidum* L.

XVIII(1)49. »Geranium folio malvæ rotundo Bauh. Geranium columbinum Tab. Taubenfuss. Passim.» *Geranium pusillum* L.

XVIII(1)50. »Geranium columbinum mollius, magis incanum, atrovirens, flore majore &c. Meminit illius Bauhinus. In Horto Dei dicto et Pyrenæis.» *Geranium pyrenaicum* L. (Studien, p. 101.)

XVIII(1)51. »Geranium præcedenti nonnihil simile, nondum forte descriptum. Ad Thermas Carolinas in Bohemia.» *Geranium divaricatum* Ehrh.

XVIII(1)52. »Geranium folio Althææ Bauh. Geranium malacoides Lob. Monspelii et Florentiæ sponte.» *Erodium malacoides* (L.) Willd.

XVIII(1)53. »Geranium malacoides minus Bauh. Ex Normandia attulit Weckerlinus, unde Bauhino co(mmun)icavi.» *Erodium maritimum* (L.) Sm.

XVIII(1)54. »Geranium Cicutæ folio, acu longissima Bauh. In ipsa urbe Florentina, et in Valle Augusta dicta.» *Erodium ciconium* (L.) Willd.

XVIII(1)55. »Convenit cum præcedente, licet folia sint latiora, et minus crispa, caulesque non ita tortuosi &c. In GalloProvincia.» D:o.

XVIII(1)56. »An sint folia prima seu primo nascentia præcedentis? Monspelii.» D:o, junges Individ.

XVIII(1)57. »Folia sunt crassiora, et minus laciniata quam in præcedenti. Prope Olbiam Galliæ Narbonensis.» *Erodium botrys* (Cav.) Bert.

XVIII(1)58. »Geranium Cicutæ folio moschatum et inodorum Bauh. Moschriechend Schnabelkrautt. In hortis Germaniæ, Daniæ. Myrrhida Plinii Lob.» *Erodium moschatum* (L.) L'Hér.

XVIII(1)59. »Geranium σκανδικόφυλλον Thalii. Est o(mn)i(n)o diversum a præcedente. In Lusatia, Misnia, Dania.» *Erodium cicutarium* (L.) L'Hér.

XVIII(1)60. »Sitne idem cum præcedente? Monspelii.» D:o.

XVIII(1)61. »Geranium Cicutæ folio minus, et supinum Bauh. Geranium minus arvense Tab. Florentiæ, Monspelii, Basileæ &c.» *Erodium romanum* (Burm.) Ait.

XVIII(1)62. »Geranium Robertianum primum Bauh. St. Rupertskrautt. Gichtkrautt. In Germania, Dania &c.» *Geranium robertianum* L.

XVIII(1)63. »Geranium latifolium longissima acu Bauh. Geranium Creticum Tab. Lipsiæ et Basileæ et Soræ in hort.» *Erodium gruinum* (L.) L'Hér.

XVIII(1)64. »Sanicula Officinarum Bauh. Sanickel. Diapensia Matth. In Lusatia Bohemia, Helvetia, Dania.» *Sanicula europaea* L.

XVIII(1)65. »Alchimilla vulgaris Bauh. Stellaria sive Pes leonis Matth. In Germania, Dania.» *Alchemilla pratensis* F. W. Schm.

XVIII(1)66. »Alchemilla alpina quinquefolia Bauh. Prope Gothardum Rhætorum, unde Bauhino attuli.» *Alchemilla pentaphyllea* L. (Studien, p. 101.)

XVIII(1)67. »Cannabis sativa Bauh. Hanff. Colitur passim.» *Cannabis sativa* L., weiblich.

XVIII(1)(67 bis). »Cannabis Virginiana Bauh. Co(mmun)icavit una cum nomine doct. Iacobus Schwabius Med. cand. in horto Leidensi lectam.» Eine Compo site, kaum bestimmbar.

XVIII(1)68. »Cannabis erratica Bauh. Femmelhanff. Nascitur cum sativa.» *Cannabis sativa* L., männlich.

XVIII(1)69. »Eupatorium cannabinum Bauh. Künigundekrautt männlin. In Lusatia, Helvetia, Seelandia. Herba S. Kunigundis Tab. Cannabina aquatica mas Lob.» *Eupatorium cannabinum* L.

XVIII(1)70. »Cannabina aquatica, folio tripartite diviso Bauh. Künigundekrautt weiblin. In Lusatia, Helvetia, Dania.» *Bidens tripartita* L.

XVIII(1)71. »Cannabina aquatica folio non diviso Bauh. Eupatorium cannabinum chrysanthemum Tab. In Lusatia, Bohemia, Helvetia, Dania.» *Bidens cernua* L.

XVIII(1)72. »Cannabina pumila maritima. An soli ratione solum differat a vulgari? Callinborgi Seelandiæ.» *Bidens tripartita* L. (Studien, p. 101.)

XVIII(1)73. »Eupatorium veterum, sive Agrimonia Bauh. Odermenning. In Germania, Dania &c.» *Agrimonia eupatoria* L.

XVIII(1)74). »Agrimoniæ similis Bauh. Ad oppidum Merues prope Hortum Dei in Gallia Narbonensi.» *Potentilla rupestris* L.

XVIII(1)post 74. »Videtur idem cum præcedente. In horto Dei dicto.» Eine sehr kleine Form derselben Art.

XVIII(1)75. »Potentilla Bauh. Anserina Tab. Genserich. Passim.» *Potentilla anserina* L.

XVIII(1)76. »Caryophyllata vulgaris Bauh. Benedictenwurtz. Neglinwurtz. Passim.» *Geum urbanum* L.

XVIII(1)77. »An Caryophyllata vulgaris majore flore Bauh? In montibus Misniæ.» Dieselbe Art.

XVIII(1)78. »Caryophyllata aquatica nutante flore Bauh. In Misnia, Bohemia, Helvetia, Dania. Accepi quoque ex Brasilia.» *Geum rivale* L.

XVIII(1)79. »Caryophyllata alpina lutea Bauh. In montibus GalloProvinciæ, Austriæ. *Geum montanum* L.

XVIII(1)80. »Dentaria heptaphyllos Bauh. Licet hoc exemplar non nisi quinquefolium sit. Zahnkrautt. In Horto Dei GalloProvinciæ.» *Dentaria digitata* Lam.

XVIII(1)81. »Dentaria pentaphyllos Bauh. In Muteto Basileensium.» *Dentaria pinnata* Lam.

XVIII(1)82. »Dentaria heptaphyllos baccifera Bauh. In montibus Lusatiæ, Misniæ &c. In Insula Moena. Et Soræ.» *Dentaria bulbifera* L.

XVIII(1)83. »Dentaria triphyllos Bauh. Ad salinas Austriæ superioris.» *Dentaria enneaphyllos* L.

XVIII(1)84. »Epimedium Bauh. &c. Florentiæ, Lipsiæ, Basileæ, Hafniæ in hortis.» *Epimedium alpinum* L.

XVIII(1)85. »Pæonia folio nigricante splendido, quæ mas Bauh. Lutetiæ in horto pulverum.» Blatt einer *Paeonia*.

XVIII(1)86. »Videtur eadem cum præcedente. In hortis Lusatiæ.» *Paeonia officinalis* L.

XVIII(1)87. »Pæonia communis vel fæmina Bauh. Peonien. Pfingst Rosen. In hortis passim.» Dürfte *Paeonia peregrina* Mill. sein.

XVIII(1)88. »An Pæonia Aquilinæ foliis Bauh? Plantata fuerat Basileæ pro Pæonia luteo flore; sed quia nondum floruerat, nihil certi erat.» Zwei Blätter, die meines Erachtens keine Paeonia-Blätter sind.

XVIII(1)89. »Pæonia fæmina flore pleno rubro majore Bauh. Doppelte Peonien. In hortis passim.» *Paeonia officinalis* L.

XVIII(1)90. »Pæonia flore exalbido pleno Bauh. Pæonia flore incarnato Hispanica no(m)inabatur. Basileæ in hort.» D:o.

XVIII(1)91. »Leontopetalum Bauh. &c. Florentiæ in horto Magni Ducis.» *Leontice leontopetalum* L.

XVIII(1)92. »Staphis agria Bauh. Leusekrautt. In GalloProvincia sponte.» Daneben eine Keimpflanze mit dieser Angabe von Bursers Hand: »sic primum erumpit ex semine.» *Delphinium staphisagria* L.

XVIII(1)93. »Quinquefolium album maius caulescens Bauh. In Austria, Comitatu Tyrolensi, Horto Dei, Rhætia, et Helvetia im moeniis oppidi Wallstadt, unde Bauhino attuli.» *Potentilla caulescens* L.

XVIII(1)94. »Quinquefolium album maius alterum Bauh. Quinquefolium Tragi Trago. Weiss fünpfingerkrautt. Wittebergæ, et in Bohemia.» *Potentilla alba* L. (Studien, p. 101.)

XVIII(1)95. »Quinquefolium album radice tuberosa Filipendulæ. Alias multum c(on)venit cum præcedente. In montibus sylvosis Bohemiæ.» D:o (d:o).

XVIII(1)96. »Quinquefolium album minus alterum Bauh. In alpibus Styriæ.» *Potentilla Clusiana* Jacq.

XVIII(1)97. »Qionquefolium maius repens Bauh. krichend fünpfingerkrautt. In Lusatia, Dania.» *Potentilla reptans* L.

XVIII(1)98. »Quinquefolium minus, repens, aureum Bauh. In alpibus Austriæ.» *Potentilla aurea* L.

XVIII(1)99. »Quinquefolium minus repens luteum Bauh. In Misnia, Bohemia, Helvetia.» *Potentilla verna* L.

XVIII(1)100. »Quinquefolium minus repens lanuginosum luteum Bauh. In Pyrenæis.» Dürfte eine Form von *Potentilla thuringiaca* Bernh. sein.

XVIII(2)1. »Quinquefolium minus repens alpinum aureum Bauh. In montibus Rhæticis et Pyrenæis.» *Potentilla grandiflora* L.

XVIII(2)2. »Affinitatem gerit cum planta, quam Quinquefolio similem Enneaphyllon appellat Bauhinus. In Ungaria prope Rabam. in littore Danubii. . . in palude quadam Bohemiæ. An sit Quinquefolium fragiferum repens Tab?» *Potentilla supina* L.

XVIII(2)3. »Quinquefolium folio argenteo Bauh. Quinquefolium petræum maius Tab. In Lusatia, Misnia, Helvetia, Dania.» *Potentilla argentea* L.

XVIII(2)4. »Quinquefolium rectum luteum Bauh. In Lusatia inferiori.» *Potentilla recta* L.

XVIII(2)5. »Videtur idem cum præcedente. Lutetiæ in horto.» D:o.

XVIII(2)6. »A præcedente differt, quod folia candidiora rotundiora, obtusius crenata longioribus pediculis cauli inhæreant &c. In Calenberg Austriæ inferioris, non longe Vienna.» *Potentilla pilosa* Willd.

XVIII(2)8. »Quinquefolio fragifero affinis Bauh. Quinquefolium fragiferum repens Tab. Pentaphyllum supinum Tormentillæ facie Lob. In Lusatia.» *Potentilla supina* L.

XVIII(2)7. »Quinquefolium fragiferum Bauh. Quinquefolium supinum Fragariæ facie Ioh. Franco. In Lusatia.» Vielleicht *Potentilla thuringiaca* Bernh.

XVIII(2)9. »Quinquefolium palustre rubrum Bauh. In Lusatia, Helvetia, Dania.» *Comarum palustre* L.

XVIII(2)10. »Tormentilla sylvestris Bauh. Tormentillwurtz. In Lusatia, Misnia, Helvetia, Dania.» *Potentilla erecta* (L.) Hampe.

XVIII(2)11. »Tormentilla alpina folio sericeo Bauh. Quinquefolium alpinum Tab. Heptaphyllon Clus. In montibus Helveticis, Sevenis, et Austriacis.» *Alchemilla alpina* L.

XVIII(2)12. »Fragaria vulgaris Bauh. Erdtbeer. Passim.» *Fragaria moschata* Duch.

XVIII(2)post 12. »Fragaria fructu nigro. Ex horto Lugdunensi.» Gartenform von *Fragaria vesca* oder einer Bastardform derselben.

XVIII(2)13. »Fragaria foliis hispidis Bauh. Non procul Argentina.» *Potentilla sterilis* (L.) Gcke.

XVIII(2)14. »Trifolium bitumen redolens Bauh. Trifolium Asphaltæum Lob. Fartzklee. Monspelii sponte.» *Psoralea bituminosa* L.

XVIII(2)15. »Ide cum præcedente. Ad portum Veneris dictum non longe Genua Italiæ.» D:o.

XVIII(2)16. »Trifolium palustre Bauh. Biberklee. lungenklee. In Lusatia, Misnia, Helvetia, Bohemia, Dania.» *Menyanthes trifoliata* L.

XVIII(2)17. »Trifolium Americanum Bauh. Florentiæ in hortis.» *Psoralea dentata* DC.

XVIII(2)18. »Trifolium pratense purpureum Bauh. brauner Wisenklee. Passim.» *Trifolium pratense* L.

XVIII(2)19. »Idem cum præcedente, sed floribus carneis. In Misnia.» D:o.

XVIII(2)20. »Trifolium pratense album Bauh. Weisser Wisenklee. Passim.» *Trifolium repens* L. und *T. hybridum* L.

XVIII(2)21. »Trifolium pratense luteum, capitulo breviore Bauh. Trifolium arvense Tab. Kleiner geeler Wisenklee. In Lusatia, Misnia, Helvetia, Dania.» *Medicago lupulina* L.

XVIII(2)22. »Trifolium pratense luteum, capitulo Lupuli, vel agrarium Bauh. geel Wisenklee. Vnser frauwen Hopfe. In Lusatia, Bohemia, Helvetia, Dania.» *Trifolium agrarium* L.

XVIII(2)23. »Trifolium pratense minus flosculis purpureis Bauh. Lotus pratensis purpurea Lugdun. Florentiæ, Bononiæ.» *Trifolium resupinatum* L.

XVIII(2)24. »Trifolium montanum purpureum maius Bauh. Brauner Spitziger klee. In Misnia, Helvetia &c.» *Trifolium rubens* L.

XVIII(2)25. »Trifolium montanum purpureum folio acuto crenato Bauh. Vix differt a p(ræ)cedente. In Bohemia, Helvetia, Dania.» *Trifolium alpestre* L.

XVIII(2)26. »Trifolium montanum purpurascens folio obtuso crenato Bauh. In Bohemia. Dania.» *Trifolium medium* Huds.

XVIII(2)27. »Trifolium montanum album Bauh. Weisser Spitziger Klee. In Bavaria, Bohemia.» *Trifolium montanum* L.

XVIII(2)post 27. »Habet folia obtusiora quam præcedens. Locus natalis excidit.» D:o.

XVIII(2)28. »Trifolium montanum lupulinum Bauh. In Bohemia.» *Trifolium spadiceum* L.

XVIII(2)29. »Trifolium alpinum flore magno, radice dulci Bauh. In Pyrenæis, Horto Dei, et aliis alpibus.» *Trifolium alpinum* L.

XVIII(2)30. »Trifolium spica subrotunda rubra Bauh. Lagopus maximus Lob. Clus. Florentiæ.» *Trifolium incarnatum* L.

XVIII(2)31. »Idem cum præcedente. In hortis Misniæ &c.» D:o.

XVIII(2)post 31. »Trifolium spica oblonga rubra Bauh. Accepi Rostochio.» *Trifolium rubens* L.

XVIII(2)32. »Trifolium montanum spica longissima rubente Bauh. Cytisus Tragi. In Vallesia, Bohemia, Helvetia.» *Trifolium rubens* L.

XVIII(2)33. »Trifolium montanum angustissimum spicatum Bauh. Lagopus altera angustifolia Advers. Monspelii.» *Trifolium angustifolium* L.

XVIII(2)34. »Videtur idem cum præcedente, nisi quod ob soli fertilitatem altius excreverit. Florentiæ.» D:o.

XVIII(2)35. »Trifolium arvense humile spicatum sive Lagopus Bauh. Hasenfuss Katzenklee Katzenpfötlin. Passim.» *Trifolium arvense* L.

XVIII(2)36. »Trifolium stellatum Bauh. Monspelii, Florentiæ.» *Trifolium stellatum* L. (Studien, p. 101.)

XVIII(2)post 36. »Trifolio præcedenti simile, sed floribus, et lignosa perennique radice differens. Florentiæ. *Trifolium subterraneum* L. (Studien, p. 101.)

XVIII(2)ante 37. »Subtilius est præcedente, alioqui vix differens. Ad Perault prope Monspelium.» D:o.

XVIII(2)37. »Trifolium pratense folliculatum Bauh. Trifol. pratense Salmanticum Clus. Hisp. Dedit Bauh. Basileæ.» *Trifolium resupinatum* L.

XVIII(2)38. »Trifolium globosum, sive capitulo Lagopi rotundiore Bauh. Dedit Bauhinus.» *Trifolium lappaceum* L.

XVIII(2)39. »Trifolium globosum repens Bauh. Bormii GalloProvinciæ.» *Trifolium Cherleri* L.

XVIII(2)40. »Trifolium capitulo spumoso lævi Bauh. Monspelii, et in Bohemia: nec non in Fionia.» *Trifolium fragiferum* L.

XVIII(2)41. »Trifolium album angustifolium, floribus velut in capitulum congestis Bauh. Dorycnium Hispanicum Clus. Tab. Monspelii, Florentiæ. In Austria inferiori.» *Dorycnium suffruticosum* Vill.

XVIII(2)post 41. »Dorycnium Hispanicum latiore folio. Basileæ dedit Reuchenius, Patavio veniens.» *Dorycnium herbaceum* Vill. (Studien, p. 102.)

XVIII(2)42. »Trifolium capitulo oblongo aspero Bauh. Dedit Bauhinus, Monspelii lectum.» *Trifolium scabrum* L.

XVIII(2)43. »Trifolium cochleatum vel scutellatum, fructu latiore, folio minuto obtuso Bauh. In GalloProvincia ad oppidum Curios(?), et Florentiæ. Schneckenklee.» *Medicago orbicularis* (L.) All.

XVIII(2)44. »Trifolium cochleatum fructu latiore Bauh. Medicæ tertiæ in semine varietas Advers. Vel certe quod in Bauhini textu proxime seq(ui)tur. Co(mmun)icavit Bauh. ex Creta allatum.» Dürfte *Medicago scutellata* (L.) All. sein.

XVIII(2)45. »Trifolium cochleatum turbinatum, sive fructu compresso oblongo Bauh. Medicæ 2dæ in semine varietas Advers. Lipsiæ in horto.» *Medicago tuberculata* Willd.

XVIII(2)46. »Trifolium cochleatum turbinatum fructu minore ex Creta, c(ui)us meminit Bauhinus. Dedit Bauh. ex Creta missum.» Der Leimabdruck einer weggefallenen Frucht deutet auf *Medicago tuberculata* Willd.

XVIII(2)47. »Trifolium cochleatum polycarpon Bauh. Parisiis.» *Medicago polycarpa* Willd. (*hispida* Gaertn.).

XVIII(2)48. »Trifolium cochleatum maritimum tomentosum Bauh. Medica marina Clus. Tab. Monspelii in littore.» *Medicago marina* L.

XVIII(2)49. »Trifolium cochleatum folio cordato maculato Bauh. Medica arabica Camer. hertzklee. Lipsiæ in hort.» *Medicago arabica* (L.) All. (*maculata* Willd.).

XVIII(2)50. »Trifolium fructu compresso, spinis horrido Bauh. In Italia.» Scheint mir *Medicago tribuloides* Desr. zu sein.

XVIII(2)51. »Trifolium cochleatum echinatum minus Bauh. Florentiæ.» Scheint mir *Medicago lappacea* Desr. zu sein.

XVIII(2)52. »Trifolium echinatum arvense Bauh. Lutetiæ.» *Medicago minima* L.

XVIII(2)53. »Trifolium echinatum arvense fructu minus copioso Bauh. (getilgt) an VII. Bauh? In Lusatia.» *Medicago minima* L. (Studien, p. 102.)

XVIII(2)54. »Trifolium siliqua cornuta, sive Medica Bauh. Foenum Burgundiacum Lob. Burgundisch heuw. Monspelii.» *Medicago sativa* L. (oder vielleicht *sativa* × *falcata*).

XVIII(2)56. »Præcedenti affinis, aut subsequenti. In GalloProvincia.» Dürfte *Medicago sativa* × *falcata* sein.

XVIII(2)55. »Trifolium sylvestre luteum siliqua cornuta, vel Medica rutescens Bauh. Geeler feldtklee. In Misnia.» *Medicago falcata* L.

XVIII(2)post 55. »Medica frutescens perpusilla. Accepi ex Galliis.» Eine sehr kleine, mehrjährige, schmalblättrige, armblütige *Medicago*, die ich nicht bestimmen konnte.

XVIII(2)57. »Trifolium siliqua falcata Bauh. Lipsiæ in hort.» *Hymenocarpus circinatus* (L.) Savi.

XVIII(2)58. »Trifolium acetosum vulgare Bauh. Oxys Tabern. Sauwer klee. Buchampffer. In Lusatia, Helvetia, Dania.» *Oxalis acetosella* L.

XVIII(2)59 »Trifolium acetosum flore cæruleo. Basileæ.» D:o.

XVIII(2)60. »Trifolium acetosum corniculatum Bauh. Oxys flore luteo Clus. Florentiæ sponte.» *Oxalis corniculata* L.

XVIII(2)61. »Trifolium hepaticum flore simplici Bauh. gülden leberkrautt. In Misnia, Bohemia, Helvetia, Seelandia.» *Anemone hepatica* L.

XVIII(2)62. »Trifolium hepaticum flore albo. In Pyrenæis.» D:o.

XVIII(2)63. »Trifolium hepaticum flore rubro. Hafniæ in hort.» D:o.

XVIII(2)post 63. »Trifolium Hepaticum flore pleno Bauh. Hepatica aurea multiflora Tab. Ex horto Leydensi.» D:o, fl. plen.

XVIII(2)64. »Melilotus officinarum Germaniæ Bauh. Lotus sylvestris Tab. Steinklee. In Lusatia, Misnia, Bavaria, Helvetia, Dania &c.» Das linke Exemplar ist *Melilotus sulcatus* Desf., das rechte kaum bestimmbar.

XVIII(2)65. »Lotus sylvestris flore albo Tab. Passim.» *Melilotus albus* Desr.

XVIII(2)66. »Melilotus corniculis reflexis major Bauh. Melilotus Italica Lob. In hortis passim. Crevit hoc exemplar in horto meo.» Vom Exemplar ist die Spitze abgebrochen.

XVIII(2)67. »Melilotus Italica folliculis rotundis Bauh. In hortis passim.» Das Exemplar hat keine Frucht, sonst ist es *Melilotus italica* (L.) ähnlich.

XVIII(2)68. »Lotus hortensis odora Bauh. Siebengezeitt. Nardes. In hortis passim.» *Trigonella caerulea* (L.) Ser.

XVIII(2)post 68. »Lotus sativa Græca maculato folio Bauh. Lipsiæ et Hafniæ in hortis.» *Medicago arabica* (L.) All. (*maculata* Willd.).

XVIII(2)69. »Lotus sive Melilotus pentaphyllos minor glabra Bauh. Trifolium siliquosum minus Tab. Schotenklee. Vnser frawen Schüsslin. In Lusatia, Misnia, Helvetia, Dania.» *Lotus corniculatus* L.

XVIII(2)70. »Foliorum et siliquarum exilitate differt a præcedenti. In Gallia Narbonensi.» *Lotus cytisoides* L. var. *Allioni* (Desv.).

XVIII(2)71. »Lotus pentaphyllos minor hirsutus, siliqua angustissima Bauh. Dedit Bauhinus.» *Lotus angustissimus* L.

XVIII(2)72. »Lotus pentaphyllos major, hirsutie candicans Bauh. In GalloProvinia.» *Lotus hispidus* Desf.

XVIII(2)73. »Lotus pentaphyllos frutescens, tenuissimis glabris foliis Bauh. Monspelii in prato quodam unde Bauhino attuli.» *Lotus tenuifolius* (L.) Rchb. (Studien, p. 102.)

XVIII(2)74. »Lotus pentaphyllos incanus Bauh. Cytisus Columellæ Camer. Lipsiæ in hort. et Florentiæ.» *Bonjeania hirsuta* (L.) Rchb.

XVIII(2)75. »Lotus pentaphyllos siliquosus villosus Bauh. Monspelii sponte.» *Tetragonolobus siliquosus* (L.) Roth.

XVIII(2)76. »Lotus siliquosus glaber flore rotunda Bauh. Lotus Lybica Dalechampii. Monspelii sponte.» *Bonjeania recta* (L.) Rchb.

XVIII(2)77. »Idem cum præcedente. Monspelii.» *Bonjeania hirsuta* (L.) Rchb.

XVIII(2)79. »Lotus pratensis siliquosus luteus Bauh. Lotus trifolia siliquosa Tab. Ingolstadii. Skielskioræ.» *Tetragonolobus siliquosus* var. *maritimus* (L.).

XVIII(2)78. »Lotus fruticosus incanus siliquosus Bauh. Lotus asperior fruticosa Lob. Monspelii in collibus.» *Argyrolobium Linnaeanum* Walp.

XVIII(2)80. »Lotus ruber siliqua angulosa Bauh. Lotus pulcherrima tetragonolobus Cam. In hortis passim.» *Tetragonolobus purpureus* Moench.

XVIII(2)81. a) »Lotus pentaphyllos siliqua cornuta Bauh. Basileæ in horto D. Frölichii.» *Lotus edulis* L. b) »Lotus Cretica ex h. m. (horto meo?) A(nn)o 1635 semine Hafnia accepto.» Dieselbe Art.

XVIII(2)82. »Lotus siliquis ornithopodii Bauh. In Italia.» *Lotus ornithopodoides* L.

XVIII(2)83. »Lotus pentaphyllos vesicaria Bauh. Trifolium halicacabum Cam. Lipsiæ in hort.» *Anthyllis tetraphylla* L.

XVIII(2)84. »Loto affinis Vulneraria pratensis Bauh. Lagopodium flore luteo Tab. In Bavaria, Helvetia, Dania.» *Anthyllis vulneraria* L.

XVIII(2)85. »Lagopodium flore albo Tab. Basileæ ad Rhenum.» D:o.

XVIII(2)86. »Loto affinis hirsuta flore subrubente Bauh. In GalloProvincia.» D:o.

XVIII(2)87. »Loto affinis siliquis hirsutis circinatis Bauh. Auricula muris Cam. Dedit Bauhinus.» *Hymenocarpus circinatus* (L.) Savi.

VOLUMEN XIX.

Horti sicci, seu stirpivm studio et labore D. Ioachimi Burseri Camentio-Lusati, in Regia Nobilium Academia Sorana Medici, et Physices professoris publici per diversas regiones et loca collectarum, et secundum seriem Pinacis Bauhiniani digestarum Volumen XIX, continens Sectiones omnes 6. libri noni Pinacis eiusdem.

XIX.1. »Rubia tinctorum sativa Bauh. ferberröthe. Monspelii sponte.» *Rubia tinctorum* L.

XIX.2 »Rubia sylvestris aspera Bauh. Monspelii et Florentiæ sponte.» Links *Rubia tinctorum* L., rechts *R. peregrina* L.

XIX.3. »Rubia sylvestris lævis Bauh. In Lusatia, Misnia, Helvetia &c.» *Galium mollugo* L.

XIX.4. »Rubia sylvestris incana. Nescio an vulgaris ita degeneraverit aut vitium contraxerit. In Gallia Narbonensi.» *Galium maritimum* L. (Studien, p. 102.)

XIX.5. »Rubia pratensis lævis acuto folio Bauh. In pratis Bohemiæ, Misniæ, Seelandiæ. Item prope Thermas Vallesiacas auff der Steigen, unde Bauhino attuli.» *Galium boreale* L. (Studien, p. 102.)

XIX.6. »Rubia montana angustifolia Bauh. Prope Arnbergam superioris Palatinatus et in Austria.» *Asperula galioides* M. B.

XIX.7. »Rubia cynanchica Bauh. klein weiss Wallstro. In Misnia, Helvetia &c.» *Asperula cynanchica* L.

XIX.8. »Rubia cynanchica flosculis rubellis. Basileæ.» Dieselbe Art.

XIX.9. »Rubia cynanchica saxatilis Nauh. In Pyrenæis versus Hispaniam et prope Valentiam Gallorum.» Scheint eine kleine Form von *Asperula tinctoria* L. zu sein. Original von Linnés A. pyrenaica. (Studien p. 103.)

XIX.10. »Rubia maritima Bauh. Prope Aquas mortuas oppidum Galliæ Narbon.» *Crucianella maritima* L.

XIX.11. »Eadem Rubia, adhuc iunior. Monspelii in littore.» *Corispermum hyssopifolium* L., eine fast kahle Form.

XIX.12. »Rubia quadrifolia vel latifolia lævis Bauh. Rubia lævis Taurinensium Lob. In Helvetia p(ro)pe Lucernam, Rhætiæ.» *Asperula taurina* L.

XIX.13. »Rubia quadrifolia vel rotundifolia lævis Bauh. In sylvis prope Einsidel Helvetiorum et in Styria.» *Galium rotundifolium* L.

XIX.14. »Rubia latifolia spicata Bauh. Rubia spicata Cretica Clus. In GalloProvincia.» *Crucianella latifolia* L.

XIX.15. »Rubia angustifolia spicata Bauh. Monspelii, unde Bauhino attuli.» *Crucianella angustifolia* L.

XIX.16. »Rubeola arvensis repens cærulea Bauh. In Lusatia, Misnia, Helvetia, Dania.» *Sherardia arvensis* L.

XIX.17. »An Rubeola saxatilis Bauh? In montibus GalloProvinciæ.» *Galium pusillum* L. (Studien, p. 103.)

XIX.18. »Rubeola echinata saxatilis Bauh. Monspelio vicininis collibus saxosis.» *Vaillantia muralis* L.

XIX.19. »Rubeola lævis parva angustissimis foliolis ramosa, capitulis tomentosis biscutatis &c. In GalloProvincia.» *Galium setaceum* Lam. (Studien, p. 103.)

XIX.20. »Rubia pumila foliis latiusculis. aspera. In Austria. *Galium silvestre* Poll., vielleicht var. *sudeticum* (Tausch). (Studien, p. 103.)

XIX.21. »Rubia humilis montana angustifolia aspera. In montibus saxosis versus Signo oppidum GalloProvinciæ (a la colle d'anis).» Nicht bestimmbar. (Studien, p. 104.)

XIX.22. »Aparine vulgaris Bauh. klebkrautt. Passim.» *Galium aparine* L.

XIX.23. »Aparine minor. In Italia.» *Galium saccharatum* All. (Studien, p. 104.)

XIX.24. »Asperula sive Rubeola montana odora Bauh. Matrisylva Trago. waldtmeister. In Lusatia, Bohemia, Dania, Helvetia.» *Asperula odorata* L.

XIX.25. »Asperula cærulea arvensis Bauh. Basileæ, Monspelii, Florentiæ.» *Asperula arvensis* L. (Studien, p. 104.)

XIX.26. »Eadem cum præcedente, sed flosculis albis. Basileæ.» D:o (d:o).

XIX.27. »Mollugo montana latifolia ramosa Bauh. gross bergk Stein meyerkrautt. In Lusatia, Bohemia.» *Galium silvaticum* L.

XIX.28. »An Mollugo montana angustifolia Bauh. In Austria prope montem Draunstein ad oppidum Gmunten situm.» Dürfte *Galium lucidum* All. sein.

XIX.29. »Gallium luteum Bauh. geel meyerkrautt. Wallstro, labkrautt. In Bavaria, Helvetia, Bohemia, Dania.» *Galium verum* L.

XIX.30. »Gallium rubrum Bauh. In Rhætia prope flumen Rin (id est?) Rhenum orientem.» *Galium rubrum* L.

XIX.31. »Gallium palustre album Bauh. Weisses Meyerkrautt. In Lusatia, Misnia, Dania.» *Galium palustre* L.

XIX.32. »Cruciata hirsuta Bauh. gölden waldtmeister. Cruciata minor, Asperula aurea Lob. In Misnia, Bohemia, Helvetia.» *Galium cruciata* (L.) Scop.

XIX.33. »Cruciata glabra Bauh. Dedit Bauhinus Bononiæ lectam.» *Galium vernum* Scop.

XIX.34. »Ruta hortensis latifolia Bauh. Rautten. In hortis passim.» Beschädigt, scheint *Ruta graveolens* L. zu sein.

XIX.35. »Ruta hortensis altera Bauh. In hortis.» *Ruta graveolens* L.

XIX.36. »Ruta sylvestris major Bauh. Ruta montana Tabern. Florentiæ sponte.» *Ruta chalepensis* L.

XIX.37. »Ruta sylvestris minor Bauh. Monspelii sponte.» *Ruta montana* L.

XIX.38. »Ruta sylvestris flore magno albo Bauh. Harmala Dod. In hortis Italiæ.» *Peganum harmala* L.

XIX.39. »Thalictrum maius siliqua angulosa aut striata Bauh. Wiesenrautte. In Misniæ montibus. Ruta pratensis herbariorum Lob.» *Thalictrum aquilegifolium* L.

XIX.40. »Vix differt a præcedente. In Lusatia, Misnia &c.» D:o.

XIX.41. »Thalictrum maius Brassilianum. Videtur idem cum vulgari. Ex Brassilia attulit Pharmacopæus Lutetianus.» *Thalictrum dioicum* L.

XIX.42. »An Thalictrum maius non striatum Bauh? An vero idem cum præcedente? vulgari? Locus natalis excidit.» *Thalictrum aquilegifolium* L.

XIX.43. »Thalictrum maius flavum, staminibus luteis, vel glauco folio Bauh. In hortis Lusatiæ.» Vielleicht *Thalictrum minus* L.

XIX.44. »An hoc potius sit Thalictrum glauco folio Bauh? In Lusatia.» Dürfte *Thalictrum flavum* L. sein.

XIX.post 44. »Thalictri Hispanici nomine accepi ex horto Leydensi.» Nicht bestimmbar.

XIX.45. »Thalictrum montanum album Bauh. In Austria superiori et Pyrenæis.» *Thalictrum majus* Cr.

XIX. 46. »Thalictrum pratense angustifolium Bauh. Ad pagum Basileensem Michelfelden et in Seelandia Danorum.» Vielleicht *Thalictrum simplex* L.

XIX.47. »Thalictrum pratense angustissimo folio Bauh. Figura e(st) in Prodromo. In Lusatia.» *Thalictrum angustifolium* Jacq.

XIX.48. »Thalictrum minus Bauh. A parente.» Vielleicht *Thalictrum minus* L.

XIX.49. »Thalictrum minimum foetidissimum Bauh. In Vallesia non procul ab oppido S. Niclas unde Bauhino attuli.» *Thalictrum foetidum* L. (Studien, p. 104.)

XIX.50. »Faba Bauh. Bohnen. In hortis passim.» *Vicia faba* L.

XIX.51. »Faba minor sive equina Bauh. In hortis.» *Vicia narbonensis* L.

XIX.52. »An Faba sylvestris fructi rotundo atro Bauh? Caulis et siliqua hirsutæ, flos mixti coloris. In Gallia.» *Vicia narbonensis* L.

XIX.53. »Smilax hortensis sive Phaseolus major Bauh. türkische bonen. In hortis passim.» *Phaseolus vulgaris* L.

XIX.54. »Smilax siliqua sursum rigente: vel Phaseolus parvus Italicus Bauh. Basileæ in horto D. Frölichii.» *Vigna sinensis* (L.) Endl.

XIX.55. »Phaseolus Aegyptiacus nigro semine Bauh. Leplap Clus. pann. Basileæ in horto Bauhini.» *Dolichos lablab* L.

XIX.56. »Phaseolus Indicus Clusii. Dedit Bauhinus una cum nomine.» Kaum bestimmbares Exemplar ohne Blüten und Frucht, vielleicht *Vigna sinensis* (L.) Endl.

XIX.57. »Pisum maius quadratum Bauh. fasel Erbsen. Fructus angulosus flavens magnus, flos ruber. In hort. Misniæ.» *Pisum sativum* L.

XIX.58. »Pisum umbellatum Bauh. kronen Erbsen. Büschelerbsen. In hortis passim.» Dürfte *Pisum sativum* var. *umbellatum* (L.) sein.

XIX.59. »Pisum hortense maius Bauh. Stengel Erbsen. In hortis.» *Pisum sativum* L.

XIX.60. »Pisum arvense Bauh. gemeine Erbsen. In arvis passim.» *Pisum arvense* L.

XIX.61. »Pisa sine cortice duriore Bauh. Erbsen ohne Schalalen. In hortis.» *Pisum sativum* L.

XIX.62. »Pisum sylvestre perenne Bauh. Wilde Erbsen. In Thuringia.» *Vicia pisiformis* L.

XIX.63. »An Pisum sylvestre minus Tabern? In Gallia. Folia sunt molliora quam p(ræ)cedentis.» *Vicia dumetorum* L.

XIX.64. »Pisum vesicarium fructu nigro, alba macula notato Bauh. Halicacabus peregrinus Tab. Basileæ et Lipsiæ in hortis.» *Cardiospermum halicacabum* L.

XIX.65. »Pisum Indicum minus coccineum Bauh. Dedit Bauhinus cum nomine.» Nur ein Blatt, stimmt mit *Abrus precatorius* L. überein.

XIX.66. »Ochrus folio integro, capreolos emittente Bauh. Aracus Matth. Florentiæ, Basileæ, Lipsiæ &c. Soræ in hortis.» *Lathyrus ochrus* (L.) DC.

XIX.67. »Lathyrus sativus flore fructuque albo Bauh. Lathyris leguminosa angustifolia Tab. Lipsiæ in hort.» *Lathyrus sativus* L.

XIX.68. »Lathyrus sativus flore purpureo Bauh. Aracus sive Cisera Dod. Altorffii.» Scheint mir *Lathyrus sativus* L. zu sein.

XIX.69. »Lathyrus syl. major Bauh. Lipsiæ in hort.» *Lathyrus silvestris* L.

XIX.70. »Lathyrus latifolius Bauh. Clymenum Matth. In Gallia, Bohemia, Italia. Dania.» *Lathyrus latifolius* L.

XIX.71. »Lathyrus angustifolius semine maculoso Bauh. Cicercula Aegyptiaca Clus. Dedit Bauh. cum nomine.» *Lathyrus sativus* L.

XIX.(71 bis). »An Lathyrus angustiss. folio Americanus variegatus Bauh? Lathyrus flore elegantissimo accepi semen Hafnia a D. Georgio Fürenio.» Scheint mir *Lathyrus articulatus* L. zu sein.

XIX.72. »Lathyrus angustifolius humilis Bauh. Monspelii.» *Lathyrus articulatus* L.

XIX.73. »Lathyrus syl. major angustissimo folio Bauh. Monspelii» Ist wohl *Lathyrus latifolius* var. *linifolius* Rouy.

XIX.74. »An Lathyrus peregrinus foliis Viciæ flore subcæruleo Bauh? Lutetiæ in palude una cum Gratiola.» *Lathyrus palustris* L.

XIX.post 74. »Lathyrus arvensis erectior flore cæruleo. In arvis Italiæ, Bavariæ.» Scheint *Lathyrus palustris* L. zu sein. (Studien, p. 104.)

XIX.post 74 (bis). »Lathyrus arvensis angustifolius flore luteo. Monspelii sponte. Et in horto meo.» *Lathyrus annuus* L. (Studien, p. 105.)

XIX.ante 75. »Cicercula erecta l. Fureri. Flos est purpureus: folia singularia: caulis non alatus. In arvis Thuringiæ.» *Lathyrus nissolia* L. (Studien, p. 105, wo »aren.» für »arvis» steht.)

XIX.75. »Lathyrus syl. luteus, foliis Viciæ Bauh. Vicia Tabern. geel Wicken. In Lusatia, Misnia, Helvetia, Dania.» *Lathyrus pratensis* L.

XIX.76. »Lathyrus arvensis repens tuberosus Bauh. Pseudoapios Matth. Glandes terrestres Clus. In Austria, Lusatia, Bohemia, Dania.» *Lathyrus tuberosus* L.

XIX.77. »Lathyrus tuberosus minimus flore maiusculo, singulari, rubro &c. Ad Castellum novum prope Monspelium.» *Lathyrus cicera* L. (Studien, p. 105.)

XIX.78. »Lathyrus pusillus floribus parvis singularibus, luteolis. &c. In Gallia.» *Lathyrus angulatus* L. (Studien, p. 105.)

XIX.79. »Lathyrus aculeatus. In Gallia.» *Lathyrus canescens* (L. fil.) Gr. & G. (Studien, p. 105.)

XIX.80. »Vicia sativa vulgaris Bauh. Wicken. In arvis passim.» *Vicia sativa* L.

XIX.81. »Vicia maxima dumetorum Bauh. Wilde wicken. In Lusatia, Helvetia, Dania &c.» *Vicia sepium* L.

XIX.82. »Vicia sepium folio rotundiore acuto Bauh. Passim. D:o.

XIX.83. »Vicia multiflora Bauh. In Misnia, Austria, Seelandia Danorum.» *Vicia silvatica* L.

XIX.84. »Vicia sylvatica hirsutis foliis. Non longe Herbipoli in sylva.» *Vicia orobus* DC. (Studien, p. 105.)

XIX.85. »Vicia montana spicata flore grandiusculo, ex cæruleo nigrescente (licet nunc colorem mutaverit). Ad oppidum Signo in Gallia Narbonensi.» *Vicia onobrychioides* L. (Studien, p. 106.)

XIX.86. »Vicia sylvestris spicata Bauh. blauwe wilde wicken. In Misnia, Helvetia, Dania.» *Vicia cracca* L.

XIX.87. »Vicia syl. spicata albo flore. In Misnia.» *Vicia tenuifolia* Roth.

XIX.88. »Vicia syl. lutea, siliqua hirsuta Bauh. Florentiæ, et in GalloProvincia. Flos ex luteo albescit.» *Vicia lutea* L.

XIX.89. »Vicia lutea foliis Convolvuli minoris Bauh. Aphaca Lob. Elatine 3. Tab. Parisiis, Monspelii, Florentiæ.» *Lathyrus aphaca* L.

XIX.90. »Vicia semine rotundo nigro Bauh. Vicia 2da angustifolia Bauh. in esit. Matth. In arvis Lusatiæ, Helvetiæ &c.» *Vicia angustifolia* (L.) Rich.

XIX.91. »Aracus sive Cracca major Lob. flore albo. In agro Sorano inter secale.» *Vicia sativa* L. forma.

XIX.92. »Vicia segetum cum siliquis plurimis hirsutis Bauh. Aracus sive Cracca minima Lob. In arvis passim.» *Ervum hirsutum* L.

XIX.93. »Cracca minor flosculis paucioribus purpurocæruleis. Monspelii inter segetes.» *Ervum tetraspermum* L. (Studien, p. 106, wo ich irrtümlich »purpurascentibus» gelesen habe.)

XIX.94. »Vicia segetum singularibus siliq(ui)s glabris Bauh. Flosculus ex flavo (darüber:) cæruleo pallescit. Norimbergæ in arvis.» *Ervum tetraspermum* L., einblütige Form.

XIX.95. »Vicia syl. pumila flore grandiusculo ex luteo pallescente, hirsuto simul cum foliis. Vicia syl. lutea siliqua hirsuta, nondum descripta Bauh. Monspelii et Massiliæ.» *Vicia hybrida* L. (Studien, p. 106.)

XIX.96. »Vicia syl. pumila grandiflora glabra. In Gallia Narbonensi.» *Vicia pyrenaica* Pourr. (Studien, p. 106.)

XIX.97. »Vicia montana minima, flosculo purpureo, alæ statim adnato citra pedunculum. In aridis montibus Lusatiæ.» *Vicia lathyroides* L. (Studien, p. 106.)

XIX.98. »Vicia syl. minima incana, flosculo albo pæne singulari, oblongum pediculum habente. Monspelii.» *Vicia nigricans* (M. B.) Coss. & Germ. (Studien, p. 107.)

XIX.(98 bis). »Viciæ similis, supra infraque terram fructum edens Bauh. Arachnida

Cretica Belli. Hafniæ in horto Clariss. D. Olai Wormii: postea in meo sæpe crevit.» Dürfte *Lathyrus sativus* L. var. *amphicarpus* L. sein.

XIX.99. »Lens vulgaris Bauh. Linsen. In arvis Bohemiæ et alibi.» *Lens esculenta* Mnch.

XIX.100. »Lens major Bauh. grosse linsen. In hortis.» D:o.

XIX.101. »Orobus siliquis articulatis, semine majore Bauh. Orobus repens herbariorum Lob. Basileæ, Lipsiæ in hort.» *Ervum ervilia* L.

XIX.(101 bis). »An Orobus semine obtuso triangulo Bauh? Cicer orobæum Advers. Cicer syl. inscribebatur semen Hafnia acceptum, unde crevit hic Soræ in horto.» *Astragalus baeticus* L.

XIX.102. »Cicer sativum Bauh. Rote kichern. In hortis Italiæ, Germaniæ &c.» *Cicer arietinum* L.

XIX.103. »Cicer syl. foliis oblongis hispidis maius Bauh. Badenæ Austriæ inferioris.» *Astragalus cicer* L.

XIX.104. »Cicer foliis oblongis hispidis minus. In Thuringia.» *Astragalus danicus* Retz.

XIX.post 104. »An Ciceri sylvestri minori affinis si non idem Bauh. Glaux Clusii Tab. An potius Onobrychis quædam cærulea. Prope Hippolytum Austriæ.» *Astragalus onobrychis* L.

XIX.ante 105. »Habet folia breviora seu rotundiora quam præcedens. In Vallesia.» D:o.

XIX.105. »Cicer montanum lanuginosum erectum Bauh. In Thuringia.» *Oxytropis pilosa* (L.) DC.

XIX.106. »Cicer syl. alpinum flore albo. In Pyrenæis et Rhætia.» *Oxytropis campestris* (L.) DC. (Studien, p. 107.)

XIX.107. »Cicer syl. latifolium triphyllon Bauh. Basileæ dedit Bauhinus.» *Ononis* spec., nicht näher bestimmbar.

XIX.108. »Lupinus sativus flore albo Bauh. weisse feigbonen. In hortis passim.» *Lupinus albus* L.

XIX.109. »Lupinus syl. flore cæruleo Bauh. blauwe feigbonen. In hortis sponte vero p(ro)pe Bormo oppidum GalloProvinciæ.» Vegetativer Spross, wie es scheint, von *Lupinus angustifolius* L.

XIX.110. »Lupinus syl. flore luteo Bauh. geele feigbonen. In hortis passim.» *Lupinus luteus* L.

XIX.111. »Lupinus peregrinus major vel villosus Bauh. In hortis passim.» Scheint mir *Lupinus pilosus* Murr. zu sein.

XIX.112. »Lupinus cæruleus villosus latifolius pumilus. Non longe Monspelio sponte in arvis, et p(ro)pe oppidum Bormo GalloProvinciæ.» *Lupinus hirsutus* L. (Studien, p. 107.)

XIX.113. »Lupinus peregrinus pentaphyllos Bauh. Basileæ in horto D. Frölichii, qui et(iam) iconem adpositam delineavit.» Eine kleine Tintenzeichnung ist an die Etikette geheftet. *Pedicellaria pentaphylla* (L.) Schrank.

XIX.114. »Fænumgræcum sativum Bauh. Bockshorn. In hortis passim.» *Trigonella foenum graecum* L.

XIX.115. »Fænumgræcum sylvestre Bauh. Dedit Bauhinus.» D:o.

XIX.116. »Securidaca lutea major Bauh. Hedysarum sive Securidaca major Lob. geel Peltschen. Lipsiæ et Hafniæ in hortis.» *Bonaveria securidaca* (L.) Scop.

XIX.117. »Securidaca lutea minor, corniculis reflexis Bauh. Lipsiæ et Hafniæ in hortis.» *Astragalus hamosus* L.

XIX.118. »Securidaca siliquis planis, utrinque dentatis Bauh. Securidaca peregrina Clus. Ad oppidum Bormo GalloProvinciæ.» *Biserrula pelecinus* L.

XIX.119. »Securidaca dumetorum major flore vario, siliquis articulatis Bauh. Hedysarum purpureum Tab. In Lusatia, Bohemia, Bavaria, Dania. Purpurbraun Peltschen.» *Coronilla varia* L.

XIX.120. »Ferrum equinum siliqua singulari Bauh. Hedysarum sive Ferrum eq(ui)num Tabern. Habet binas siliquas coniunctim. Basileæ in hort.» *Hippocrepis unisiliquosa* L.

XIX.121. »Ferrum equinum pumilum, siliqua singulari. In arvis Massiliensibus.» *Hippocrepis unisiliquosa* L. (Studien, p. 107.)

XIX.122. »Ferrum equinum siliqua multiplici Bauh. Monspelii.» *Hippocrepis comosa* L.

XIX.123. »Ferrum equinum Germanicum siliquis in summitate Bauh. In Bavaria, Thuringia &c.» D:o.

XIX.124. »Ferrum equinum minimum. An Ferrum equinum Gallicum siliquis in summitate Bauh? In arvis GalloProvinciæ.» *Hippocrepis ciliata* Willd.

XIX.125. »An hoc sit potius Ferrum equinum Gallicum, siliquis in summitate Bauh? Quamvis legerim Florentiæ. *Hippocrepis glauca* Ten.

XIX.126. »Ferro equino Gallico affinis Bauh? In Gallia Narbonensi.» Ohne Frucht, kann wohl dieselbe Art sein.

XIX.127. »Polygala major Massiliotica Bauh. Polygala Valentina 2da Clus. Non longe Massilia.» *Coronilla juncea* L.

XIX.128. »Polygala altera Bauh. Coronilla sive Colutea minima Lob. In GalloProvincia.» *Coronilla minima* L.

XIX.129. »Foliorum exilitate et rotunditate differt a præcedente. Monspelii.» D:o.

XIX.130. »Ornithopodium minus Bauh. Flosculi sunt lutei. Parisiis.» *Ornithopus perpusillus* L.

XIX.131. »Ornithopodium radice tuberculis nodosa Bauh. Flosculi albicant. In Lusatia.» D:o.

XIX.post 131. »Ornithopodium flore cæruleo. Venit ex horto Leidensi una cum nomine.» Scheint auch *O. perpusillus* zu sein.

XIX.132. »Ornithopodio affinis hirsuta scorpioides Bauh. Scorpioides leguminosa Advers. Monspelii.» *Ornithopus compressus* L.

XIX.133. »Ornithopodio affinis hirsuta, fructu stellato Bauh. Stella leguminosa Lob. Tab. In horto D. Frölichii Basileæ.» Nur vegetativ, kaum bestimmbar.

XIX.134. »Tribulus terrestris Ciceris folio fructu aculeato Bauh. In Valle Augusta, Florentiæ, et ad oppidum Bellevue Galliæ Narbon.» *Tribulus terrestris* L.

XIX.135. »Onobrychis fructu echinato minor Bauh. Bormii GalloProvinciæ in littore maris, unde Bauhino co(mmun)icavi.» *Onobrychis caput galli* L. (Studien, p. 107.)

XIX.136. »Onobrychis semine clypeato aspero major Bauh. Hedysarum alt. clypeatum Lob. Senis Italiæ sponte.» *Hedysarum coronarium* L.

XIX.137. »Onobrychis semine clypeato lævi Bauh. In Carinthia, in Pilato Lucernatum, et prope Piperinas seu Fabarias thermas: unde Bauhino co(mmun)icavi.» *Hedysarum obscurum* L.

XIX.138. »Onobrychis incana foliis longioribus Bauh. In GalloProvincia, unde Bauhino co(mmun)icavi.» Scheint eine pubescente Form von *Onobrychis viciifolia* Scop. zu sein. (Studien, p. 107.)

XIX.139. »Onobrychis incana minima. An Onobrychis incana foliis rotundis? In GalloProvincia non longe Massilia.» *Astragalus glaux* L.

XIX.140. »Onobrychis spicata flore purpureo Bauh. hanenkopff. In Bavaria, Austria, Gallia.» *Onobrychis viciifolia* Scop.

XIX.141. »Exilior est præcedente. In Austria, item inter Genevam et Lugdunum pratis aridis.» *Onobrychis arenaria* Ser.

XIX.142. »Onobrychis spicata floribus pallidis nigris radiis notatis Bauh. In Gallia Narbonensi.» *Onobrychis saxatilis* Lam.

XIX.143. »Onobrychis floribus Viciæ maioribus cæruleo purpurascentibus, vel foliis Tragacanthæ Bauh. In Gemme, Vallesiæ monte.» *Oxytropis montana* (L.) DC.

XIX.144. »Foliorum lanugine seu hirsutie a præcedente differt. In Pyrenæis.» *Oxytropis pyrenaica* Gr. & G.

XIX.post 144. »Astragalus aliquis peregrinus. A parente.» Vegetativer Spross, wie es scheint, von *Anthyllis barba Jovis* L.

XIX.ante 145. »Astragali Boetici nomine accepi ex horto Lugdunensi.» Nur Blätter.

XIX.145. »An Astragalus alpinus Helveticus Bauh. In montibus Helvetiæ, Austriæ et Pyrenæis.» *Astragalus alpinus* L.

Auf diesem Bogen befindet sich auch ein Exemplar mit besonderer Etikette: »N. 4. num anthyllis altera lenti similis Dod.» Darunter hat Burser geschrieben: »an Astragalus 2. Clus. a Simone Pauli.» Scheint *Astragalus pentaglottis* L. zu sein.

XIX.146. »Cum præcedente similitudinem habet, nisi quod flores magis conglomerati nec ita in spicam compositi, radix forte major et lignosior &c. In Pyrenæis.» Scheint *Oxytropis montana* (L.) DC. zu sein.

XIX.147. »Astragalus montanus quidam, flore purpureo, foliis, caule &c. præ villositate flavescentibus. An Astragalus floribus globosis Bauh. In montibus GalloProvinciæ prope oppidum Signo (a la colle d'anis).» *Anthyllis montana* L. (Studien, p. 108.)

XIX.148. »An hic sit Astragalus villosus, floribus globosis Bauh? Monspelii.» *Astragalus purpureus* Lam.

XIX.149. »Astragalus Monspeliens. Clusii quem præcedenti adiungit Bauhinus. An sit Ornithopodium maius, cuius mentionem facit Dodon. f. l. p. 544. Monspelii et Florentiæ.» *Astragalus monspessulanus* L.

XIX.150. »Astragalus sylvaticus foliis oblongis glabris Bauh. In Misnia, Helvetia &c.» *Lathyrus montanus* Bernh., zwei Formen, typisch und schmalblättrig.

XIX.151. »Orobus alpinus latifolius Bauh. In alpibus Helvetiæ, unde Bauhino attuli.» *Lathyrus luteus* (L.) Peterm. (Studien, p. 108.)

XIX.152. »Idem cum præcedente. In Pyrenæis.» D:o (d:o).

XIX.153. »Orobus sylvaticus purpureus vernus Bauh. Waldt wicken. In sylvis Misniæ, Lusatiæ, Helvetiæ.» *Lathyrus vernus* (L.) Bernh.

XIX.154. »Orobus sylvaticus pallido flore Bauh. Ab alpino latifolio differt, quod siliquas inter folia, fere sine omni pediculo gestet. In Austria.» Scheint *Lathyrus variegatus* (Ten.) Gr. & G. zu sein, aber eine abweichende Form mit fast ungestielter Inflorescenz und kurzen Hülsen.

XIX.155. »Orobus sylvestris angustifolius Asphodeli radice Bauh. In Helvetia &c.» *Lathyrus montanus* (L.) Bernh.

XIX.156. »Orobus alpinus, aut Astragalus, aut Onobrychis &c. In Rhætia.» *Astragalus frigidus* (L.) Bge.

XIX.157. »Galega vulgaris Bauh. Ruta capraria Tabern. Geissrautte. fleckenkrautt. In comitatu Tyrolensi et Ungaria sponte, qdm et prope Clagefurtum oppidum Episcop Carinthiæ.» *Galega officinalis* L.

XIX.158. »Galega flore candido. Lipsiæ in horto.» *Galega officinalis* L.

XIX.159. »Galega Aegyptiaca siliquis articulatis Bauh. Sesban Alpini. Co(mmun)icavit Bauhinus.» Nur Früchte, ohne Zweifel von *Sesbania aegyptiaca* Pers.

XIX.160. »Galegæ affinis Sophora dicta Bauh. Hoxocoquamoclit Camer. Dedit Bauhinus.» Dürfte *Cassia sophera* L. sein.

XIX.161. »Glycyrrhiza capite echinato Bauh. In hortis Misniæ &c.» Vegetativer Spross, ohne Zweifel einer *Glycyrrhiza*.

XIX.162. »Glycyrrhiza siliquosa vel Germanica Bauh. lackritze. Bambergæ sponte, q(ui)d(e)m et prope Monspelium.» *Glycyrrhiza glabra* L.

XIX.163. »Glycyrrhiza sylvestris floribus luteo pallescentibus Bauh. Glaux vulgaris Lob. Wildt Bockshorn. In Lusatia, Bohemia, Dania.» *Astragalus glycyphyllos* L.

XIX.164. »Glycyrrhiza sylvestris altera floribus puniceis, foliis Arachi Bauh. Herbipoli. In Misnia, Italia, Pyrenæis. Parisiis au bois de boulogne. Etiam in Seelandia Danor.» *Lathyrus niger* (L.) Bernh.

XIX.165. »Glycyrrhiza sylvestris Ioh. Franco in horto Lus. Wilde lackritze. Radix admodum dulcis. In Lusatia, et Pyrenæis.» *Vicia orobus* L.

VOLUMEN XX.

Hortus siccus, seu stirpivm studio et labore D. Ioachimi Burseri Camentio-lusati, in Regia Nobilium Academia Sorana Medici, et Phys. profess. publici per diversas regiones et loca collectarum et iuxta seriem Pinacis Bauhiniani digestarum Volumen XX. continens Sectiones qvinqve priores libri decimi Pinacis dicti.

XX.1. »Lingua cervina Officinarum Bauh. Phyllitis Matth. Hirsch Zunge. In Lusatia, Bohemia, Austria.» *Phyllitis scolopendrium* (L.) Newm.

XX.2. »Lingua cervina folio crispo. Basileae in horto Heinzmanni pharmacopæi.» D:o (In Studien, p. 108, steht irrtümlich, dass dieses Exemplar verschwunden sei. Die dortigen Angaben gelten aber die folgende Nummer.)

XX.3. »Lingua cervina multifido folio Bauh. Phyllitis foliis laciniatis Tab. Parisiis in horto du Monsieur Gono.» Das Exemplar ist nicht mehr da, es ist eine monströse Form derselben Art gewesen (siehe Studien, p. 108 unter XX.2).

XX.4. »Hemionitis vulgaris Bauh. A parente.» *Asplenium hemionitis* L.

XX.5. »Hemionitis minus vulgaris Bauh. Hemionitis peregrina Clus. A parente.» *Phyllitis hemionitis* (Lag.) Ktze.

XX.6. »Ophioglossum vulgatum Bauh. Natter Zunge. In Lusatia, Helvetia.» *Ophioglossum vulgatum* L.

XX.7. »Ceterach officinarum Bauh. Scolopendria Cord. Asplenum Matth. Monspelii et Florentiæ sponte.» *Ceterach officinarum* DC.

XX.8. »Lunaria racemosa minor vel vulgaris Bauh. Ruta lunaria Tabern. Monrautte. In Lusatia, Misnia, Valle Augusta. Dania.» *Botrychium lunaria* (L.) Sw.

XX.9. »Lunaria racemosa ramosa major Bauh. A parente, et a quodam amico.» *Botrychium ramosum* (Roth) Asch.

XX.10. »Lunaria racemosa multifido folio Bauh. Lunaria minor ramosa Clus. a parente.» *Botrychium multifidum* (Gmel.) Rupr. = Matricariæ (Schrank) Spr.

XX.11. »Adiantum folio Coriandri Bauh. Adiantum Syriacum et mas Tab. Venushaar. Monspelii et Florentiæ sponte.» *Adiantum capillus Veneris* L.

XX.12. »Adiantum foliis longioribus pulverulentis, pediculo nigro Bauh. Onopteris major Tab. Eselsfarn. Florentiæ. Et in Gallia.» *Asplenium adiantum nigrum* L. subsp. *onopteris* L.

XX.13. »Adiantum fruticosum Brasilianum Bauh. Ex Brasilia accepi per pharmacopæum quendam Parisiis.» *Adiantum pedatum* L. (Studien, p. 108.)

XX.14. »Trichomanes sive Polytrichum officinarum Bauh. Widertodt. In Lusatia, Misnia, Helvetia &c.» *Asplenium trichomanes* L.

XX.15. »Trichomanes minus et tenuius Bauh. In monte Wasserfall Helvetior.» *Asplenium viride* Huds.

XX.16. »An Trichomanes ramosum Bauh. Quamvis ramosa non sit, major tamen est vulgari. Prope Schindeleich Helvetior.» D:o.

XX.17. »Ruta muraria Bauh. Adiantum album Tab. Mauer Rautten. In Misnia, Lusatia, Helvetia.» *Asplenium ruta muraria* L.

XX.18. »Non differt a præcedente nisi lusu foliorum. In Misnia.» *Asplenium ruta muraria* L. var. *leptophyllum* Wallr.

XX.19. »Polytrichum aureum maius Bauh. Adiantum aureum Tab. gülden Widertodt. In Misnia, Bohemia. Dania.» Arnell: *Polytrichum commune* L.

XX.20. »Polytrichum aureum medium Bauh. In Misnia etc.» Arnell: *Dicranum scoparium* (L.) Hedw. und *Stereodon cupressiformis* (L.) Brid.

XX.21. »Polytrichum aureum minus Bauh. In Misnia.» Arnell: *Dicranum scoparium* (L.) Hedw., *D. fuscescens* Turn. und *Stereodon cupressiformis* (L.) Brid.

XX.22. »Polytrichum aureum minus serpillifolium. In Misnia ad saxa humecta.» *Astrophyllum punctatum* (L.) Lindb. (Studien, p. 109.)

XX.23. »Ros Solis folio rotundo Bauh. Rorida sive Ros Solis major Lob. Sonnenthauw. In Lusatia, Dania.» *Drosera rotundifolia* L.

XX.24. »Ros Solis folio oblongo Bauh. Rorella minor 2. Tab. In Lusatia.» *Drosera anglica* Huds.

XX.25. »Filix ramosa major pinnulis obtusis non dentatis Bauh. Filix fæmina Lob. Tab. farnkrautt weiblin. In Misnia, Bohemia, Dania.» *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn.

XX.26. »Filix ramosa, non dentata, florida Bauh. Osmunda Lobelii. gross farnkrautt. In Lusatia inferiori, Bavaria, Fionia.» *Osmunda regalis* L.

XX.27. »An Filix ramosa minor pinnulis dentatis Bauh? In Lusatia.» *Dryopteris spinulosa* (Müll.) Ktze.

XX.28. »Filix palustris maxima dentata Bauh. In montibus udis Misniæ.» *Dryopteris dilatata austriaca* (Jacq.) Woyn.

XX.29. »Filix palustris altera, subfusco pulvere hirsuta Bauh. Struthiopteris appellabatur a Iungermanno. In Thuringia.» *Struthiopteris filicastrum* All.

XX.30. »Filix non ramosa, dentata Bauh. Filix mas Lob. Tab. farnkrautt männlin. In Lusatia, Bohemia, Helvetia, Dania.» *Dryopteris filix mas* (L.) Schott.

XX.31. »An Filix non ramosa petiolis tenuissimis et tenuissime dentatis Bauh? In Taurero Rastadiensi.» *Dryopteris rigida* (Hoffm.) Underw.? Sporangier sterila, sannolikt hybrid?

XX.32. »Filix querna Bauh. Filix arborea Tragi. Eichelfarn. Baumfarn. In Lusatia, Bohemia, Dania.» *Dryopteris Linnaeana* C. Chr.

XX.33. »An Felix saxatilis foliis non serratis Bauh? Filicula petræa fæmina III. Tab. In ipsa scaturigine thermarum Visebadensium infra Moguntiam. An

Filix fæmina vulgaris, cum cæspitibus illuc deportata?» Blad, för unga för bestämning.

XX.34. »Filix saxatilis non ramosa nigris maculis punctata Bauh. Filix pumila saxatilis Clus. In Lusatia.» *Cystopteris fragilis* (L.) Bernh.

XX.35. »Filicula alpina crispa Bauh. In montibus Helvetiæ Schindeleich.» In Linnés Spec. pl. Ed. 2, p. 1523, steht unter Osmunda crispa: »Conf. Filicula alpina crispa Bauh. pin. 358, e Bursero.» *Allosorus crispus* (L.) Bernh.

XX.36. »Videtur eadem cum præcedente. In Pyrenæis.» D:o.

XX.37. »Filix saxatilis corniculata Bauh. Holostium petræum Tab. klein Schlangenzwang. Steinfarn. In Lusatia, Bavaria, Helvetia.» *Asplenium septentrionale* (L.) Hoffm.

XX.38. »Filicula fontana minor Bauh. In GalloProvincia.» *Asplenium fontanum* (L.) Bernh.

XX.39. »Filicula maritima Bauh. Chamæ filix marina anglica Lob. In Insulis stoechadibus, unde ad Bauhinum detuli.» *Asplenium marinum* L. (Studien, p. 109.)

XX.40. »Filix aculeata major Bauh. In monte Wasserfall et aliis alpibus.» *Polystichum aculeatum* (L.) Schott.

XX.41. »Lonchitis aspera Bauh. Lonchitis altera mas Tabern. Spicant männlin. In Pyrenæis et alpibus Austriæ.» *Polystichum lonchitis* (L.) Roth.

XX.42. »Lonchitis minor Bauh. Lonchitis altera Lob. Spicant weiblin. In Misnia, et Pyrenæis.» *Blechnum spicant* (L.) Sm.

XX.43. »Lonchitis folio Ceterach Bauh. Lonchitis altera Maranthæ Clus. In monte Vallis Augustæ.» *Notochlaena Marantae* (L.) R. Br.

XX.44. »Polypodium vulgare Bauh. Engelsüss. Steinlackritze. Passim.» *Polypodium vulgare* L.

XX.45. »Muscus vulgatissimus Bauh. Mooss. Passim.» Arnell: *Hylocomium proliferum* (L.) Lindb.

XX.46. »Muscus denticulatus major Bauh. Florentiæ, et in Taurero Rastadiensi.» *Selaginella helvetica* (L.) Link.

XX.47. »An Musco denticulato similis Bauh? Selago minima. In Taurero Rastadiensi.» *Selaginella selaginoides* (L.) Link.

XX.48. »Muscus Trichomanis facie. In Misnia, Bavaria.» Arnell: *Plagiochila asplenioides* (L.) Dum. (Studien, p. 109.)

XX.49. »Muscus terrestris clavatus Bauh. Lycopodium Tab. Sant Johanns Gürttel. In Lusatia, Bohemia, Helvetia &c.» *Lycopodium clavatum* L.

XX.50. »Muscus clavatus foliis Cupressi Bauh. Savina syl. Tragi. Wilder Sevenbaum. In Lusatia, Thuringia.» *Lycopodium complanatum* L.

XX.51. »An sit idem cum præcedente? In Gothardo, alpibus Austriæ, et in Seelandia.» 2 Exemplare von *Lycopodium alpinum* L., das mittlere wahrscheinlich von den Alpen, steril, das untere wahrscheinlich dänisch, fertil und ohne jede Zweifel diese Art.

XX.52. »Muscus erectus ramosus saturate viridis Bauh. In alpibus Austriæ et Helvetiæ.» *Lycopodium selago* L.

XX.53. »Præcedenti affinis. In Austria.» *Lycopodium annotinum* L.

XX.54. »Muscus pyxioides saxatilis Bauh. In Misnia.» Malme: *Cladonia fimbriata* (L.) Fr. var. *simplex* (Weis).

XX.55. »Muscus coralloides sive cornutus montanus Bauh. Muscus corallinus Tabern. In Lusatia.» Malme: *Cladonia rangiformis* Hoffm. var. *pungens* (Ach.).

XX.56. »Muscus coralloides crispus. In Misnia.» Malme: *Stereocaulon tomentosum* Fr. (Studien, p. 109: S. paschale?).

XX.57. »Muscus coralloides saxatilis Bauh. In Misnia.» Malme: *Cladonia rangiferina* (L.) Nyl.

XX.58. »Muscus arboreus cum orbiculis Bauh. In Lusatia, Misnia, Bohemia &c.» Malme: *Usnea florida* (L.) Hoffm.

XX.59. »Muscus pulmonarius Bauh. Pulmonaria Tabern. Lungenkrautt. Passim.» Malme: *Lobaria pulmonaria* (L.) Hoffm.

XX.60. »Præcedenti affinis. In Austria.» Malme: *Cetraria islandica* (L.) Ach.

XX.61. »Muscus crustæ modo arboribus adnascens Bauh. Passim.» Malme: *Cladonia* sp., Phyllokladien.

XX.62. »Lichen petræus latifolius sive Hepatica fontana Bauh. leberkrautt. Romæ.» Arnell: *Fegatella conica* (L.) Raddi.

XX.63. »Affinis præcedenti. In Gallia, Dania.» Malme: *Peltigera canina* (L.) Hoffm.(?).

XX.64. »Lichen petræus stellatus Bauh. Hepatica 2. Tabern. In Misnia. Dania.» Arnell: *Marchantia polymorpha* L.

XX.65. »Lichen petræus muscosus racemosus Bauh. In Gallia.» Arnell: *Chomiocarpon quadratus* (Scop.) Lindb.

XX.66. »An Muscus saxatilis repens coma sparsa Bauh. Fontinalis Ioh. Bauh. dicebatur a Miano. In Austria nascebatur in aqua, q(ui)d(e)m et in Fionia. Gestat utriculos an veluti siliquas.» Arnell: *Fontinalis antipyretica* L.

XX.67. »Muscus palustris Dodonæi. qui affabre pingit. Ex Belgio a D. Weckerlino Argentinensi, qui Ericoiden appellabat. Legi quoque Monspelii.» *Sphagnum acutifolium* Ehrh.

XX.68. »Lenticula palustris vulgaris Bauh. Wasserlinsen. In Misnia, Austria, Dania &c.» *Lemna minor* L.

XX.69. »Lenticula aquatica triscula Bauh. Hederula palustris Tabern. Lipsiæ.» *Lemna trisulca* L.

XX.70. »Muscus aquis innatans Jungerm. Lipsiæ.» Arnell: *Riccia fluitans* L.

XX.71. »Lenticula palustris latifolia punctata Bauh. Figuram invenies in Prodromo. Prope Venetias in Canalibus dictis.» *Salvinia natans* (L.) All.

XX.ante 72. »Muscus maritimus vulgaris. Ad Insulam Gauffnöe in aqua salsa, non procul Nestwedia.» *Enteromorpha intestinalis* (L.) Link.

XX.72. »Muscus capillaceus multifido folio albidus Bauh. Meermooss. Muscus marinus vulgatissimus Lob. Prope Insulas stoechadas in mari.» *Corallina rubens* L. och *Sphacelaria scoparia* (L.) Lyngb.

XX.73. »Muscus maritimus viridis multifido folio Bauh. Prope Insulas stoechadas in mari.» *Cladophora* conf. *prolifera* (Roth) Kütz.

XX.post 73. »Muscus maritimus ruber coronopifolius. Prope insulas stoechadas in mari.» *Gelidium capillaceum* Kütz. (Studien, p. 109.)

XX.74. »Muscus maritimus Gossypio similis. Prope stoechadas Insulas.» *Enteromorpha* conf. *compressa* (L.) Grev. och *Ceramium* spec.

XX.post 74. »Muscus vel Byssus terrestris ex Virginea. Hoc nomine accepi ex Belgio.» Braune Haare, wahrscheinlich von einer Cyatheacée. »Virginea» ist wohl Virgin Islands in Westindien.

XX.75. a) »Muscus coralloides squammulis loricato Bauh. Corallenmooss. Massiliæ in littore.» *Corallina officinalis* L. b) »Muscus maritimus sive Corallina officinarum Bauh. Massiliæ in littore.» *Corallina rubens* L.

XX.76. »Muscus coralloides crassior, flavens. Massiliæ in littore.» *Sphaerococcus coronopifolius* (Good. & Woodw.) Ag. (Studien, p. 109.)

XX.77. »Muscus maritimus coralloides albus. Massiliæ in littore.» *Liagora viscida* (Forssk.) Ag. (Studien, p. 109.)

XX.78. »Fucus folio rotundo Bauh. Lichen marinus Clus. Opuntia maritima. Dedit Bauhinus.» *Halimeda tuna* (Ell. & Sol.) Lamour.

XX.(78 bis). »Fucus longissimo, lato, tenuique folio Bauh. Neoburgi in mari Balthico.» *Laminaria saccharina* (L.) Lamour.

XX.79. »Muscus marinus Lactucæ folio Bauh. Lactuca marina Tabern. Meerlattich. Roschildiæ Danorum.» *Ulva lactuca* L.

XX.80. Muscus marinus Lactucæ folio albicans. In stagno salso ad pagum Perault non longe Monspelio.» *Monostroma latissimum* (Kütz.) Wittr.

XX.81. »Fucus arboreus polyschides edulis Bauh. Basileæ dedit Bauh. nomine Fuci Tangele(?) edulis ex Scotia.» *Laminaria digitata* (L.) Lamour.

XX.82. »Alga aquatica vitrariorum Bauh. Meergrass. In Gallia Narbonensi, Italia, et ad mare Balticum.» *Posidonia oceanica* (L.) Del.

XX.83. »Alga cornu cervi divisura Bauh. Dedit Bauhinus ab Imperato acceptam.» Malme: *Ramalina* sp., wahrscheinlich *R. polymorpha* Ach.

XX.84. »Habet similitudinem cum præcedente. Basileæ dedit M. Urstisius, in portu Dovarensi Angliæ lectam.» Odhner: *Flustra foliacea* L.

XX.post 84. a) »Fuci marini nomine accepi. Ex Belgio.» Odhner: *Flustra foliacea* L. b) »In littore maris ad pagum fölleslöff non p(rocul) ab Dragsholmio.» Odhner: *Chalina limbata* Mont.

XX.85. »An Alga gramineo folio Bauh? Vide supra Muscum maritimum vulgarem. Prope Lubecam in stagno copiosissime (non memini an salso).» *Sagittaria sagittifolia* L., sterile Blätter.

XX.86. »Alga viridis capillaceo folio Bauh. In stagno salso ad pagum Perault prope Monspelium.» *Chaetomorpha crassa* (Ag.) Kütz.

XX.87. »Alga fontana filicina. In fonte aquæ dulcis inter lapides sibi invicem incumbentes, ad pagum Cette neufe, non longe Monspelio.» Baumwurzeln. (Studien, p. 110.)

XX.88. »Alga in tubulis aquam fontanam ducentibus Bauh. Annæbergæ in aquæductibus seu canalibus ligneis.» Auch Wurzeln, grob und wenig verzweigt.

XX.89. »Fucus maritimus nodosus Bauh. Dedit Bauh.» *Ascophyllum nodosum* (L.) Le Jol.

XX.90. »Fucus maritimus, Quercus marina vulgaris. Prope Insulas stoechadas, et in mari Baltico.» *Dictyopteris polypodioides* (Desf.) Lamour.

XX.91. »Fucus maritimus vel Quercus maritima, vesiculas habens Bauh. Dedit Bauh. nomine Quercus marinæ bacciferæ.» *Fucus vesiculosus* L., steril.

XX.92. »Fucus maritimus vel Quercus maritima, foliorum extremis tumidis, quam aliqui glandiferam vocant Bauh. Dedit Bauh.» D:o, fertil.

XX.93. »Fucus folliculaceus Foeniculi folio Bauh. Ad pagum Perault in mari.» *Cystoseira discors* (L.) Ag. und *Sphaerococcus coronopifolius* (Good. & Woodw.) Grev.

XX.(93 bis). »An Fucus folliculaceus Foeniculi folio longiore Bauh. Fuci maritimi cornuti nomine accepi ex Belgio.» *Polyides rotundus* (Gmel.) Grev.

XX.94. »Fucus folliculaceus foliis Abrotani Bauh. Gongularis marinæ Imperati nomine dedit Bauhinus.» *Cystoseira barbata* (Turn.) Ag.

XX.95. »Videtur idem cum p(ræ)cedente. Prope Insulas stoechadas in mari.» *Cystoseira corniculata* (Wulf.) Zanard.

XX.96. »Fucus racemosus vel Racemus marinus Bauh. Dedit Bauhinus.» *Sargassum linifolium* (Turn.) Ag.

XX.post 96. »Lenticula marina foliis serratis. Hoc nomine accepi ex Belgio. Quadrat cum figura Tabernæ montani sub p(ræ)posito nomine. Videtur t(ame)n non differre a planta subsequenta.» *Sargassum* spec.

XX.97. »Fucus folliculaceus serrato folio Bauh. In mari Baltico. Lutetiam Rhodomago cum ostreis adfertur.» *Fucus serratus* L.

XX.98. »Fucus maritimus ruber, facie Ceterach. Sunt folia æqualiter lata latiuscula, fimbriata, obtusa, non altius excrescentia, nec nisi sigillatim nascentia &c. Prope Insulas stoechadas in mari inter muscum maritimum, et corallinam» *Phyllophora nervosa* (DC.) Grev. (Studien, p. 110)

XX.99. »Fucus aliquis. Venetiis, si recte memini.» *Najas marina* L.

XX.100. »Corallina nigra veluti spinis exasperata Bauh. Basileæ dedit M. Mianus.» Ein Stamm wahrscheinlich von einem *Sargassum* und ältere Sprosstücke von *Sphaerococcus coronopifolius*.

XX.101. »Corallina alba nodosa Bauh. Dedit Bauhinus nomine Corallinæ ex Barbaria.» Odhner: *Gorgonia verrucosa* Pallas.

XX.102. »Corallina pallide flavescens, cortice lævi Bauh. Basileæ accepi a M. Miano.» Odhner: *Leptogorgia sarmentosa* Val.

XX.103. »Corallum rubrum Bauh. rothe Corallen. In Officinis pharmaceut.» Odhner: *Corallium rubrum* Lam.

XX.104. »Corallum album Bauh. Weisse Corallen. In Officinis pharmacopolarum.» Odhner: Wahrscheinlich abgenutzte Fragmente von *Lophohelia prolifera* (Pall.) M. Edw.

XX.105. »Androsaces Chamæ conchæ innascens, vel minor Bauh. Monet tamen quandoque petris innasci. Prope Cetium in stagno salso, non longe Monspelio.» *Acetabularia mediterranea* Lamour.

XX.106. »Fungus auricularis Bauh. Prope Insulas stoechadas in mari.» *Padina pavonia* (L.) Gaill.

XX.107. »An pila marina Bauh. Monspelii in littore maris.» Odhner: Eikapseln von *Purpura* spec.

XX.108. »Pila marina, velut ex ampullis constans, ad spumæ similitudinem Bauh. Monspelii in littore. Uva maris quorundam.» Odhner: Eikapseln eines Gastropoden.

XX.post 108. »Uvæ marinæ nomine accepi. An differat a p(ræ)cedente? Ex littore Oceani.» Odhner: Eikapseln eines Gastropoden.

XX.109 »Zoophyton lumbriciforme. Prope Insulas stoechadas in mari adnascebatur scopulo, sese nihilominus movens.» *Nemalion lubricum* Duby.

Loosliegend auf diesem Papiere: »Alga zoophyton. lumbriciformi similis, a fratre Esaia Neoburgi in mari lecta.» *Chorda filum* (L.) Stackh.

XX.110. »Spongia compressa magna Bauh. Spongia marina flava Tab. bad Schwamm. In Officinis mercatorum.» Odhner: *Euspongia officinalis* L.

XX.111. »Stella quædam marina. Est animal, non planta. Massiliæ in portu.» Odhner: *Ophiomyxa pentagona* Lam.

XX.(111 bis). »Stella marina. Attulit ex Hollandia d(omi)nus Lubinus Med. cand.» Odhner: *Asterias rubens* L.

XX.112. »Fungus porosus Bauh. Fungus favaginosus Franco. Morcheln. In Misnia.» *Morchella conica* Pers.

XX.113. »Fungus lorchelein dictus. In Lusatia.» Fragmente von *Gyromitra esculenta* (Pers.) Fr.

XX.114. »Fungi umbilicum exprimentes plures simul albi Bauh. Stockschwämme. In Misnia, Dania.» Agaricinee, nicht bestimmbar.

XX.115. »Fungus ramosus Bauh. Fungi digitelli Franco. Händeschwämme. In Misnia.» *Calocera viscosa* (Pers.) Fr.

XX.116. »Fungus clypeiformis major Bauh. Stinckendt Schwamm. In Misnia.» Nicht bestimmbar.

XX.117. »Fungus quidam ruberrimus. In Pilato Lucernatum.» Dürfte *Gyrocephalus rufus* (Jacq.) Bref. sein.

XX.118. »Fungus auricularis ruber. In Helvetia. 118.» Offenbar liegt hier eine Verwechselung vor, es ist nämlich eine Floridee, *Peyssonelia squamaria* (Gmel.) Dene (nicht Auricularia mesenterica, wie ich in Studien, p. 110 irrtümlich angegeben habe).

XX.119. »Tuber terrae Bauh. Tartuffalon. Florentiae. 119.» *Tuber brumale* Vitt.

VOLUMEN XXI.

Horti sicci, seu stirpivm studio et labore D. Ioachimi Burseri Camentio-Lusati, in Regia Nobilium Academia Sorana Medici et professor. Physices publici per diversas regiones, et loca collectarum et secundum seriem Pinacis Bauhiniani digestarum Volumen XXI. continens Sectionem VI. libri decimi illius Pinacis!

XXI.1. »Carduus pratensis latifolius Bauh. Wisenkohl. In pratis Lusatiæ, Misniæ, Bohemiæ, Daniæ.» *Cirsium oleraceum* (L.) Scop.

XXI.2. »Affinis præcedenti, nisi sit idem. In Pyrenæis.» *Cirsium rivulare* (Jacq.) Link, kleines, einköpfiges Individuum.

XXI.3. »Carduus pratensis, foliis tenuibus laciniatis Bauh. Erisithales Dalech. In Sturia, et Horto Dei dicto seu monte Calcaris.» *Cirsium erisithales* (L.) Scop.

XXI.4. »Carduus pratensis Asphodeli radice latifolius Bauh. Carduus bulbosus Monspeliens. Lob. Monspelii.» *Cirsium tuberosum* (L.) All.

XXI.5. »Carduus pratensis Asphodeli radice, foliis profunde et tenuiter laciniatis Bauh. Iacea aculeata seu tuberosa Tab. Stachelkraut. Lipsiæ. In Bohemia, Austria.» *Cirsium tuberosum* (L.) All. (Studien, p. 110.)

XXI.6. »Idem Carduus pratensis tuberosus flore albo. Lipsiæ.» D:o (d:o).

XXI.7. »Carduus alpinus monocephalos cum præcedente quoad folia affinitatem gerens. In Pyrenæis.» *Carduus defloratus* L. (Studien, p. 110.)

XXI.8. »Carduus palustris Bauh. In Lusatia, Misnia, Helvetia, Dania.» *Cirsium palustre* (L.) Scop.

XXI.9. »Carduus in avena proveniens Bauh. Carduus arvensis Tab. Ackerdistel. Haberdistel. In Lusatia, Misnia, Bohemia, Dania &c.» *Cirsium arvense* (L.) Scop.

XXI.10. »Carduus avenarius flore albo. In Misnia, Bohemia.» *Cirsium arvense* var. *horridum* Wimm.

XXI.11. »Carduus mollis foliis Helenii Bauh. In Misnia, Bohemia, Rhætia. &c.» *Cirsium heterophyllum* (L.) All.

XXI.12. »Carduus mollis foliis Helenii flore albo. In Bohemia.» D:o.

XXI.13. »Carduus mollis latifolius, Lappæ capitulis Bauh. In Taurero Rastadiensi.» *Carduus personata* (L.) Jacq. (Studien, p. 110.)

XXI.14. »Carduus mollis Lapathi foliis Bauh. In Schneeberg Austriæ inferioris.» *Saussurea discolor* (Willd.) DC.

XXI.15. »Cirsium maximum Asphodeli radice Bauh. In Austria inferiori, unde postmodum semen in hortum Annæbergensem transtuli.» *Cirsium rivulare* (Jacq.) Link.

XXI.16. »Cirsium maius singulari capitulo magno Bauh. Cirsium maius Lob. A parente.» *Cirsium canum* (L.) Mnch.

XXI.17. »Cirsium singulari capitulo squammato, vel incanum alterum Bauh. Lipsiæ in horto Deurlingi.» D:o.

XXI.18. »Cirsium singularibus capitulis parvis Bauh. In monte Wasserfall Helvetiæ.» *Carduus defloratus* L. var. *summanus* (Poll.).

XXI.19. »Cirsium foliis non hirsutis, floribus compactis Bauh. Cirsium Matth. Lob. Monspelii.» *Cirsium monspessulanum* (L.) All.

XXI.20. »Cnicus sativus sive Carthamus officinarum Bauh. Wilder Saffran. In hortis Misniæ, Bohemiæ, Daniæ.» *Carthamus tinctorius* L.

XXI.21. »Cnicus syl. hirsutior, sive Carduus benedictus Bauh. gesegneter Distel. In hortis passim.» *Cnicus benedictus* L.

XXI.22. »Cnicus syl. spinosior Bauh. Heracantha Tab. Dreijdistel. Schönhärle. In Lusatia, Misnia, Gallia, Dania &c.» *Carlina vulgaris* L.

XXI.23. »Atractylis lutea Bauh. Spillendistel. Florentiæ et Monspelii.» *Carthamus lanatus* L.

XXI.24. »Acarna flore purpurorubente patulo Bauh. Acanthoides Columnæ. Monspelii.» *Carlina lanata* L.

XXI.25. »An Acarna capitulis parvis luteis in umbella Bauh. An Cnicus syl. spinosior polycephalus Eiusd(em)? Monspelii.» *Carlina corymbosa* L.

XXI.26. »Acarna major caule folioso Bauh. Chamæleon Salmanticens. Clus. Monspelii.» *Picnomon acarna* (L.) Cass.

XXI.27. »Acarna major caule non folioso Bauh. Acarna Theophrasti Anguillaræ Lob. Lutetiæ in horto du Monsieur Gonu.» *Cirsium Casabonae* (L.) DC.

XXI.28. »Carlina acaulos magno flore Bauh. Chamæleon albus Matth. Eberwurtz. In Pyrenæis.» Nur 2 Blätter, vielleicht von *Carlina acanthifolia* L.

XXI.29. »Carlina acaulos strigosior. Nisi sit flore purpureo, qualis paullo inferius sequitur. Ingolstadii.» *Carlina acaulis* L. (Studien, p. 111.)

XXI.30. »Carlina caulescens magno flore Bauh. Chamæleon albus caule donato Lob. In hortis Lusatiæ.» D:o.

XXI.31. »Carlina acaulos minore purpureo flore Bauh. Chamæleon exiguus Trago. In Bavaria, Misnia, Seelandia.» *Cirsium acaule* (L) All.

XXI.32. »Carlina polycephalos alba Bauh. In alpibus Helvet. et Austriæ.» *Cirsium spinosissimum* (L.) Scop.

XXI.33. »Carduus albis maculis notatus vulgaris Bauh. Carduus Marianus sive lacteus Tab. Margendistel. In hortis passim.» *Silybum marianum* (L.) Gaertn.

XXI.34. »Carduus albis maculis notatus exoticus Bauh. Syrischer Margendistel. Basileæ in hort.» *Notabosis syriaca* (L.) Cass.

XXI.35. »Carduus sphærocephalus latifolius vulgaris Bauh. Rundtköpffische Disteln. Ingolstadii sponte.» *Echinops sphaerocephalus* L.

XXI.36. »Carduus sphærocephalus cæruleus minor Bauh. Ritro seu Rutro Theophr. Advers. Monspelii. Florentiæ.» *Echinops ritro* L.

XXI.37. »Carduus Ritro flore albo. Monspelii.» D:o.

XXI.38. »Carduus capite rotundo tomentoso Bauh. Carduus eriocephalus Clus. In Bohemia, Thuringia, Italia.» Scheint *Cirsium eriophorum* (L.) Scop. zu sein, jedoch mit wenig wolligen Blütenköpfen.

XXI.39. »Carduus eriocephalus albo flore. Monspelii in horto Regio.» *Cirsium ferox* (L.) DC.

XXI.40. »Carduus eriocephalus Hispanicus spinis crassioribus horridus. In Pyrenæis, qua in Hispaniam declives sunt.» Dürfte *Cirsium eriophorum* (L.) Scop. sein. (Studien, p. 111.)

XXI.41. »Carduus tomentosus capitulo majore Bauh. Basileæ in horto Bauh.» *Echinops strigosus* L.

XXI.42. »Carduus tomentosus capitulo minore Bauh. Carduus argentatus Monspelii vocabatur. Florentiæ et Monspelii.» *Galactites tomentosa* Moench.

XXI.43. »Carduus tomentosus Pyrenaicus spinosissimus, flore albo. In Pyrenæis versus Hispaniam copiose nascitur.» *Carduus carlinoides* Gouan. (Studien, p. 111.)

XXI.44. »Spina alba tomentosa latifolia sylvestris Bauh. Acanthium vulgare flore purpureo Tab. Wegedistel. In Misnia, Bohemia, Bavaria, Dania.» *Onopordon acanthium* L.

XXI.45. »Spina tomentosa altera spinosior Bauh. Carduus vulgatissimus viarum Lob. Onopordum 1. Tab. Weiss Wegedistel. Passim.» *Carduus nutans* L.

XXI.46. »Spina tomentosa spinosior flore albo. In Thuringia.» *Carduus crispus* L.

XXI.47. »Acanthus sativus vel mollis Vergilii Bauh. Welsch Beernklauw. Florentiæ sponte.» *Acanthus mollis* L.

XXI.48. »Acanthus aculeatus Bauh. Lipsiæ in horto Deurlingi.» Ett blad af *Acanthus spinosus* L.

XXI.49. »Cinara hortensis foliis non aculeatis Bauh. Englische Artischocken. In hortis passim. Scolymus non aculeatus Tab.» *Cynara scolymus* L.

XXI.50. »Cinara hortensis aculeata Bauh. gemeine Artischoken. In hortis.» D:o.

XXI.51. »An Cinara syl. latifolia Bauh? an Carduus tomentosus peculiaris? Non longe Monspelio sponte.» *Onopordon illyricum* L.

XXI.52. »Scolymus chrysanthemos Bauh. Scolymus Theophrasti Tab. Monspelii et Florentiæ.» *Scolymus hispanicus* L.

XXI.53. »Scolymus Theophrasti Hispanicus Clus. Videtur omnino differre a præcedente, quoad magnitudine, caules, ramos, spinas, flores etc. licet Bauhinus aliter sentiat. Narbonæ in Gallia Narbonensi.» *Scolymus maculatus* L.

XXI.54. »Carduus spinosissimus latifolius sphærocephalus vulgaris Bauh. Carduus sylvestris Dod. In Bohemia, Bavaria &c.» *Carduus nutans* L.

XXI.55. »Carduus sylvestris idem, sed flore carneo. In Bavaria.» D:o.

XXI.56. »Idem Carduus syl. Dodonæi flore albo.» Florentiæ.» D:o.

XXI.57. »Carduus spinosissimus angustifolius vulgaris Bauh. Polyacantha Theophr. Tab. klein Wegedistel. In Bavaria &c.» *Carduus acanthoides* L., daneben ein kleines Exemplar von *C. crispus* L.

XXI.58. »Carduus spinosissimus angustifolius flore albo. In Bohemia.» *Carduus acanthoides* L.

XXI.59. »Carduus spinosissimus segetibus frequens Bauh. Est flore albido. In Bavaria &c.» D:o.

XXI.60. »Carduus lanceatus latifolius Bauh. Speerdistel. Passim.» *Cirsium lanceolatum* (L.) Scop.

XXI.61. »Dipsacus sativus Bauh. Labrum Veneris Matth. Weber kartten. In hortis Lusatiæ &c.» *Dipsacus fullonum* L., Mill.

XXI.62. »Dipsacus folio laciniato Bauh. Argentorati et Badenæ Austriæ.» *Dipsacus laciniatus* L.

XXI.63. »Dipsacus syl. aut Virga pastoris major Bauh. Wildt karttendistel. In Bavaria, Dania.» *Dipsacus silvestris* Huds.

XXI.64. »Dipsacus syl. capitulo minore vel Virga pastoris minor Bauh. klein wildt karttendistel. In Pyrenæis.» *Dipsacus pilosus* L.

XXI.65. »Eryngium maritimum Bauh. In Italia, Gallia Narbonensi, Dania.» *Eryngium maritimum* L.

XXI.66. »Eryngium vulgare Bauh. Manstreuw. Brankendistel. In Misnia, Bohemia, Gallia &c.» *Eryngium campestre* L.

XXI.67. »Eryngium montanum pumilum Bauh. Avenioni Gallor. et in Pyrenæis versus Hispaniam. klein Brankendistel.» *Eryngium Bourgati* Gouan.

XXI.68. »Eryngium montanum minimum, capitulo magno Bauh. Carduncellus montis Lupi Advers. In monte Lupi prope Monspelium.» *Carduncellus mitissimus* DC.

XXI.69. »Eryngium latifolium planum Bauh. blauwe Manstreuw. In Ungaria prope Rabam et Comonam.» *Eryngium planum* L.

XXI.70. »Eryngium arvense, foliis serræ similibus Bauh. Crithmum 4. Matth. Sichelmöhren. In Misnia, Helvetia.» *Falcaria vulgaris* Bernh.

XXI.71. »Carduus stellatus foliis papaveris erratici Bauh. Spinastella Tab. Sterndistel. Monspelii et Florentiæ.» *Centaurea calcitrapa* L.

XXI.72. »Carduus stellatus flore albo. Spinastella alba Tab. In Gallo-Provincia.» D:o.

XXI.73. »Carduus stellatus luteus, foliis Cyani Bauh. Spina solstitialis Dod. Monspelii et Florentiæ.» *Centaurea solstitialis* L.

XXI.74. »Carduus stellatus luteus folio minus incano, capitulo oblongiore, aculeis frequentioribus, sed minus crassis ac brevioribus armato. In monte Cetio prope Monspelium» *Centaurea melitensis* L. (Studien, p. 111.)

XXI.75. »Euphorbium Bauh. A d(omi)no Simone Pauli Med. cand.» Ein Stück Rinde einer dornigen *Euphorbia*, wahrscheinlich *E. officinarum* L.

XXI.76. »Tragacantha Bauh. &c. Brocksdorn. Massiliæ sponte.» *Astragalus tragacantha* L. var. *massiliensis* Lam.

XXI.77. »Tragacantha prout transplantata provenit. Nisi sit Tragacanthæ affinis lanuginosa sive Poterium Bauh? Vide Clus. hisp. Lutetiæ in horto.» D:o.

XXI.78. »Poterio affinis, foliis Pimpinellæ spinosis Bauh. Poterion Lob. Pisis in horto Magni Ducis.» *Poterium spinosum* L.

XXI.79. »Anonis spinosa flore purpureo Bauh. hauwhechel, Stallkrautt -krieg.(?) In Lusatia, Misnia, Helvetia, Bohemia, Dania.» *Ononis spinosa* L.

XXI.(79 bis). »Anonis spinosa purpurea. An differat a præcedente? In Italia.» D:o.

XXI.80. »Ononis Fratris aculeata, nominabatur a Monacho horti Præfecto. Pisis in horto Magni Ducis.» Ein blattloses Sprossystem mit opponierten, am Ende dornigen Zweigen einer Labiate?

XXI.81. »Anonis spinis carens purpurea Bauh. Prope Roschildiam et Holbecam aliisque locis Seelandiæ.» *Ononis arvensis* L.

XXI.82. »Anonis spinis carens, floribus lacteis. In Lusatia.» Wahrscheinlich *Ononis repens* L. × *spinosa* L.

XXI.83. a) »Anonis non spinosa flore luteo variegato Bauh. In Vallesia.» *Ononis natrix* L. b) »Anonis viscosa spinis carens lutea major Bauh. Natrix Plinii Herbarior. Lob. Monspelii sponte.» D:o.

XXI.84. »Anonis non spinosa lutea minor. Sed non Bauhini. An potius Trifolii species aut Cytisi? Monspelii sponte.» *Ononis minutissima* L. (Studien, p. 111.)

VOLUMEN XXII.

Horti sicci, seu stirpivm, studio et labore D. Ioachimi Burseri Camentio-Lusati, in Regia Nobilium Academia Sorana Medici et Physices Profess. publ. per diversas regiones et loca collectarum et iuxta seriem Pinacis Bauhiniani digestarum, Volumen XXII. continens Sectiones 1. 2. 3. 4. libri undecimi Pinacis prænominati.

XXII.1. »Cytisus incanus siliquis falcatis Bauh. Cytisus Maranthæ Lob. gehörnter geissklee. Florentiæ et Parisiis in hort.» *Medicago arborea* L.

XXII.2. »Cytisus incanus Creticus Bauh. Basileæ a Bauh.» *Ebenus cretica* L.

XXII.3. »Cytisus incanus folio oblongo Austriacus Bauh. In Ungaria, unde per semen in hortum transtuli.» *Cytisus austriacus* L.

XXII.4. »Cytisus incanus foliis latis, nigricantibus. An Cytisus incanus siliqua longiore Bauh? Non procul Gracia, Styriæ oppido.» Vegetativer Spross wahrscheinlich von *Cytisus supinus* L. oder *hirsutus* L.

XXII.5. »Cytisus foliis subrufa lanugine hirsutis Bauh. Prope Olbyam (Iëres) Gallo-Provinciæ.» Scheint *Cytisus supinus* L. zu sein.

XXII.6. »Cum præcedente idem, vel ei affinis. An Cytisus hirsutus flore luteo purpurascente Bauh. Florentiæ.» *Cytisus supinus* L.

XXII.7. »Cytisus supinus foliis incana lanugine inferne pubescentibus Bauh. In hort. Lusatiæ.» D:o.

XXII.8. »A præcedente differt foliorum exilitate. In GalloProvincia sponte.» D:o.

XXII.post 8. »Cytisus minoribus foliis, ramulis tenellis villosis Bauh. Ex horto Leydensi.» *Cytisus hirsutus* L.

XXII.9. »Cytisus glabris foliis subrotundis, pediculis brevissimis Bauh. Cytisus V rotundifolius Tab. In GalloProvincia.» *Cytisus sessilifolius* L.

XXII.10. »Idem cum præcedente videtur, quamvis foliorum pediculis prorsus careat. Basileæ in horto Heinzmanni.» D:o.

XXII.11. »Cytisus glaber nigricans Bauh. Cytisus I. Tabern. Geissklee. In Austria, Bohemia, Italia.» *Cytisus nigricans* L., blühend.

XXII.12. »An sit idem cum præcedente? Florentiæ.» D:o mit Früchten.

XXII.13. »Cytisus foliis incanis, angustis, quasi complicatis Bauh. Cytisus II. Clus. In monte Calcaris.» *Adenocarpus complicatus* (L.) Gay.

XXII.14. »Anagyris foetida Bauh. Florentiæ sponte. Monspelii in horto Regio.» *Anagyris foetida* L.

XXII.15. »Anagyris non foetida major vel alpina Bauh. Baumbonen. In Valle umbrosa Italiæ sponte. Basileæ et Francofurti ad Mænum in hortis.» *Laburnum vulgare* Griseb.

(XXII.15 bis). »Anagyris major cum fructu. Nisi sit minor. In hortis.» D:o mit Früchten.

XXII.16. »Acacia foliis Scorpioides leguminosæ Bauh. Basileæ accepi a Reuchenio, qui Patavio attulerat.» Ein kleines Ästchen, von Blättern nur wenig übrig, vielleicht von *Acacia nilotica* (L.) Del.

XXII.17. »Acacia trifolia Bauh. „Florentiæ in horto Magni Ducis. Egyptischer Schottendorn.» *Calycotome spinosa* (L.) Link.

XXII.18. »Acaciæ speciem volebat Iungermannus. Est Cytisus aliquis. Monspelii in horto Regio.» *Cytisus monspessulanus* L.

XXII.19. »Aspalathus albicans torulo citreo Bauh. Lignum rhodium. Rosenholtz. Parisiis in officinis seplasiar.» Holzstücke, wahrscheinlich von *Convolvulus scoparius* L. oder *floridus* L.

XXII.20. »Santalum album Bauh. Weisser Santel. In officinis pharmacopæor.» Holzstücke von *Santalum album* L.

XXII.21. »Santalum pallidum Bauh. gelber Sandel. Apud pharmacopolas.» D:o.

XXII.22. »Santalum rubrum Bauh. Rother Sandel. In officinis pharmacopæor.» Holzstücke von *Pterocarpus* spec.

XXII.23. »Genistaspartium spinosum maius I. flore luteo Bauh. Scorpius I. Tabern. In GalloProvincia.» *Genista scorpius* (L.) DC.

XXII.24. »An sit Genistaspartium? an potius Spartium triphyllon Bauh? Florentiæ in horto: ea quæ est a sinistris: altera in horto Pisano Magni Ducis.» *Genista radiata* (L.) Scop.

XXII.25. »Genista spinosa major, brevibus aculeis Bauh. Nepa Theophrasti Tab. In GalloProvincia.» Oben ein vegetativer Zweig eines *Ulex*, unten *Ulex parviflorus* Pourr.

XXII.26. »Genista spinosa major longioribus aculeis Bauh. Scorpius I. Clus. Scorpionkrautt. Intra Lugdunum et Lutetiam.» *Ulex europaeus* L.

XXII.27. »Genista spinosa major, mediocribus sed densissime iunctis aculeis, fructu non in summitate sed circa medium caulium vel ramorum posito &c. Non longe Aureliis Gallor.» *Ulex nana* Sm. (Studien, p. 112.)

XXII.28. »Genista spinosa minor leptophyllos. an Genista minor Aspalathoides Bauh. Inter Lugdunum et Lutetiam.» *Genista anglica* L.

XXII.29. »Genista spinosa minor Germanica Bauh. Genistella aculeata Lob. Stechende pfrimmen. In Bohemia.» *Genista germanica* L.

XXII.30. »Folia habet angustiora, carnosioraque quam præcedens, eaque inter spinas posita, secus ac illa &c. In monte Calcaris.» *Genista anglica* L., vegetative Sprosse.

XXII.31. a) »Genista spinosa minor Hispanica villosissima Bauh. Monspelii.» *Genista hispanica* L. b) »N. 6ta. an Chamægenista foliis genistæ vulgaris? a Simone Pauli.» Unbestimmbare Reste.

XXII.32. »Genista angulosa et scoparia Bauh. pfrimmen. In Misnia, Lusatia, Bohemia.» *Sarothamnus scoparius* (L.) Koch.

XXII.33. »Videtur eadem cum p(ræ)cedente. Nisi sit Cytisus. In Italia.» D:o.

XXII.34. »Genista tinctoria Germanica Bauh. Ferula Tragi. ferbeblumen. In Lusatia, Misnia, Helvetia.» *Genista tinctoria* L.

XXII.35. »Genistæ species, foliolis dense compositis &c. In Italia.» *Genista tinctoria* L. (Stud. p. 112.)

XXII.36. »Chamægenista, foliis Genistæ vulgaris Bauh. Genistella Pannonica Tabern. Erdtpfrimmen. In GalloProvincia.» *Genista pilosa* L., blühend.

XXII.37. »Cum præcedente convenit. In Helvetia.» D:o mit Frucht.

XXII.38. »Chamægenista sagittalis Bauh. Chamæspartium Tabern. In Suevia, Helvetia, Austria.» *Genista sagittalis* L.

XXII.39. »Spartium arborescens, seminibus lenti similibus Bauh. Genista transalpina Cam. Welsche pfrimmen. In GalloProvincia et Italia.» *Spartium junceum* L.

XXII.40. »Spartium alterum monospermon semine reni simili Bauh. Spanisch pfrimmen. Florentiæ.» *Genista monosperma* (L.) Lam.

XXII.41. »Colutea vesicaria Bauh. Schafflinsen. Welsche Schotten. Wilde Senesbletter. In hortis Misniæ, Daniæ. In Valle umbrosa Italiæ sponte. q(ui)d(e)m et in Gallia Narbonensi.» *Colutea arborescens* L.

XXII.42. »Colutea siliquosa sive scorpiodes major Bauh. Monspelii in horto Regio.» *Coronilla glauca* L.

XXII.43. »Colutea siliquosa minor Bauh. Colutea scorpioides humilior Clus. In Thuringia, GalloProvincia.» *Coronilla emerus* L.

XXII.44. »Colutea siliquosa minor coronata Bauh. In Thuringia. Habet folia, quam p(ræ)cedens, latiora, siliquas breviores, pluresque simul iunctas.» *Coronilla coronata* L.

XXII.45. »An hæc sit potius Colutea siliquosa minor coronata Bauh? In alpibus Austriæ sup(er)ioris.» *Coronilla vaginalis* Lam.

XXII.46. »An Colutea scorpiodes maritima glauco folio Bauh? Florentiæ.» *Coronilla valentina* L.

XXII.47. »Senna Alexandrina sive foliis acutis Bauh. Senesbletter. A parente.» Vegetative Sprosse, wie es scheint, von *Cassia lanceolata* Forsk.

XXII.48. »Barba Iovis Bauh. Florentiæ et Parisiis in hort.» *Anthyllis barba Jovis* L.

XXII.49. «Iasminum vulgatius flore albo Bauh. Weiss Veijelreben. Florentiæ. Gelsemium vulgatius Lob.» *Jasminum officinale* L.

XXII.50. »Iasminum humilius luteum Bauh. geel Veijelreben. Basileæ in horto Heinzmanni.» *Jasminum humile* L.

XXII.51. »Iasminum humilius magno flore Bauh. Gelsemium Catalonicum Camer. Florentiæ in hortis.» *Jasminum grandiflorum* L.

XXII.52. »Iasminum luteum vulgo dictum bacciferum Bauh. Pelemonium Monspeliens. Lob. Ruta baccifera sive trifolia Tab. Beer Rauthe. Monspelii sponte.» *Jasminum fruticans* L.

XXII.53. »Iasminum Millefolii folio Bauh. Quamoclit Cam. Florentiæ in horto Magni Ducis.» *Quamoclit vulgaris* Chois.

XXII.54. »Syringa cærulea Bauh. Syringa Lusitanica Tabern. Spanischer Syringsbaum. In hortis Misniæ, Helvetiæ, Daniæ &c.» *Syringa vulgaris* L.

XXII.55. »Syringa alba sive Philadelphus Athenæi Bauh. Syringa Italica Lob. Syringsbaum. In hortis passim.» *Philadelphus coronarius* L.

XXII.56. »Lentiscus vulgaris Bauh. Mastixbaum. Florentiæ et Monspelii sponte.» *Pistacia lentiscus* L. (mit Gallen).

XXII.57. »Lentiscus Peruana Bauh. Molle Clusii. Dedit Bauhinus.» *Schinus molle* L.

XXII.58. »Terebinthus vulgaris Bauh. Terpentinbaum. Monspelii sponte.» *Pistacia terebinthus* L.

Auf einen besonderen Zettel har Burser geschrieben: »Folia quæ excrescentiæ cornutæ muscarum plenæ.» Daneben Gallen.

XXII.59. »Carpobalsamum nigrum Alexandrinum Bauh. In officinis pharmaceuticis.» Früchte (einer Pistacia?).

XXII.60. »Pistacia peregrina fructu racemoso Bauh. Welsche Pimpernüss-

lein. Norimbergæ et Florentiæ in hortis.» Junge Zweige, vielleicht von *Pistacia vera* L.

XXII.61. »Pistacia sylvestris Bauh. Staphylodendrum Lob. Wilde Pimpernüsslein. Basileæ sponte.» *Staphylea pinnata* L.

XXII.62. »Siliqua esulis Bauh. Ceratia siliqua Tab. Iohannsbrodt. Florentiæ et Lipsiæ in hortis.» Ein Blatt von *Ceratonia siliqua* L. und eines von einer anderen Pflanze (Pistacia?).

XXII.63. »Siliqua syl. rotundifolia Bauh. Arbor Iudæ Tab. Wildt Iohannsbrodt. Iudasbaum. Monspelii sponte.» *Cercis siliquastrum* L.

XXII.64 »Nux moschata fructu rotundo Bauh. Muscatnuss. Apud Seplasiarios.» Samenkern von *Myristica fragrans* Houtt.

XXII.65. »Macis Officinarum Bauh. Muscatenblumen. In officinis seplasiariorum.» Arillus derselben Art.

XXII.66. »Cinamomum sive Canella Bauh. Zimmetrinden. Cannel. In Officinis pharmacopæor. &c.» Rinde von *Cinnamomum* sp.

XXII.67. »Cadegi Indi (id est) folium Indum Bauh. Malabathrum Matth. A parente.» Ein Blatt, wie es scheint, von *Cinnamomum zeylanicum* Breyn.

XXII.68. »Caryophyllus aromaticus fructu oblongo Bauh. Neglin. Kramernelken. Apud Seplasiarios.» *Caryophyllus aromaticus* L., Gewürznelken.

XXII.69. »Piper rotundum nigrum Bauh. Pfeffer. Apud Seplasiarios.» *Piper nigrum* L., schwarzer Pfeffer.

XXII.70. »Piper rotundum album Bauh. Weisser Pfeffer. In Officinis pharmacopæor.» D:o, weisser Pfeffer.

XXII.71. »Piper longum Orientale Bauh. langer Pfeffer. Apud pharmacopolas.» *Piper longum* L.

XXII.72. »Cubebæ vulgares Bauh. Cubeben. In pharmacopoliis.» Früchte, wie es scheint, von *Piper cubeba* L. fil.

XXII.73. »Amomum racemosum Bauh. A parente.» Ein Blatt, In der Form *Ribes alpinum* recht ähnlich.

XXII.74. »Grana Paradisi Officinar. Bauh. Paradisskörner. In Officinis pharmacopæorum.» Nur spärliche Reste von Früchten.

XXII.75. »Cardamomum simp(lici)ter in officinis dictum Bauh. Cardamömlin. Apud pharmacopolas.» Früchte und Samen von *Elettaria cardamomum* (Roxb.) Mat.

XXII.76. »Rhus foliis Ulmi Bauh. Rhus Sumach Tab. gerberbaum. Monspelii, et Florentiæ sponte.» *Rhus coriaria* L.

XXII.77. »Rhus angustifolium Bauh. Pharmacopæus Parisiensis ex Brassilia attulit. Puto nil aliud esse quam Sorbum.» *Rhus glabra* L. (Studien, p. 112.)

XXII.78. »Rhus myrtifolia Monspeliaca Bauh. Monspelii et in Italia.» *Coriaria myrtifolia* L.

XXII.79. 2 Exemplare: 1) »Rhus Myrtifolia Belgica Bauh. Gagel Germanor. Advers. Post. Porss. Ex Belgio misit D. Weckerlinus Argentinas. Nascitur et(iam) in Seelandia Danorum.» *Myrica gale* L. 2) »Rhus Myrtifolia a suo vicino vix differens. Apud Toupinambaultios legit Pharmacopæus q(ui)dam Parisinus mihique co(mmun)icavit.» Auch *Myrica gale* L.

XXII.post 79. »Eadem cum præcedente, prout in Seelandia provenit non procul ab Academia Sorana.» D:o.

XXII.80. »Suffrutex Halymi specie. Non potui hactenus resciscere quid esset. In finibus Moraviæ, inter pagum Gunderssdorff et oppidum Znaim secus viam in

colliculo.» *Eurotia ceratoides* (L) C. A. Mey. C. F. Nyman, Consp. Fl. Europ.: »olim in Moravia».

XXII.81. »Cotinus Bauh. Coccygria Tab. In Comitatu Tyrolense sponte.» *Rhus cotinus* L.

XXII.82. »Sorbus sativa Bauh. Sperbirnen. Speyerling. Monspelii, Florentiæ. In Bohemia.» *Sorbus domestica* L.

XXII.83. »Sorbus sylvestris, foliis domesticæ similibus Bauh. Wilder Sperberbaum. Eybischbeer. Vogelbeer. In Lusatia, Misnia, Bohemia, Helvetia, Dania &c. Sorbus aucuparia Clus.» *Sorbus aucuparia* L.

XXII.84. »Arbor Fraxini folio, flore cæruleo Bauh. Pseudosycomorus, Azedareth Tab. Weiss Brustbeerlin. Monspelii, et Florentiæ in hort.» *Melia azedarach* L.

XXII.85. »Fraxinus excelsior Bauh. Asche. Aschbaum. In Germania, Dania, Gallia.» Ast mit Früchten, scheint *Fraxinus oxycarpa* Willd. zu sein.

XXII.86. »Fraxinus flore muscoso. An Fraxinus humilior Bauh. quia non ita alte excrescebat. In Lombardia, et Genuæ.» *Fraxinus ornus* L.

XXII.post 86. »Nux iuglans sive Regia vulgaris Bauh. Welscher Nussbaum. In hortis passim.» *Juglans regia* L.

XXII ante 87. »Nux iuglans Americana. Hoc nomine accepi ex horto Lugdunensi.» Ein junges blatt, v elleicht von *Juglans cinerea* L.

XXII.87. »Corylus sativa fructu oblongo rubente Bauh. Lampertische haselnuss staude. In hortis Lusatiæ, Misniæ &c.» Vegetativer Ast eines *Corylus*, vielleicht *C. maxima* Mill.

XXII.88. »Corylus sylvestris Bauh. gemeine Haselstaude. In Germania, Dania, Helvetia.» *Corylus avellana* L.

XXII.89. »Avellana peregrina humilis Bauh. Avellana Bizantina Tab. Constantinopolitanisch Haselstaude. Francofurti ad Mænum in horto pharmacopæi Ioh. Mülleri. Non erat humilior vulgari, ubi colligebam.» Vielleicht *Corylus colurna* L.

XXII.90. »Castanea sylvestris Bauh. Castanienbaum. In montibus GalloProvinciæ et Italiæ. In Appennino legi Ao 1610.» *Castanea sativa* Mill.

XXII.91. »Castanea folio multifido Bauh. Castanea equina Tab. Lob. Ross Castanien. Florentiæ in horto Magni Ducis.» *Aesculus hippocastanum* L.

XXII.92. »Fagus Bauh. Buchbaum. Passim.» *Fagus silvatica* L.

XXII.93. »Quercus cum longo pediculo Bauh. Eichbaum. Passim.» *Quercus pedunculata* Ehrh.

XXII.94. »An Quercus vulgaris florens? Monspelii.» Blühender Ast mit sehr jungen Blättern, vielleicht *Quercus lanuginosa* Lam.

XXII.95. »Quercus calyce echinato, glande majore Bauh. Cerrus Clus. Florentiæ, Pisis &c.» *Quercus cerris* L.

XXII.96. »Quercus calyce hispido, glande minore Bauh. Cerris Plinii 2:a Tab. Florentiæ.» D:o, mit tiefer gelappten Blättern.

XXII.97. »An Quercus foliis muricatis non lanuginosis Bauh? Prope Hippolytum Austriæ.» *Quercus cerris* L.

XXII.98. »An Quercus foliis muricatis minor Bauh. Prope Badenam Austriæ inferioris.» D:o.

XXII.99. »An Quercus humilis, gallis binis, ternis etc. Bauh? Hippolyti Austriæ inferioris.» Dürfte *Quercus lanuginosa* Lam. sein.

XXII.100. »Quercus humilior alia. Hippolyti.» *Quercus cerris* L.

XXII.101. »Viscum baccis albis Bauh. Mistel. In Germania, Dania &c.» *Viscum album* L.

XXII.102. »An Phellodrys candicans latifolia, molliter aculeata Bauh? Florentiæ.» *Quercus ilex* L. oder *suber* L.

XXII.103. »An Phellodrys candicans angustifolia serrata Bauh. Convenit cum figura Phyllireæ 1:æ Clus. hist. Monspelii.» Dürfte eine Form von *Quercus suber* L. sein.

XXII.104. »Suber latifolium, perpetue virens Bauh. Pantoffelholtz. Monspelii, Florentiæ.» Scheint zwei verschiedene Formen von *Quercus suber* L. zu sein.

XXII.105. »Suber angustifolium non serratum Bauh. In Italia.» Dürfte *Quercus ilex* L. sein.

XXII.106. »Habet folia paullo longiora quam præcedens, et nonnihil dentata. Florentiæ.» *Quercus ilex* L. mit Frucht.

XXII.107. »Estne idem cum præcedente? Monspelii.» Scheint *Quercus ilex* zu sein.

XXII.108. »Ilex folio rotundiore etc. Bauh. Ilex major Clus. grosse Steineiche. Monspelii.» *Quercus ilex* L. mit männlichen Blüten.

XXII.109. »Ilex major cum glande. Monspelii.» D:o mit Früchten.

XXII.110. »Estne eadem cum antecedente? Monspelii.» D:o d:o.

XXII.111. »Ilex major cum cocco. Abundabat cocco, qui paullatim decidit. In monte Cetio prope Monspelium.» *Quercus ilex* L.

XXII.112. »Ilex sine spinis Matth. q(ui) eius mentionem facit. In monte Lupi prope Monspelium.» *Quercus coccifera* L. f. *integrifolia*.

XXII.113. »Ilex aculeata cocciglandifera Bauh. Stecheyche. Florentiæ et in Gallia Narbon.» *Quercus coccifera* L.

XXII.114. »Ilex aculeata baccifera folio sinuato Bauh. Aquifolium Matth. Tab. Stechbaum. Stechapffel. In Helvetia ut in monte Wasserfall sponte. q(ui)d(e)m et in Fionia.» *Ilex aquifolium* L.

VOLUMEN XXIII.

Horti sicci, seu stirpivm, studio et labore D. Ioachimi Burseri Camentio-Lusati, in Regia Nobilium Academia Sorana Medici et Professoris Phys. publ. per diversas regiones et loca collectarum et secundum seriem Pinacis Bauhiniani digestarum Volumen XXIII. continens Sectionem 5. et 6. libri undecimi Pinacis illius.

XXIII.1. »Tilia fæmina folio majore Bauh. lindenbaum. In Germania, Dania &c.» *Tilia cordata* Mill.

XXIII.2. »Ulmus campestris Bauh. Ulmen, Rüssbaum. Passim.» *Ulmus scabra* Mill.

XXIII.3. »Ulmus montana Bauh. fliegenbaum appellabatur. In montibus Misniæ.» Auch *Ulmus scabra* Mill.

XXIII.4. »Ulmus quando primum ex semine prodit. In Bohemia &c.» Keimpflanze von *Ulmus*.

XXIII.5. »Sunt, credo, flores Ulmi. Florentiæ.» Blühender Zweig von *Ulmus foliacea* Gilib. (*glabra* Mill.).

XXIII.6. »Ostrya Ulmo similis, fructu in umbilicis foliaceis Bauh. Carpinus Tab. Lob. Spindelbaum. Monspelii. et in Dania.» *Carpinus betulus* L.

XXIII.7. »Betula Bauh. Birckbaum. In Germania, Dania &c.» *Betula verrucosa* Ehrh.

XXIII.(7 b). »Betula humilis rotundifolia D. Ottonis Sperlingii qui ex Norwegia attulit et co(mmun)icavit.» *Betula nana* L. (Studien, p. 112.)

XXIII.8. »Alnus rotundifolia glutinosa viridis Bauh. Alnus vulgaris Clus. Erlenbaum. In Germania, Dania &c.» *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn.

XXIII.9. »Alnus folio incano Bauh. In Helvetia.» *Alnus incana* (L.) Moench.

XXIII.10. »Alnus alpina minor Bauh. In Austria superiori, unde Bauhino transmisi.» *Alnus viridis* (Chaix) DC.

XXIII.11. »Alnus nigra baccifera Bauh. Frangula Tab. Schissbeerbaum. faulbaum. In Lusatia, Misnia, Bohemia. Dania.» *Rhamnus frangula* L.

XXIII.12. »Frangula florens. Passim.» D:o.

XXIII.13. »Alnus nigra pumila alpina. An Alnus nigra pumila Thalii. In alpibus Vallesiæ et Austriæ superioris. Non excrescebat altius palmo.» *Rhamnus pumila* L.

XXIII.14. »An Alnus nigra polycarpos Bauh. Monspelii in horto Regio.» *Rhamnus alpina* L.

XXIII.15. »Similis præcedenti. Monspelii sponte.» *Rhamnus alaternus* L.

XXIII.16. »Evonymus vulgaris, granis rubentibus Bauh. Spindelbaum. tzweckholtz. In Lusatia, Bohemia, Dania &c.» *Evonymus europaeus* L.

XXIII.17. »Evonymus granis nigris Bauh. Evonymus Pannonicus Tab. A parente.» *Evonymus verrucosus* Scop.

XXIII.18. »Viburnum Bauh. In Bavaria, Italia, Dania.» *Viburnum lantana* L.

XXIII.19. »Populus alba majoribus foliis Bauh. Weiss Pappelbaum. In Lusatia, Alsatia &c.» *Populus alba* L.

XXIII.20. »Populus nigra Bauh. Pappelweiden. Alberbaum. In Lusatia, Misnia. Dania &c.» *Populus nigra* L.

XXIII.21. »Populus tremula Bauh. Populus Lybica Matth. In Lusatia, Misnia, Helvetia Dania &c.» *Populus tremula* L.

XXIII.22. »Gossipium frutescens semine albo Bauh. Baumwolle. Monspelii in horto portatili apud Laur. Calelanum pharmacop.» *Gossypium* sp.

XXIII.23. »Gossipium arboreum caule lævi Bauh. Dedit Bauhinus.» Blattfragment von *Gossypium*.

XXIII.24. »Acer montanum candidum Bauh. Acer major Lob. Ahorn. In Misnia, Bohemia, Helvetia, Dania.» *Acer pseudo-platanus* L.

XXIII.25. »Acer montanum tenuissimis et acutis foliis Bauh. In montibus Misniæ. Et in Seelandia.» *Acer platanoides* L.

XXIII.26. »Acer campestre et minus Bauh. Acer minor Dodon. Massholtter. In GalloProvincia. Lusatia, Dania.» *Acer campestre* L.

XXIII.27. »Acer trifolia Bauh. Monspelii.» *Acer monspessulanum* L.

XXIII.28. »Plantanus Bauh. &c. fremb Ahorn. Florentiæ.» *Platanus orientalis* L.

XXIII.29. »Arbor ex Florida Ficulneo folio Bauh. Sassafras. In officinis Seplasiarior.» Rindenstücke, wie es scheint von *Sassafras officinale*.

XXIII.30. »Ricinus vulgaris Bauh. Wunderbaum. In hortis Helvetiæ, Misniæ, Daniæ &c.» *Ricinus communis* L.

XXIII.31. »Malus arbor Bauh. Apffelbaum. In hortis.» *Pyrus malus* L.

XXIII.32. »Mala cotonea minora Bauh. Quitten. In hortis passim.» *Cydonia vulgaris* Pers.

XXIII.33. »Mala cotonea majora Bauh. In hortis Bohemiæ, Austriæ.» Vegetativer Spross, vielleicht von *Cydonia vulgaris* var. *lusitanica* Pers.

XXIII.34. »Malus limonia Bauh. limonen. Citronen. Florentiæ, Lipsiæ, Basileæ in hortis.» *Citrus medica* L., Cedrat.

XXIII.35. »Malus Arantia major Bauh. Pomerantzen. Monspelii, Florentiæ &c. in hort.» *Citrus aurantium* L. ssp. *amara* L., Pomeranze.

XXIII.36. »Malus punica sativa Bauh. Granaten. Granatäpffel. Monspelii, Florentiæ, Lipsiæ, Dresdæ in hortis.» *Punica granatum* L.

XXIII.37. »Pyrus sativa Bauh. Birnbaum. In hortis.» *Pyrus communis* L.

XXIII.post 37. »Pyra maxima sive decumana. Coluntur in hortis Rostochii.» D:o.

XXIII.38. »Persica molli carne et vulgaris Bauh. pfirsing. In hortis Bohemiæ et aliis.» Vegetativer Spross, wohl von *Prunus persica* (L.) S. & Z.

XXIII.39. »Amygdalus sativa Bauh. Mandeln. Mandelkern. In hortis Italiæ, Galliæ, Germaniæ, Daniæ.» *Prunus communis* (L.)

XXIII.(39 b). »Amygdalus cum fructu. In hortis passim.» D:o.

XXIII.40. »Mala Armeniaca majora Bauh. Abricothen. Florentiæ.» Vegetativer Spross, wahrscheinlich von *Prunus armeniaca* L.

XXIII.post 40. »Malus Armeniaca minor Bauh. In hortis Misniæ, Bohemiæ &c.» Wie vorige, aber mit schmaleren Blättern.

XXIII.41. »Prunus Bauh. Pflaumbaum. In hortis.» *Prunus domestica* L.

XXIII.post 41. »Prunus flore pleno. Ex horto Lugdunensi.» D:o.

XXIII.ante 42. »Prunus fructu rotundo nigropurpureo dulci Bauh. Prunus Myrobalanus Clus. Ex horto Medico, qui est Lugduni Batavor.» Vegetative Sprosse, vielleicht von *Prunus cerasifera* Ehrh.

XXIII.42. »Prunus sylvestris Bauh. Schlehen. In Lusatia, Misnia, Helvetia, Dania.» *Prunus spinosa* L.

XXIII.43. »Myrobalani maximi oblongi angulosi Bauh. Myrobalani Chebulæ Tab. In Officinis pharmaceuticis.» Halbierte Früchte von *Terminalia chebula* Retz.

XXIII.44. »Myrobalani teretes citrini Bauh. Myrobalani flavæ, citrinæ, luteæ Tab. In Officinis pharmacop.» D:o.

XXIII.45. »Myrobalani rotundæ belliricæ Bauh. In pharmacopoliis.» Halbierte Früchte von *Terminalia bellerica* Roxb.

XXIII.46. »Myrobalani nigræ octangulares Bauh. Myrobalani Indicæ Tab. In Officinis.» Unreife Früchte von *Terminalia chebula* Retz.

XXIII.47. »Myrobalani Emblicæ Bauh. Apud pharmacopolas.» Früchte von *Phyllanthus emblica* L.

XXIII.48. »Sebestena domestica Bauh. Sebesten, Myxa, vel Myxaria Tab. Apud Seplasiarios.» Stücke vom Ektokarp von *Cordia myxa* L.

XXIII.49. »Iuiubæ majores oblongæ Bauh. Zizypha Matth. Brustbeerlin. Florentiæ et Monspelii in hort.» Früchte von *Zizyphus vulgaris* Lam.

XXIII.50. »Iuiuba sylvestris Bauh. Florentiæ sponte, q(ui)d(e)m et Monspelii in fossis urbis.» D:o.

XXIII.51. »Cornus hortensis (darüber:) sylvestris mas Bauh. Horlitzen. Cornelbaum. Romæ et Ingolstadii sponte.» *Cornus mas* L.

XXIII.52. »Cornus fæmina Bauh. Virga sanguinea Matth. Hartriegel. In Bohemia, Bavaria, Dania.» *Cornus sanguinea* L.

XXIII.53. »Lotus fructu Cerasi Bauh. Lotus arbor Lob. In montibus Tyrolensibus et Gallia Narbonensi.» *Celtis australis* L.

XXIII.54. »Lotus Africana latifolia Bauh. Guajacum Patavinum Lob. Zürgelbaum. Florentiæ (ubi fructum ferebat) et Monspelii in hortis.» *Diospyros lotus* L.

XXIII.55. »Guajacum magna matrice Bauh. frantzosenholtz. Est cortex et lignum. In officinis.» Holz- und Rindenstücke, wie es scheint von *Guajacum officinale* L.

XXIII.56. »Cerasa sativa Bauh. Kirschen. Kirschbeer. In hortis.» *Prunus cerasus* L.

XXIII.57. »Cerasus hortensis pleno flore Bauh. Heidelbergæ in horto.» Do, f. fl. pleno.

XXIII.58. »Cerasus folio laurino Bauh. Laurocerasus Clus. Florentiæ in hortis.» *Prunus laurocerasus* L., nur ein Fragment übrig.

XXIII.59. »Cerasus pumila Bauh. Prope Hippolytum et Cremsam Austriæ. Item in Bohemia non longe a Thermis Carolinis.» *Prunus fruticosa* Pall. (*chamaecerasus* Jacq.).

XXIII.60. »Cerasus racemosa hortensis Bauh. Cerasa unex pediculo plura Lob. Francofurti ad Mænum in horto Ioh. Mülleri pharmacopæi.» *Prunus avium* L.

XXIII.61. »Cerasus racemosa syl., fructu non eduli Bauh. Oelbaum. Olandtbaum. Elpen. in Austria, Misnia, Dania.» *Prunus padus* L.

XXIII.62. »Ceraso affinis Bauh. Mahaleb Matth. Lob. Monspelii in horto Regio. In Vallesia sponte.» *Prunus mahaleb* L.

XXIII.63. »Mahaleb cum floribus. Monspelii in horto Regio.» D:o.

XXIII.64. »Chamæcerasus alpina, fructu rubro gemino, duobus punctis notato Bauh. Periclymenum rectum Tab. Auffrecht Zeunling. In Bohemia.» *Lonicera xylosteum* L.

XXIII.65. »Videtur idem cum præcedente, nisi quod fructus pediculo destitutus. In Austria.» D:o.

XXIII.66. »Chamæcerasus alpina fructu nigro gemino Bauh. Periclymenum rectum 2. Sabaudicum Tab. In Bohemia, Lusatia.» *Lonicera nigra* L.

XXIII.67. »Sitne idem cum præcedente? In summitate Taureri Rastadiensis.» *Lonicera coerulea* L.

XXIII.68. »Chamæcerasus montana, fructu singulari cæruleo Bauh. In Helvetia prope oppidum Einsidel.» D:o.

XXIII.69. »Chamæcerasus dumetorum fructu gemino rubro Bauh. Xylosteum Dod. In monte Helvetiorum Wasserfall.» *Lonicera alpigena* L.

XXIII.70. »Idem Chamæcerasus cum fructu. Ibidem.» D:o.

XXIII.71. »Styrax folio Mali cotonei Bauh. Storax. In GalloProvincia non procul Massilia copiosissime.» *Styrax officinale* L.

XXIII.72. »Alni effigie folio lanato maior Bauh. Aria Theophrasti Tab. Wilder Sperberbaum. In Muteto Basileensi et in GalloProvincia.» *Sorbus aria* (L.) Cr.

XXIII.73. »Alni effigie lanato folio minor Bauh. Amelanchier Gallor. Lob. Prope Fontainobelleau Galliæ, et in Languedocia.» *Amelanchier vulgaris* Moench.

XXIII.74. »Cotoneaster folio oblongo serrato Bauh. In alpibus Austriæ et Pyrenæis.» *Sorbus chamaemespilus* (L.) Cr.

XXIII.75. »Cotoneaster folio rotundo non serrato Bauh. Prope Pfortam, scholam Electoralem in Misnia. Item in Styria.» *Cotoneaster tomentosa* (Ait.) Lindl.

XXIII.76. »Idem cum præcedente, quamvis foliis ludat. Prope montem Gletzscher, in Valle Augusta, et in Pyrenæis.» *Cotoneaster integerrima* Medik.

VOLUMEN XXIV.

Horti sicci, seu stirpivm studio et labore D. Ioachimi Burseri Camentio-Lusati, in Regia Nobilium Academia Sorana Medici, et Physices professoris publici per diversas regiones et loca collectarum et secundum seriem Pinacis Bauhiniani digestarum Volumen XXIV, continens Sectiones tres priores libri duodecimi Pinacis illius.

XXIV.1. »Mespilus Germanica folio laurino non serrato, sive Mespilus sylvestris Bauh. Mispeln. Nespeln. In Comitatu Tyrolensi sponte. An sit Mespilus Italica folio laurino serrato Bauh.» *Mespilus germanica* L.

XXIV.post 1. »Mespilus folio laurino major Bauh. Mespilus domestica Lob. grosse Mispeln. In horto.» Vegetativer Spross ders. Art.

XXIV.2. »Mespilus Italica folio laurino serrato Bauh. In hortis Italiæ.» D:o?

XXIV.3. »Mespilus Apii folio laciniato Bauh. Mespilus Aronia Tab. Welsch Nespelbaum. Florentiæ et Monspelii.» *Crataegus azarolus* L.

XXIV.4. »Mespilus Apii folio sylvestris, non spinosa, sive Sorbus torminalis Bauh. Aschrösel. Alandtsbeer. In Bohemia et Muteto Basileensium sponte.» *Sorbus torminalis* (L.) Cr.

XXIV.5. »Sorbus alpina folio sinuato vel laciniato. Fructus minor est quam in Sorbo torminali. In horto Herloviano Seelandiæ visantur(?) duæ arbores prægrandes ante multos annos consitæ et haud dubie e Norwegia vel aliunde asportatæ. Fructus maturus colore, magnitudine, ac fere e(tiam?) figura et sapore, similis est fructui Oxyacanthæ, paulo tamen oblongior (ut in Sorbo torminali) et gratior, includens singula, raro bina semina, non dura, nec pyrorum seminibus multum absimilia.» *Sorbus suecica* (L.) Krok. (Studien, p. 113.)

XXIV.ante pag. 6. »Sorbus centauroides D. Ottonis Sperlingii, qui in Norwegia lectum co(mmun)icavit. Videtur idem cum p(ræ)cedente.» Scheint dieselbe Art zu sein. (Studien, p. 113.)

XXIV.6. »Sorbus torminalis Brasiliana Sambuci aquaticæ foliis. Ita interim nominare libet. Apud Toupinambaultios legit pharmacopæus quidam Parisiensis.» Eine *Physocarpus*, vielleicht *capitata* (Pursh) Kuntze. (Studien, p. 113.)

XXIV.7. »Mespilus Apii folio sylvestris spinosa, sive Oxyacantha Bauh. Spina appendix Clus. Meelhosen. Hagendorn. Passim.» *Crataegus monogyna* Jacq.

XXIV.8. »Oxyacantha Dioscor. sive Spina acuta Pyri folio Bauh. Pyracantha Advers. In Comitatu Tyrolensi ad rivum in sabulo.» *Pyracantha coccinea* Roem.

XXIV.9. »Berberis dumetorum Bauh. Saurach. Berbersbeer. Weinlegel. In Bavaria et Helvetia sponte. Oxyacantha Galeni Tab.» *Berberis vulgaris* L.

XXIV.10. »Grossularia simplici acino, vel spinosa sylvestris Bauh. Uva spina Matth. Stichelbeer. In Helvetia sponte p(ro)pe Soledurnum.» *Ribes grossularia* L.

XXIV.(10 bis). »Uva spina baccis cæruleis ex h. n.» D:o. (h. n. = horto nostro?).

XXIV.11. »Grossularia multiplici acino sive non spinosa hortensis rubra, sive Ribes officinarum Bauh. St. Johannsbeer. In hortis passim.» *Ribes rubrum* L.

XXIV.12. »Grossularia vulgaris fructu dulci Bauh. Monspelii in horto Regio.» *Ribes alpinum* L.

XXIV.13. »Grossularia syl. rubra Bauh. Ribes sylvestris Matth. In montibus Misniæ, Bohemiæ.» *Ribes alpinum* L. (Studien, p. 113.)

XXIV.14. »Ribes montana Oxyacanthæ sapore Bauh. in Prodr. Estne eadem cum

p(ræ)cedente? quæ tamen multo altius excrescebat. In Vallesia secus viam, unde Bauhino attuli.» D:o.

XXIV.15. »Habet folia latiora, eratque sterilis. In Pyrenæis.» *Ribes petraeum* Wulf., vegetativer Zweig.

XXIV.16. »Grossularia non spinosa fructu nigro Bauh. Ribes nigra Tab. Gichtbaum. Schwartze Johannsbeer. In Lusatia, Misnia, Dania.» *Ribes nigrum* L.

XXIV.17. »Sambucus fructu in umbella nigro Bauh. hollunder. holder. In Germania, Dania &c. Sambucus vulgaris Trago.» *Sambucus nigra* L.

XXIV.18. »Sambucus fructu in umbella viridi Bauh. Erant prorsus candidæ baccæ. Basileæ in hort.» Fruchstand ders. Art.

XXIV.19. »Sambucus racemosa rubra Bauh. Sambucus cervina Tab. hirsch hollunder. In Misnia, Bohemia, Helvetia &c.» *Sambucus racemosa* L.

XXIV.20. »Sambucus laciniato folio Bauh. Monspelii et Lipsiæ in hortis.» D:o, f. laciniata.

XXIV.21. »Sambucus humilis sive Ebulus Bauh. Attich. In Lusatia, Bohemia &c.» *Sambucus ebulus* L.

XXIV.22. »Sambucus aquatica flore simplici Bauh. Schwelckenbaum. In Misnia, Lusatia, Dania &c.» *Viburnum opulus* L.

XXIV.23. »Sambucus aquatica flore globoso pleno Bauh. Schneeballen. In hortis Misniæ, Helvetiæ, Daniæ. Sambucus rosea Lob.» D:o, var. *roseum*.

XXIV.24. »Ficus communis Bauh. Feygenbaum. Monspelii et in Italia sponte.» *Ficus carica* L.

XXIV.25. Ficus humilis Bauh. In hortis Lusatiæ, Misniæ, Daniæ.» D:o.

XXIV.26. »Ficus Indica folio spinoso fructu majore Bauh. Indianische feijgen. In hortis Misniæ, Helvetiæ &c.» *Opuntia ficus indica* Mill.

XXIV.27. »Ficus Indica humilis Bauh. Lipsiæ in horto Deurlingi.» D:o.

XXIV.28. »Morus fructu nigro Bauh. Maulbeerbaum. In hortis Austriæ, Bohemiæ, Daniæ.» *Morus nigra* L.

XXIV.29. »Morus fructu nigro minore. Monspelii in horto Regio.» D:o.

XXIV.30. »Morus fructu albo Bauh. Weisse Maulbeer. Monspelii in horto Regio.» *Morus alba* L.

XXIV.31. »Arbutus folio serrato Bauh. Corbezole Florentinis. Monspelii et Florentiæ sponte. Arbutus sive Unedo Lob.» *Arbutus unedo* L.

XXIV.32. »Laurus vulgaris Bauh. Lorbeerbaum. Florentiæ et Monspelii in hortis.» *Laurus nobilis* L.

XXIV.33. »Laurus vulgaris cum excremento racemoso. Florentiæ in campo.» D:o, ein Zweig mit terminaler Inflorescenz.

XXIV.34. a) »Laurus sylvestris Corni fæminæ foliis subhirsutis Bauh. Laurus tinus cærulea bacca Lob. Monspelii sponte.» *Viburnum tinus* L. mit Blüten. b) »Laurus syl. foliis venosis Bauh. Wilder Lorbeerbaum. Florentiæ in hort.» D:o mit Früchten.

XXIV.35. »Laureola semper virens flore viridi Bauh. Daphnoides Tab. Kellershals. In Helvetia et non procul Valentia Gallor. in alpibus.» *Daphne laureola* L.

XXIV.36. »Laureola folio deciduo, flore purpureo Bauh. Chamælæa seu Mezereum Trago. In Misniæ, Helvetiæ &c. montibus.» *Daphne mezereum* L.

XXIV.37. »Sunt folia præcedentis. Ibid.» D:o.

XXIV.38. »Chamælæa tricoccos Bauh. Zeydelbast. Mezeron Arabum Lob. Monspelii et Florentiæ sponte.» *Cneorum tricoccon* L.

XXIV.39. »Chamælæa alpina folio inferne incano Bauh. Chamælæa alpina incana Lob. In Italia.» *Daphne sericea* Vahl.

XXIV.40. »Thymelæa foliis Lini Bauh. Kellershalss. Zeilandt. Monspelii et Liborni Italiæ.» *Daphne gnidium* L.

XXIV.41. »Thymelæa foliis acutis, capitulo Succisæ sive Alypum Monspeliensium Bauh. Hippoglossum Valentinum Clus. In Cetio prope Monspelium.» *Globularia alypum* L.

XXIV.42. »An Thymelæa foliis Chamælææ minoribus subhirsutis Bauh? Dedit Bauhinus nomine Ericæ Alexandrinæ Cortusi.» Eine Thymeleacee, vielleicht *Thymelæa elliptica* Endl.

XXIV.43. »Thymelæa foliis candicantibus serici instar mollibus Bauh. Tarton-Raire Massiliensium Lob. Prope Massiliam in Colle rotundo dicto.» *Thymelaea tartonraira* (L.) All.

XXIV.44. »Thymelæa tomentosa foliis Sedi minoris Bauh. Erica Alexandrina Tab. Welsche Heyde. Pisis in horto Magni Ducis.» *Thymelaea hirsuta* (L.) Endl.

XXIV.45. »Thymelææ affinis facie externa Bauh. Cneorum Matthioli Clusio. In Pyrenæis.» *Daphne cneorum* L.

XXIV.46. »Cneorum album folio Oleæ argenteo molli Bauh. Dedit Bauhinus Basileæ.» *Convolvulus cneorum* L., vegetativer Spross.

XXIV.47. »Nerium floribus rubescentibus Bauh. Oleander. Prope Bormium Gallo-Provinciæ sponte.» *Nerium oleander* L.

XXIV.48. »Nerium floribus albis Bauh. Florentiæ in hortis.» D:o.

XXIV.49. »Cistus mas folio oblongo incano Bauh. Cisten Rösslin. Monspelii sponte.» *Cistus albidus* L.

XXIV.50. »Cisti maris alia species. Nisi sola cultura differat. Parisiis in horto du Monsieur Gonu.» D:o.

XXIV.51. »Cistus mas flore albo. Prope Monspelium sponte, et copiose.» D:o.

XXIV.52. »An Cistus mas folio breviore Bauh? An potius Cistus folio Halymi Clus.? A parente.» Vegetativer Spross, ich vermute von *Bassia hyssopifolia* (Pall.) Volk.

XXIV.53. »Cistus mas foliis Chamædrys Bauh. Monspelii in horto Regio.» *Cistus crispus* L.

XXIV.54. »Cistus fæmina folio Salviæ Bauh. Florentiæ et Monspelii sponte.» *Cistus salvifolius* L.

XXIV.55. »Cistus folio Plantaginis Bauh. Non procul Olbya GalloProvincia.» *Helianthemum tuberaria* (L.) Mill.

XXIV.56. »An Cistus folio Spicæ Bauh? Prope Fontainobelleau in Gallia.» *Helianthemum umbellatum* (L.) Mill.

XXIV.57. »Cistus folio Samsuchi incano Bauh. Flores sunt albi. In GalloProvincia.» *Helianthemum apenninum* (L.) Mill.

XXIV.post 57. »An Cistus folio Majoranæ Bauh? Chamæcistus folio Mari legitimi. Non longe Massilia.» *Helianthemum marifolium* (L.) DC.

XXIV.ante 58. »Cistus quidam Serpilli folio. Ex Gallia.» Vegetativer Spross, kaum bestimmbar.

XXIV.58. »An Cistus folio Thymi Bauh? Est major sequente. Massiliæ.» Vegetativ, scheint *Fumana viscida* Spach zu sein.

XXIV.59. »Cistus Thymi folio Bauh. Monspelii.» *Fumana ericoides* (Cav.) Pau.

XXIV.60. »Cistus folio Salicis Bauh. Cistus humilis annuus Lob. In GalloProvincia.» *Helianthemum salicifolium* (L.) Mill.

XXIV.61. »Cistus flore pallido, punicante macula insignito Bauh. Cistus annuus II. Clus. In Italia et GalloProvincia.» *Helianthemum guttatum* (L.) Mill.

XXIV.post 61. »Videtur esse Cisti species. Ex horto Medico Lugdunensi, ni fallor. Est sine dubio Chamæcistus punctatus Sedi folio Dn. D. Ottonis Sperlingii, quem circa Holbecam in portu(?) nasci asserebat, faber Bramer(?) Sorensis.» *Saxifraga hirculus* L.

XXIV.62. Hat keine Etikette. *Cytinus hypocistis* L.

XXIV.63. »HypoLedon, quia radici Ledi adnascebatur. Florentiæ.» D:o.

XXIV.64. »Chamæcistus vulgaris flore luteo Bauh. Helianthemum Germanicum Tab. In Lusatia, Bohemia, Helvetia, Dania.» *Helianthemum chamaecistus* Mill.

XXIV.65. »Chamæcistus vulgaris flore albo majore Bauh. In Bavaria.» D:o, f. *albiflorum* (Koch).

XXIV.66. »Chamæcistus foliis Thymi incanis Bauh. In Gallia.» *Fumana viscida* Spach.

XXIV.66 b. »Affinis praecedenti. Chamaecistus Coris folio Füreri. An Chamaecistus Ericae folio luteus Bauh. Prope Northusam Thuringiae.» *Fumana procumbens* Gr. & G.

XXIV.67. »Chamæcistus foliis Myrti minoris incanis Bauh. In monte, oppido Baden Austriæ, imminente.» *Helianthemum vineale* (Willd.) Pers.

XXIV.68. »Chamæcistus angustifolia Bauh. In Helvetia.» D:o.

XXIV.69. »Præcedenti affinis. In Helvetia.» Scheint mir mit *Helianthemum italicum* (L.) Pers. übereinzustimmen, diese Art scheint aber nicht in der Schweiz vorzukommen.

XXIV.70. »Chamæcistus Serpillifolia, floribus carneis Bauh. Anonymos altera Clus. pann. In alpibus Styriæ, Carinthiæ, Pyrenæis.» *Loiseleuria procumbens* (L.) Desv.

XXIV.71. »Chamæcistus hirsuta Bauh. Cistus humilis Austriaca Tab. In Draunstein et aliis Austriæ superioris alpibus.» *Rhodothamnus chamaecistus* (L.) Rchb.

XXIV.72. »Chamæcistus repens serpillifolia lutea Bauh. Ex Belgio a d:no Weckerlino.» Ist vielleicht *Helianthemum alpestre* (Jacq.) Dun., f. *glabratum* Dun.

XXIV.73. »Chamæcistus alpinus serpillifolius luteus incanus. In Pyrenæis.» Scheint *Helianthemum alpestre* (Jacq.) Dun. zu sein. (Studien, p. 113.)

XXIV.74. »Similis præcedenti. In alpibus Austriæ.» Wie vorige.

XXIV.75. »An Chamæcistus Ericæfolio luteus Bauh? In Gallia.» *Fumana laevipes* (L.) Spach.

XXIV.76. »Cistus ladanifera Monspeliens. Bauh. Florentiæ in horto Magni Ducis.» Vegetativer Spross, wahrscheinlich von *Cistus laurifolius* L.

XXIV.77. »Cistus ledon foliis Populi nigræ major Bauh. Ledum latifolium maius Clusii. Monspelii in horto Regio.» *Cistus populifolius* L.

XXIV.78. »Cistus ledon foliis Populi nigræ minor Bauh. Ledum latifolium minus Clus. Monspelii in horto Regio.» D:o.

XXIV.79. »Cistus ledon foliis Oleæ, sed angustioribus Bauh. Cistus ledon Narbonense Tab. Monspelii sponte.» *Cistus monspeliensis* L.

XXIV.80. »A præcedente differt fructu racemoso. Florentiæ copiosissime.» D:o.

XXIV.81. »Cistus ledon foliis Rorismarini ferrugineis Bauh. Ledum Silesiacum Clus. Gichttanne. Zeitheyde. Gränse. post. In Bohemia, Lusatia inferiori.» *Ledum palustre* L. (Studien, p. 114.)

XXIV.82. »Cistus ledon foliis Salicis angustifoliæ Bauh. Rosmarinus syl. ἄσμος

Clus. Wilder Rosmarin. In Helvetia, Lusatia inferiori et Bohemia.» *Andromeda polifolia* L.

XXIV.83. »Ledum alpinum hirsutum Bauh. Balsamum alpinum Lob. Tab. Alp Balsam. In alpibus Austriæ, Styriæ, Helvetiæ, Rhætiæ &c.» *Rhododendron hirsutum* L.

XXIV.84. »Ledum alpinum ferrea rubigine nigricantibus Bauh. Chamærhododendros alpina latifol. Tab. In alpibus Austriæ superioris, Carinthiæ, Rhætiæ, Pyrenæis &c. Alp Röslin.» *Rhododendron ferrugineum* L.

XXIV.85. »Ledum alpinum flore candido. In Pyrenæis versus Hispaniam, ubi longo tractu solius candidi coloris occurrebat, cum in parte versus Galliam tantummodo rubrum esset.» D:o.

XXIV.86. »Chamærhododendri alpinæ latifoliæ iconi ap(ud) Tabern. convenit. An sit tantum Vitis idæa rubra? In Vallesia bey der Steigen et in Austria.» *Arctostaphylos uva ursi* (L.) Spreng.

XXIV.87. »Myrtus communis Italica Bauh. Myrtenbaum. Welsche Heidelbeer. Florentiæ in hortis.» *Myrtus communis* L.

XXIV.88. »Myrtus latifolia Bætica Bauh. Florentiæ in hortis.» D:o, grossblättrig (var. *baetica* Mill.?).

XXIV.89. »Myrtus sylvestris foliis acutissimis Bauh. In GalloProvincia pone Massiliam sponte in dumetis.» Dieselbe Art.

XXIV.90. »Myrtus minor vulgaris Bauh. Myrtus Tarentina Matth. Monspelii in hortis.» D:o, var. *tarentina* L.

XXIV.91. »Ruscus Bauh. Meussdorn. Monspelii et Florentiæ sponte.» *Ruscus aculeatus* L.

XXIV.92. »Vitis idæa foliis oblongis crenatis, fructu nigricante Bauh. Heydelbeer. Myrtillus Matth. In Germania et alibi passim.» *Vaccinium myrtillus* L.

XXIV.93. »Vitis idæa foliis oblongis albicantibus Bauh. grosse heydelbeer. In Lusatia inferiori, Bohemia, Helvetia, Dania.» *Vaccinium uliginosum* L.

XXIV.94. »Videtur eadem cum præcedente quamvis minora habeat et rotundiora folia. In alpibus Helveticis.» D:o.

XXIV.95. »Vitis idæa foliis subrotundis, non crenatis, baccis rubris Bauh. Vitis idæa rubra Cam. in Ep. Matth. Preusselbeer. In Lusatia, Bohemia, Misnia &c.» *Vaccinium vitis idaea* L.

XXIV.96. »An Vitis Idæa foliis carnosis et veluti punctatis Bauh. Uva ursi Clus. Tab. In Bohemia.» D:o, grossblättrig.

XXIV.97. »Vitis Idæa palustris Bauh. Vaccinia palustris Lob. Moossbeer. Norimbergæ, item in Lusatia, et prope Einsidel Helvetiorum: nec non in Dania.» *Oxycoccus palustris* Pers.

XXIV.98. »Buxus arborescens Bauh. Buxbaum. Monspelii et Florentiæ sponte.» *Buxus sempervirens* L.

XXIV.99. »Buxus foliis rotundioribus Bauh. In hortis passim.» D:o.

XXIV.100. »Chamæbuxus flore Coluteæ Bauh. Anonymos flore Coluteæ Clus. In alpibus passim.» *Polygala chamaebuxus* L.

XXIV.101. »Olea sativa Bauh. Oelbaum. In Italia et Gallia.» *Olea europaea* L.

XXIV.102. »Olea syl. folio duro, subtus incano Bauh. Wilder Oelbaum. Monspelii in sylvula.» D:o.

XXIV.103. »Olea syl. folio molli incano Bauh. Eleagnos Matth. Monspelii in horto Regio.» *Elaeagnus angustifolia* L.

XXIV.104. »Salix vulgaris alba arborescens Bauh. Weiden. In Lusatia &c.» *Salix alba* L. Von Dr. Björn Floderus bestimmt, wie alle folgende Salix-Arten!

XXIV.105. »An Salix vulgaris nigricans folio non serrato Bauh? In Lusatia.» *Salix viminalis* L.

XXIV.106. »Salix vulgaris rubens Bauh. Rote Weyden. Brandtweyden. In Lusatia, Misnia, Dania.» *Salix pentandra* L.

XXIV.107. »Forte eadem cum præcedente, nondum perfecta, aut ..... cum subsequente. In Lusatia &c.» *Salix triandra* L.

XXIV.108. »Salix sativa lutea folio crenato Bauh. In Lusatia.» *Salix triandra* L. var. *discolor* Ands.

XXIV.109. »Salix folio longissimo, angustissimo, utrinque albido Bauh. Ad pagum Castellum novum dictum, non longe Monspelio, prope flumen.» *Salix incana* Schrank.

XXIV.110. »An Salix humilis angustifolia Bauh? In Vallesia.» *Salix purpurea* L. f. *gracilis* Wimm.

XXIV.111. »An Salix oblongo, incano, acuto folio Bauh? In Austria.» *Salix incana* Schrank.

XXIV.112. »An Salix fragilis Bauh. In Lusatia.» *Salix rosmarinifolia* L. f. *umbrosa*.

XXIV.113. »Salix folio ex rotunditate acuminato Bauh. Salix caprea latifolia Tab. Haarweyden. In Lusatia, Misnia, Dania.» *Salix grandifolia* Ser.

XXIV.114. »Salix latifolia minor Bauh. In Pyrenæis.» *Salix caprea* L. (Studien, p. 114.)

XXIV.post 114. »Salix subrotundo argenteo folio Bauh. Ex horto Medico Lugdunensi.» *Salix caprea* L.

XXIV.115. »An Salix humilis latifolia erecta Bauh? In Lusatia.» *Salix repens* (L.) Auct. (Studien, p. 114.)

XXIV.116. »A præcedente differt, quod hæc habeat folia minora, subtus fillosa, et, ut videtur, nonnihil crenata &c. In Lusatia.» *Salix repens* (L.) Auct.

XXIV.post 116. »Salix pumila sericea. Ex Hollandia.» D:o. (Studien, p. 114.)

XXIV.117. »Salix latifolia repens Bauh. Ex Belgio a D. Weckerlino.» *Salix pyrenaica* Gouan.

XXIV.118. »Salix alpina pumila rotundifolia repens, inferne subcinericea Bauh. In monte S. Bernhardo Helvetiæ.» *Salix Waldsteiniana* Willd.

XXIV.(118 bis). »An Salix pumila, foliis utrinque candicantibus et lanuginosis Bauh? Allata fuit ex Norwegia.» *Salix lapponum* L. (Studien, p. 114.)

XXIV.119. »Salix saxatilis minima Bauh. In Pyrenæis, alpibus Helvetiæ, Austriæ, Styriæ.» *Salix reticulata* L.

XXIV.(119 bis). »Huc retuli, quia dicebatur flores Salicis habuisse. Nisi sit Betula quædam pumila? Ex Norwegia allata.» *Salix herbacea* L. (Studien, p. 115. Linné hat hier geschrieben: »est certe Salicis minime species. C. Linnæus.» (Hat er sich geirrt, oder ist »minime» ein Schreibfehler für »minimæ»?).

XXIV.120. »Salix alpina Pyrenaica Bauh. In Pyrenaeis, et Vallesiæ alpibus.» *Salix pyrenaica* Gouan. (Studien, p. 115; die dort gegebene Bestimmung, S. glauca L., ist unrichtig.)

XXIV.121. »Salix alpina angustifolia repens non incana Bauh. In alpibus Helvetiæ et Austriæ.» *Salix serpyllifolia* Scop. fem. und *S. retusa* L. mas.

XXIV.122. »Vitex foliis angustioribus, Cannabis modo dispositis Bauh. Keuschlamb. Non longe Olbya (Ieres) Galliæ narbonensis sponte. Agnus castus officinar.» *Vitex agnus castus* L.

XXIV.123. »Frutex spicatus, foliis salignis serratis Bauh. Spiræa Theophrasti forte Clus. Dedit Bauhinus.» Sehr beschädigt, scheint *Spiraea salicifolia* L. zu sein.
XXIV.124. »Habet quandam similitudinem cum præcedente. A parente.» *Spiraea salicifolia* L.
XXIV.125. »Ligustrum Germanicum Bauh. Harttriegel, Beinhöltzer, wilde Olivien. In Bavaria et Bohemia sponte.» *Ligustrum vulgare* L.
XXIV.post 125. »Phillyrea latifolia lævis Bauh. Steinlinden. Monspelii in horto Regio.» *Phillyrea latifolia* L.
XXIV.126. »Phillyrea folio leviter serrato Bauh. Steinlinden. Florentiæ et Monspelii.» D:o.
XXIV.127. »Phillyrea folio Ligustri Bauh. Monspelii.» *Phillyrea media* L.
XXIV.128. »Phillyrea Narbonensis folio longiore cinereo. Monspelii in sylvula.» Dürfte *Phillyrea media* L. sein. (Studien, p. 115.)
XXIV.129. »Phillyrea Italica foliis oblongis venosis &c. Florentiæ.» D:o. (Studien, p. 115.)
XXIV.130. »Phillyrea angustifolia prima Bauh. Monspelii.» *Phillyrea angustifolia* L.

VOLUMEN XXV.

»Horti sicci seu stirpivm studio et labore D. Ioachimi Burseri Camentio-Lusati, in Regia Nobilium Academia Sorana Medici et Professoris Phys. publici per diversas regiones et loca collectarum et iuxta seriem Pinacis Bauhiniani digestarum Volumen XXV et ultimum Continens Sectiones tres posteriores Libri duodecimi Pinacis prædicti.»

XXV.1. »Philyca humilior Bauh. Alaternus II. Clus. Alaternus humilior lato folio Lob. Frontignani Galliæ Narbonensis.» *Rhamnus Alaternus* L.
XXV.2. »Philyca elatior Bauh. Alaternus I. Clus. Bourgespine Monspeliensium Lob. Monspelii». *Rhamnus Alaternus* L.
XXV.3. »Rhamnus spinis oblongis, flore candicante Bauh. Rhamnus I. Clus. Matth. Stechdorn. Monspelii et Florentiæ.» *Lycium europaeum* L.
XXV.4. »Rhamnus Salicis folio angusto, fructu flavescente Bauh. Weidendorn, Rheindorn, Sandtdorn. Ingolstadii, et in Rhætia prope Ilanz(?). In Insula Mön. Rhamnus II. Clus. Oleaster Germanicus Cord.» *Hippophaë rhamnoides* L.
XXV.5. »Rhamnus folio subrotundo, fructu compresso Bauh. Paliurus Lob. Monspelii et Florentiæ sponte.» *Paliurus australis* Gaertn.
XXV.post 5. »Rhamni III. Dioscoridis nomine accepi. A parente. an sit Lycium Italicum Matth?» Dürfte *Zizyphus vulgaris* Lam. sein.
XXV.6. »Rhamnus Catharoticus Bauh. Spina infectoria Matth. Creutzbeer. Safttgrün. Wegedorn. In Misnia, Helvetia, Dania. Spina cervina Gesn. et officinar.» *Rhamnus catharticus* L.
XXV.7. »Rhamnus catharoticus arborescens. Meminit eius Bauhinus. Videtur non floris solum plantæ, sed et foliorum et fructus magnitudine differre a p(ræ)cedente. In Bohemia prope Caden urbem.» *Rhamnus catharticus* L.
XXV.8. »Rhamnus catharoticus minor Bauh. Spina infectoria pumila I. Clus. In Draunstein monte Austriæ superioris, et prope Badenam Austriæ inferioris. An potius sit Spina infectoria pumila altera Clusii?» *Rhamnus saxatilis* L.
XXV.9. »Lycium Gallicum Bauh. Buxdorn. Monspelii.» *Rhamnus infectoria* L.

XXV.10. »Lycium Indicum foliis Pruni Bauh. Nomine Lycii veri dedit Bauhinus.» Blattlose Ästchen einer Berberis.

XXV.11. »Rubus vulgaris, sive Rubus fructu nigro Bauh. Brombeer. Kratzbeer. Passim.» *Rubus fruticosus* L.

XXV.12. »Rubus repens fructu cæsio Bauh. Bocksbeer. In Lusatia, Misnia, Dania.» *Rubus caesius* L.

XXV.13. »Rubus sine spinis. An Rubus idæus lævis Bauh? In Valle umbrosa dicta, aliquot milliaribus ab urbe Florentina. Deduxit nos ad hanc plantam, tanquam singularem et novam Monachus quidam . . . . . ., rei Botanicæ non imperitus.» *Rubus* spec.

XXV.14. »Rubus idæus spinosus Bauh. Himbeer. In Misnia, Lusatia, Bohemia, Dania.» *Rubus idaeus* L.

XXV.15. »Chamærubus saxatilis Bauh. Rubus parvus saxatilis alpinus Camer. In Bohemia, Helvetia, Seelandia.» *Rubus saxatilis* L.

XXV.post p. 15. »Chamærubus foliis Ribes Bauh. Chamæmorus Norvegica Clus. Molttebeer. a D:no Simone Pauli accepi allatam ex Norwegia.» *Rubus chamaemorus* L.

XXV.16. »Capparis spinosa fructu minore, folio rotundo Bauh. Kleine Cappern. Monspelii in hort.» *Capparis spinosa* L.

XXV.17. »Capparis folio acuto Bauh. grosse Cappern. Monspelii et Florentiæ.» *Capparis spinosa* L.

XXV.18. »Capparis Portulacæ folio Bauh. Capparis leguminosa Tab. Capparis Fabago Dod. Monspelii et Basileæ in hort.» *Zygophyllum Fabago* L.

XXV.19. »Rosa rubra Bauh. Rote Rosen. In hortis Lusat. Misn.» *Rosa pendulina* L. (*alpina* L.).

XXV.20. »Rosa maxima multiplex Bauh. Rosa centifolia Batavica Clus. grosse leibfarbene Rosen. In hortis Misniæ, Daniæ.» *Rosa centifolia* L.

XXV.21. »Rosa alba vulgaris major Bauh. Weisse volle Rosen. In hortis passim.» *Rosa alba* L. (= *francofurtana* Münch. × *Beggeriana* Schrenk).

XXV.22. »Rosa moschata flore pleno Bauh. Bisem Rosen. Basileæ in hortis.» *Rosa moschata* Herrm.

XXV.23. »Rosa syl. vulgaris, flore odorato incarnato Bauh. Dorn Rosen. Passim.» *Rosa rufula* Matss.

XXV.24. »Spongia Rosæ syl. innascens. Bedeguar officinar. Schlaffe. Passim.» *Rosa* (*Halstonei* Bak.?) mit Gallen.

XXV.25. »Rosa syl. foliis odoratis Bauh. Rosa Eglanteria Tab. Engeldorn. Mariendorn. In Lusatia, Dania.» *Rosa rubiginosa* L.

XXV.26. »Rosa odore Cinamomi simplex Bauh. Cannel Rosen. Dresdæ in horto.» Vielleicht *Rosa blanda* Ait.

XXV.27. »Rosa odore Cinamomi, flore pleno Bauh. Basileæ dedit Mianus, ex Anglia allatam.» Wahrscheinlich *Rosa cinnamomea* L.

XXV.28. »Rosa minor rubello flore Bauh. Rosa provincialis minor Tab. Kleine Provintz Rosen, Zucker Röslin. In hortis passim.» *Rosa cinnamomea* L.

XXV.29. »Rosa lutea simplex Bauh. geele Rosen. Lipsiæ, Basileæ, Francofurti ad Mænum in hortis.» *Rosa eglanteria* L. (R. lutea Mill.).

XXV.30. »Rosa alpina rubra, soinis carens. In Draunstein Austriæ, Wasserfall Helvetiæ et Pyrenæ is copiose reperitur.» *Rosa pendulina* L. (= *alpina* L.).

XXV.31. »Rosa campestris spinosissima flore albo odoro Bauh. Monspelii sponte.» *Rosa pimpinellifolia* L. (= *spinosissima* L.).

XXV.32. »Rosa syl. pumila rubens Bauh. Χαμαιρόδον Clus. In Lusatia, Bohemia, Thuringia.» *Rosa cinnamomea* L.

XXV.33. »Rosa syl. pomifera major Bauh. Basileæ in horto Heinzmanni.» *Rosa pomifera* L.

XXV.34. »Rosa syl. pomifera minor Bauh. Prope oppidum Stain Austriæ.» *Rosa pimpinellifolia* L.

XXV.35. »Rosa syl. Muscatæ similis, seu umbellifera. Florentiæ sponte. Videtur esse Rosa moschata simplici flore Bauh.» *Rosa sempervirens* L.

XXV.36. »Rosa Hierichuntea vulgo dicta Bauh. Rose von Jericho. Basileæ in horto Bauhini.» *Anastatica hierochuntica* L.

XXV.37. »Tamarix fruticosa folio crassiore, sive Germanica Bauh. Myrica sylvestris Matth. Ingolstadii, item in Austria, Rhætia, prope Pyrenæos. &c. Tamarisken.» *Myricaria germanica* (L.) Desv.

XXV.38. »Tamarix altera folio tenuiore sive Gallica Bauh. Tamariscus Narbonensis Lob. Monspelii, Arelati, et in Italia.» *Tamarix gallica* L.

XXV.39. »Tamarix Aegyptia arbor Bauh. Dedit Bauhinus.» *Artemisia cina* Berg mit dichtwolligen Gallenbildungen (siehe Botan. Notiser 1928, S. 295).

XXV.40. »Erica vulgaris glabra Bauh. Heyde. Passim.» *Calluna vulgaris* (L.) Salisb.

XXV.41. »Erica alba Tab. In Misnia, Bohemia.» *Calluna vulgaris* f. flore albo.

XXV.42. »Erica maxima alba Bauh. Monspelii.» *Erica arborea* L.

XXV.43. »Erica ex rubro nigricans scoparia Bauh. Erica pumila altera Belgarum Lob. In Lusatia inferiori et Gallia Narbonensi. Etiam in Seelandia.» *Erica tetralix* L.

XXV.44. »Erica maxima purpurascens longioribus foliis Bauh? Erica 2da Matth. In alpibus Austriæ.» *Erica carnea* L.

XXV.45. »Cum præcedente plurimum convenit. Prope Tolosam GalloProvinciæ. *Erica vagans* L.

XXV.46. »Erica major saturate purpurea, floribus in densam spicam compositis. In Cetio monte Monspeliensium. An haec sit Erica maxima purpurascens longioribus foliis Bauh.?» *Erica multiflora* L.

XXV.47. »Ericæ species rara. Hoc nomine alebat eam Monachus, præfectus horti Pisani.» Wahrscheinlich *Erica multiflora* L.

XXV.48. »Erica major scoparia, foliis deciduis Bauh. Erica scoparia flosculis herbaceis Lob. Florentiæ et Monspelii.» *Erica scoparia* L.

XXV.49. »Erica humilis cortice cinericeo Arbuti flore Bauh. Erica pumila dense fruticans, calycylato unedonis flore Lob. Lutetiæ sponte.» *Erica cinerea* L.

XXV.50. »Erica Arbuti flore albo. Parisiis sponte.» *Erica cinerea* L.

XXV.51. »Erica procumbens herbacea Bauh. In monte prope Thermas Carolinas Bohemiæ.» Wahrscheinlich *Erica carnea* L.

XXV.52. »An Erica procumbens dilute purpurea Bauh. Demum saturate rubebat. In sylva quadam arida Misniæ, non altius excrescebat.» *Erica carnea* L.

XXV.53. »Erica baccifera procumbens nigra Bauh. Erica Coris folio XI. Clus. Lipsiæ in horto Deurlingi. Sponte in A tz hærrit (?) et prope Hilsingoram Seelandiæ.» *Empetrum nigrum* L.

XXV.(53 bis). »Erica præcedenti similitudinem h(abe)t quoad folia sed flores in summitate prominent. Erica rarior Norwegica Dn. D. Ottonis Sperlingii qui mihi co(mmun)icavit, ex Norwegia secum allatam.» *Phyllodoce caerulea* (L.) Bab.

XXV.54. »Hæc potius e(st) Erica procumbens dilute purpurea Bauh. Prope oppidum Schweitz Helvetiorum.» *Erica carnea* L.

XXV.55. »Camphorata hirsuta Bauh. Camphorata monspeliaca Tab. Campherkrautt. Monspelii sponte.» *Camphorosma monspeliaca* L.

XXV.56. »Camphorata glabra Bauh. Nisi sit eadem cum subsequente. In Vallesia.» *Kochia arenaria* Roth.

XXV.57. »Camphorata congener Bauh. Anthyllis altera Italor. Lob. In Vallesia.» *Polycnemum majus* A. Br.

XXV.58. »Sabina folio Tamarisci Dioscoridis Bauh. Sadenbaum. In hortis Lusatiæ, Misniæ &c.» *Juniperus Sabina* L., Jugendform.

XXV.59. »Sabina folio Cupressi Bauh. Sabina baccifera Matth. Basileæ in horto Zwingeri arborescebat.» *Juniperus Sabina* L.

XXV.60. »An Sabina folio Cupressi altera Bauh? In hortis Misniæ.» *Juniperus Sabina* L.

XXV.61. »Cedrus folio Cupressi major fructu flavescente Bauh. Iuniperus maior Clus. hisp. Cedrus phoenicea altera etc. Lob. Monspelii in littore.» *Juniperus phoenicea* L.

XXV.62. »An Cedrus folio Cupressi media aut minor Bauh. Aliquot milliaribus Monspelio in colle.» *Juniperus phoenicea* L.

XXV.63. »Thuya Theophrasti Bauh. Arbor vitæ Tab. Baum des lebens. Passim in hortis.» *Thuja occidentalis* L.

XXV.64. »Cupressus Bauh. Cupressbaum. Florentiæ et Monspelii in hortis.» *Cupressus sempervirens* L.

XXV.65. »Iuniperus vulgaris fruticosa Bauh. Wacholterbeer. In Germania, Italia, Gallia, Dania.» *Juniperus communis* L.

XXV.66. »Iuniperus minor montana, folio latiore, fructuque longiore Bauh. Iuniperus alpina Clus. In alpibus Styriæ et Grysoniæ.» *Juniperus nana* Willd.

XXV.67. »Iuniperus major bacca rufescente Bauh. Oxycedrus Clus. hisp. Cedrus Phœnicia Tab. Matth. Monspelii sponte.» *Juniperus oxycedrus* L.

XXV.68. »Asparagus sativa Bauh. Spargen. In hortis passim.» *Asparagus officinalis* L.

XXV.69. »Idem cum præcedente, prout sponte provenit. In Bohemia, Misnia, Dania.» *Asparagus officinalis* L.

XXV.70. »Asparagus syl. tenuissimo folio Bauh. Non longe Mediolano sponte.» *Asparagus tenuifolius* Lam.

XXV.71. »Asparagus maritimus, crassiore folio Bauh. Ad pagum Monspeliensem Perault inter stagnum et mare.» *Asparagus scaber* Brign.

XXV.72. »Asparagus foliis acutis Bauh. Asparagus petræus, Corruda Tab. Stein Spargen. Genuæ, Florentiæ, Monspelii.» *Asparagus acutifolius* L.

XXV.73. »Sola ætate videtur a præcedente differre. Iisdem locis.» *Asparagus acutifolius* L.

XXV.74. »Pinus sativa Bauh. Pimpernussbaum. Florentiæ fructum ferebat.» *Pinus pinea* L.

XXV.75. »Pinus syl. montana altera Bauh. Pinus Mugo Matth. In Schneeberg Austriæ inferioris.» *Pinus austriaca* Höss.(?)

XXV.76. »Pinus maritima major Bauh. Meerfichten. In Cetio Monspeliensium.» Wahrscheinlich *Pinus pinaster* Sol.

XXV.77. »An Pinus maritima minor Bauh? Prope Olbyam GalloProvinciæ.» Wahrscheinlich *Pinus halepensis* Mill.

XXV.78. »Pinaster conis erectis Bauh. Pinaster pumilio Clus. Aufm Saltzberge Austriæ superioris.» Wahrscheinlich *Pinus montana* Mill.

XXV.79. »Cum præcedente videtur eadem. In alpibus Austriæ superioris.» Wahrscheinlich *Pinus montana* Mill.

XXV.80. »An Pinaster latifolius Bauh? et Clus. pann.? In Austria superiori.» *Pinus silvestris* L.

XXV.81. »Pinaster tenuifolius iulo purpurascente Bauh. et Clus. pann. A parente.» *Pinus silvestris* L.

XXV.82. »Larix Bauh. Lerchenbaum. In Comitatu Tyrolensi, Austria, Helvetia &c.» *Larix decidua* Mill.

XXV.83. »Larix cum suo cono. In Helvetia.» *Larix decidua* Mill.

XXV.84. »Larix quando adhuc teneræ ætatis. In Helvetia.» *Larix decidua* Mill.

XXV.85. »Abies alba sive fæmina Bauh. Weiss Tannenbaum. In Lusatia, Misnia, Bohemia &c.» *Abies alba* Mill.

XXV.86. »Taxus Bauh. Eybenbaum. Ibenbaum. In Lusatia.» *Taxus baccata* L.

XXV.87. »Palma major Bauh. Datteln. Olbya in GalloProvincia, item Romæ ad S. Petrum in vincolo ac Pisis in hortis. fructum ferebat, saltem imperfectum.» *Phoenix dactylifera* L.

XXV.88. »Palma minor Bauh. Florentiæ in horto.» *Chamaerops humilis* L.

XXV.89. »Nux vomica in officinis Bauh. Kraeneüglin. Apud Pharmacopolas.» Samen von *Stychnos nux vomica* L.

XXV.90. »Cocculæ officinar. Bauh. In officinis pharmacopæorum.» Früchte von *Anamirta cocculus* (L.) Wight et Arn.

XXV.91. »Anacardium Bauh. Apud Pharmacopolas.» Früchte von *Semecarpus anacardium* L. fil.

INDEX.

Animalia.

Asterias rubens XX.111 b.
Chalina limbata XX.84 b.
Corallium rubrum XX.103.
Euspongia officinalis XX.110.
Flustra foliacea XX.84, 84 a.
Gorgonia verrucosa XX.101.
Leptogorgia sarmentosa XX.102.
Lophohelia prolifera XX.104.
Ophiomyxa pentagona XX.111.
Purpura spec. XX.107.

Algae.

Acetabularia mediterranea XX.105.
Ascophyllum nodosum XX.89.
Ceramium spec. XX.74.
Chaetomorpha crassa XX.86.
Chorda filum XX.109 b.
Cladophora prolifera XX.73.
Corallina officinalis XX.75 a.
  rubens XX.72, 75 b.
Cystoseira barbata XX.94.
  corniculata XX.95.
  discors XX.93.
Dictyopteris polypodioides XX.90.
Enteromorpha compressa XX.74.
  intestinalis XX. ante 72.
Fucus serratus XX.97.
  vesiculosus XX.91, 92.
Gelidium capillaceum XX. post 73.
Halimeda tuna XX.78.
Laminaria digitata XX.81.
  saccharina XX.78 b.
Liagora viscida XX.77.
Monostroma latissimum XX.80.
Nemalion lubricum XX.109 a.
Padina pavonia XX.106.
Peyssonelia squamaria XX.118.
Phyllophora nervosa XX.98.
Polyides rotundus XX.93 b.
Sargassum linifolium XX.96.
  spec. XX. post 96, 100.
Sphacelaria scoparia XX.72.
Sphaerococcus coronopifolius XX.76, 93, 100.
Ulva lactuca XX.79.

Fungi.

Calocera viscosa XX.115.
Gyrocephalus rufus XX.117.
Gyromitra esculenta XX.113.
Morchella conica XX.112.
Tuber brumale XX.119.
Uromyces spec. XVI(2)50.

Lichenes.

Cetraria islandica XX.60.
Cladonia fimbriata XX.54.
Cladonia rangiferina XX.57.
  rangiformis XX.55.
  spec. XX.61.
Lobaria pulmonaria XX.59.
Peltigera canina XX.63.
Stereocaulon tomentoseum XX.56.
Usnea florida XX.58.

Bryophyta.

Astrophyllum punctatum XX.22.
Chomiocarpon quadratum XX.65.
Dicranum fuscescens XX.21.
  scoparium XX.20, 21.
Fegatella conica XX.62.
Fontinalis antipyretica XX.66.
Hylocomium proliferum XX.45.
Marchantia polymorpha XX.64.
Plagiochila asplenioides XX.48.
Polytrichum commune XX.19.
Riccia fluitans XX.70.
Sphagnum acutifolium XX.67.
Stereodon cupressiformis XX.20, 21.

Pteridophyta.

Adiantum capillus Veneris XX.11.
  pedatum XX.13.
Allosorus crispus XX.35, 36.
Asplenium fontanum XX.38.

Asplenium hemionitis XX.4.
marinum XX.39.
onopteris XX.12.
ruta muraria XX.17, 18.
septentrionale XX.37.
trichomanes XX.14.
viride XX.15, 16.
Blechnum spicant XX.42.
Botrychium lunaria XX.8.
Matricariae XX.10.
multifidum XX.10.
ramosum XX.9.
Ceterach officinarum XX.7.
Cyatheacea XX. post 74.
Cystopteris fragilis XX.34.
Dryopteris austriaca XX.28.
dilatata XX.28.
filix mas XX.30.
Linnaeana XX.32.
rigida XX.31.
spinulosa XX.27.
Lycopodium alpinum XX.51.
annotinum XX.53.
clavatum XX.49.
complanatum XX.50.
selago XX.52.
Notochlaena Marantae XX.43.
Ophioglossum vulgatum XX.6.
Osmunda regalis XX.26.
Phyllitis hemionitis XX.5.
scolopendrium XX.1—3.
Polypodium vulgare XX.44.
Polystichum aculeatum XX.40.
lonchitis XX.41.
Pteridium aquilinum XX.25.
Salvinia natans XX.71.
Selaginella helvetica XX.46.
selaginoides XX.47.
Struthiopteris filicastrum XX.29.

Gymnospermae.

Abies alba XXV.85.
Cupressus sempervirens XXV.64.
Juniperus communis XXV.65.
nana XXV.66.
oxycedrus XXV.67.
phoenicea XXV.61, 62.
Sabina XXV.58—60.
Larix decidua XXV.82—84.
Pinus austriaca XXV.75.
halepensis XXV.77.
montana XXV.78, 79.
pinaster XXV.76.
pinea XXV.74.
Pinus silvestris XXV.80, 81.
Taxus baccata XXV.86.
Thuja occidentalis XXV.63.

Helobiae.

Alisma plantago X.78.
Damasonium alisma X.80.
Echinodorus ranunculoides X.79.
Hydrocharis morsus ranae X.129.
Najas marina XX.99.
Posidonia oceanica XX.82.
Potamogeton crispus X.122.
densus X.122.
gramineus X.119.
natans X.117.
obtusifolius X.121.
pectinatus VII(1) post 78, X.124, post 124.
perfoliatus X.120.
pusillus X.125.
trichoides X.123.
Sagittaria sagittifolia X.133—135, XX.85.
Stratiotes aloides XVI(1)105.
Triglochin Barrelieri III.29.
maritimum I.67.
palustre I.66.
Zanichellia palustris I.27, X.126.

Spadiciflorae.

Arisaema triphyllum X.137.
Arisarum vulgare X.143.
Arum italicum X.139.
maculatum X.140, 141.
Biarum tenuifolium X.144.
Calla palustris X.138.
Chamaerops humilis XXV.88.
Colocasia X.142.
Dracunculus vulgaris X.136.
Lemna minor XX.68.
trisulca XX.69.
Phoenix dactylifera XXV.87.

Gramineae.

Aegilops ovata I.125.
triuncialis I.126.
Agrostis alba I.2, 19.
vulgaris I.18.
Aira caespitosa I.19.
caryophyllea XI.113.
flexuosa I.54.
Alopecurus aequalis I.26, 35.
pratensis I.34.
Andropogon distachon I.120.
gryllus I.116 b.

Andropogon hirtum I.119.
ischaemum I.101.
Anthoxanthum odoratum I.30.
paniculatum I.46.
Arrhenaterum elatius 6, 117.
Brachypodium pinnatum I.110.
ramosum I.45.
Briza maxima I.8.
media I.9.
Bromus arvensis I.121.
mollis I.115.
ramosus I.130.
secalinus I.116.
tectorum I.124.
Calamagrostis lanceolata I.52.
Catabrosa aquatica I.107.
Coix lacryma Jobi XIV(2)39.
Cynodon dactylon I.98, 99.
Cynosurus cristatus I.28, 29.
echinatus I.41.
Dactylis glomerata I.32.
Echinaria capitata I, post 95.
Eragrostis major I.10, 11.
Festuca gigantea I.118.
heterophylla I.49.
myuros I.48.
ovina I.56.
rubra I.16, 57.
spadicea I.46.
Glyceria aquatica I.24.
fluitans I.25.
Holcus lanatus I.13.
mollis I.1.
Hordeum murinum I.112.
secalinum I.111.
Koeleria cristata I.1.
pubescens I.37.
Lagurus ovatus I.39.
Lamarckia aurea I.40.
Lolium temulentum I.113.
Melica ciliata I.129.
nutans I.128.
Mibora minima I.12.
Milium effusum I.106.
Molinia caerulea I.7, 23.
Nardurus tenellus I.114.
Nardus stricta I.47.
Panicum crus galli I.103.
sanguinale I.100, 102.
Phalaris arundinacea I.22, 24 b, 79, 88.
Phleum alpinum I.38.
pratense I.35, 36.
Poa angustifolia I.15.
annua I.14.
Poa badensis I.31.
bulbosa I.17.
palustris I.14.
pratensis I.20.
remota I.21.
Polypogon maritimus I.41.
Setaria viridis I.104, 105.
Stipa capillata I.44.
pennata I.51.
Tragus racemosus I.5.
Triticum glaucum I.108.
repens I.109.
Ventenata dubia I.123.
Weingaertneria canescens I.55.

Cyperaceae.

Carex acuta I.70.
arenaria I.80 b.
atrata I.75.
capillaris I. post 74.
ferruginea I.73.
flava I.96.
Goodenowii I.72.
gracilis I.70.
hirta I.33.
hispida I.68.
leporina I.89.
muricata I.80.
nigra I.76.
pendula I.69.
praecox I. post 73.
silvatica I.74.
stellulata I.97.
vulpina I.78.
Cladium mariscus I.85.
Cyperus esculentus II.25.
flavescens I.81.
fuscus I.82.
longus II.21, 24.
mucronatus I.86.
Eriophorum latifolium I.42.
vaginatum I.43.
Rhynchospora alba I.83.
Schoenus nigricans II.12.
Scirpus americanus II.6.
carniolicus I.65.
compactus II.22.
holoschoenus II.3, 5.
lacustris II.8.
maritimus I.77, II.20, 22.
ovatus II.15.
palustris I.61 b, II.14.
pauciflorus II.15.
romanus II.5.

Scirpus setaceus I.63.
silvaticus I.84, II.25.
triqueter II.6.

Juncaceae.

Juncus acutiflorus I.59.
acutus II.2.
articulatus I.4, 60.
bufonius I.90.
capitatus I.62.
compressus I.58.
conglomeratus II.10.
effusus II.4.
glaucus II.7.
squarrosus I.61.
stygius I.64.
trifidus II.13.
triglumis II.11.
Luzula glabrata I.92.
multiflora I.94.
nivea I.95.
pilosa I.93.
silvatica I.91.

Commelinaceae.

Tradescantia virginiana III.104 b.

Liliaceae.

Agapanthus africanus III.106.
Allium angulosum III.105.
ascalonicum III.86.
bulbiferum III.102.
cepa III.85.
chamaemoly III.110.
ericetorum III.93.
flavum III.103.
moly III.108.
montanum III.105, post 105.
moschatum III.111, 112.
oleraceum III.97.
roseum III.101, 102.
sativum III.90, 91.
schoenoprasum III.87, 104.
sibiricum III.87.
sphaerocephalum III.92.
subhirsutum III.109.
triquetrum III.99.
ursinum III.94.
victorialis III.95, 96.
Aloë spec. XVI(1)103.
Aphyllanthes monspeliensis XI.97.
Asparagus acutifolius XXV.72, 73.
officinalis XXV.68, 69.
scaber XXV.71.
tenuifolius XXV.70.
Bulbocodium vernum III.77.
Colchicum autumnale III.70, 71.
neapolitanum III.74, 75.
spec. III.72, 73, 76.
Convallaria majalis XVII.66—68.
Dipcadi serotinum III.18.
Erythronium dens canis III.153.
Fritillaria imperialis III.121.
meleagris III.60—61 b.
persica III.121 b.
pyrenaica III.62.
Gagea arvensis III.84.
lutea III.84.
Hyacinthus orientalis III.19—22.
Hemerocallis flava III.122.
fulva III.123.
Lloydia serotina III.41.
Lilium bulbiferum III.116.
candidum III.113, 114.
chalcedonicum III.118.
croceum III.115.
martagon III.117, 117 b.
pomponium III.119.
pyrenaicum III.120.
Majanthemum bifolium XVII.69.
Muscari botryoides III.11, 12.
comosum III.7—9.
racemosum III.10, 13.
Ornithogalum caudatum III.80.
latifolium III.80.
narbonense III.82.
nutans III.83.
pyrenaicum III.81.
umbellatum III.79.
Paris quadrifolia IX.9—11.
Polygonatum latifolium XVII.58.
multiflorum XVII.56, 57.
officinale XVII.55, 59, 60.
verticillatum XVII.64, 65.
Ruscus aculeatus XXIV.91.
hypoglossum XVII.70.
Scilla amoena III.26.
autumnalis III.28.
bifolia III.23, 24.
italica III.25.
non scripta III.15—17.
peruviana III.30.
Smilacina racemosa XVII.62.
Smilax aspera XVII.17—19.
spec. XVII.20.
Streptopus amplexifolius XVII.63.
Trillium grandiflorum IX.12.
Tulipa australis III.59.
Gesneriana III.53—58.

Urginea maritima III.89.
Uvularia grandiflora XVII.61.
Veratrum album X.37.
nigrum X.38.
Yucca gloriosa IV.3.

Amaryllidaceae.

Agave spec. XVI(1)104.
Galanthus nivalis III.51.
Leucojum aestivum III.50, post 51.
autumnale III.52.
Narcissus bicolor III.43.
biflorus III.34.
calathinus III.37.
dubius III.38.
jonquilla III.40.
juncifolius III.40.
poëticus III.31, 32, 36, 45.
polyanthos III.33.
pseudo-narcissus III.42, 46.
tazzetta III.35.
Pancratium illyricum III.47.
maritimum III.48.
Sternbergia lutea III.78.

Dioscoreaceae.

Tamus communis XVII.25, 26.

Iridaceae.

Crocus biflorus III.66.
moesiacus III.67.
sativus III.63.
susianus III.68, post 68.
vernus III. post 63, 64, 65.
Gladiolus byzantinus III.5, 6.
communis III.4.
Hermodactylus tuberosus III.3.
Iris xiphioides III.1.
xiphium III.2, 2 b.
Romulea bulbocodium III.69.
Sisyrinchium angustifolium XI.98.

Zingiberaceae.

Elettaria cardamomum XXII.75.

Orchidaceae.

Cephalanthera grandiflora X.43.
longifolia X.41.
rubra X.44, 45.
Chamaeorchis alpina III.130.
Cypripedium calceolus X.46.
parviflorum X.47.
Epipactis atrorubens X.40.
latifolia X.39.
palustris X.42.
Goodyera repens III.143.
Gymnadenia conopsea III.146.
odoratissima III.144.
Habenaria viridis III.147.
Herminium monorchis III.141.
Himantoglossum hircinum III.132.
Limodorum abortivum III.151.
Listera ovata III.152.
Neottia nidus avis III.150.
Nigritella nigra III.149.
Ophrys arachnites III.135.
Bertolonii III.137.
Orchis coriophora III.133.
maculata III.145, 148.
mascula III.125.
militaris III.127.
morio III.131.
palustris III.138.
sambucina III.129.
ustulata III.128.
Platanthera bifolia III.134.
Serapias cordigera III.140.
lingua III.139.
Spiranthes autumnalis III.142.

Piperaceae.

Piper cubeba XXII.72.
longum XXII.71.
nigrum XXII.69, 70.

Salicaceae.

Populus alba XXIII.19.
nigra XXIII.20.
tremula XXIII.21.
Salix alba XXIV.104.
caprea XXIV.114, post 114.
grandifolia XXIV.113.
herbacea XXIV.119 b.
incana XXIV.109, 111.
lapponum XXIV.118 b.
pentandra XXIV.106.
purpurea XXIV.110.
pyrenaica XXIV.117, 120.
repens XXIV.115—116 b.
reticulata XXIV.119.
retusa XXIV.121.
rosmarinifolia XXIV.112.
serpyllifolia XXIV.121.
triandra XXIV.107, 108.
viminalis XXIV.105.
Waldsteiniana XXIV.118.

Myricaceae.

Myrica gale XXII.79, 79 b.

Juglandaceae.

Juglans cinerea XXII. ante 87.
regia XXII. post 86.

Betulaceae.

Betula nana XXIII.7 b.
verrucosa XXIII.7.
Carpinus betulus XXIII.6.
Corylus avellana XXII.88.
colurna XXII.89.
maxima XXII.87.

Fagaceae.

Castanea sativa XXII.90.
Fagus silvatica XXII.92.
Quercus cerris XXII.95—98, 100.
coccifera XXII.112, 113.
ilex XXII.102, 105—111.
lanuginosa XXII.94, 99.
pedunculata XXII.93.
suber XXII.102—104.

Ulmaceae.

Celtis australis XXIII.53.
Ulmus foliacea XXIII.5.
glabra XXIII.5
scabra XXIII.2, 3.

Moraceae.

Cannabis sativa XVIII(1)67, 68.
Ficus carica XXIV.24, 25.
Humulus lupulus XVII.28, 29.
Morus alba XXIV.30.
nigra XXIV.28, 29.

Urticaceae.

Urtica atrovirens XIII.53.
dioica XIII.52.
pilulifera XIII.55.
urens XIII.54.

Santalaceae.

Osyris alba XII.15.
Santalum album XXII.20, 21.
Thesium montanum XII.27.

Loranthaceae.

Viscum album XXII.101.

Aristolochiaceae.

Aristolochia clematitis XVII.85, 86.
pallida XVII.84.
pistolochia XVII.88.
rotunda XVII.83, 87.
Asarum europaeum X.145.

Rafflesiaceae.

Cytinus hypocistis XXIV.62, 63.

Polygonaceae.

Polygonum amphibium X.118.
aviculare XVI(1)32.
bistorta X.109, 110.
calcatum XVI(1)34.
convolvulus XVII.5.
heterophyllum XVI(1)33.
maritimum XVI(1)35.
minus IV.104.
persicaria IV.101—103.
viviparum X.111.

Chenopodiaceae.

Atriplex halimus V(2).
Bassia hyssopifolia XXIV.52.
Camphorosma monspeliaca XXV.55.
ovata XVI(1)37.
Chenopodium botrys VII(1)50.
Corispermum hyssopifolium XIX.11.
Eurotia ceratoides XXII.80.
Kochia arenaria XXV.56.
hirsuta XVI(2)19.
scoparia XII.14.
Polycnemum arvense XVI(1)36.
majus XXV.57.
Salicornia fruticosa XVI(2)22.
herbacea XVI(2)23.
Salsola kali XVI(2)20, 24—26.
soda XVI(2)15.
Suaeda maritima XVI(2)17.

Amarantaceae.

Amarantus oleraceus V(2)6.
viridis V(2)7.

Nyctaginiaceae.

Mirabilis jalapa IX.25.

Phytolaccaceae.

Phytolacca spec. IV.104 b.

Aizoaceae.

Mesembrianthemum nodiflorum XVI(2)21.

Portulacaceae.

Montia fontana XIV(1)81.
Portulaca oleracea XVI(2)9, 10.

Caryophyllaceae.

Agrostemma githago XI.54.
Alsine austriaca XI.130, 130 b.
Cherleri XI.133.
ciliata XIV(1)91.

Alsine fasciculata XVI(1)40.
laricifolia XI.129.
mucronata XI.131.
recurva XI.132.
rostrata XVI(1)39.
sedoides XIV(1)91.
Arenaria aggregata XI.134.
biflora XIV(1)88.
ciliata XIV(1)89, 90.
grandiflora XI.119.
hispida XI.136.
montana XI.118.
purpurascens XI.116.
serpyllifolia XIV(1)73.
tetraquetra XI.135.
Buffonia tenuifolia XVI(1)41.
Cerastium arvense XI.106, XIV(1)92.
caespitosum XIV(1)92.
glutinosum XIV(1)93.
latifolium XI.114.
manticum XI.112.
tomentosum XI. post 106—108.
spec. XI.115.
Corrigiola littoralis XVI(1)44.
telephiifolia IV. post 89.
Cucubalus baccifer XIV(1)68.
Dianthus alpinus XI.95.
armeria XI.89.
barbatus XI.86—88.
carthusianorum XI.92.
caryophyllus XI.79—84.
deltoides XI.94.
furcatus XI.85.
plumarius XI.101.
serotinus XI.101.
superbus XI.100, 102.
virgineus XI.96, 99.
Gypsophila fastigiata XI.125.
muralis XI.137.
repens XI.126, 127.
Herniaria glabra XVI(1)48.
hirsuta XVI(1)49.
Holosteum umbellatum XI.108.
Honckenya peploides XII.59.
Illecebrum verticillatum XII.53.
Lychnis chalcedonica XI.45, 46.
coronaria XI.47—49.
flos cuculi XI.103—105.
Melandrium album XI.50—52, 60.
rubrum XI.52, 53, 60.
Moehringia trinervia XIV(1)72, 80.
Paronychia capitata XVI(1)43.
Polycarpon tetraphyllum XVI(1)45.
Sagina nodosa XIV(1)83.
Sagina procumbens XIV (1)84.
Saponaria officinalis XI.78.
Scleranthus annuus XVI(1)38.
perennis XVI(1)38.
Silene acaulis XI.77.
alpestris XI.63.
armeria XI.66, 67.
conica XI.58.
conoidea XI.57.
cretica XI.70.
fruticosa XI.59.
gallica XI.72.
inflata XI.56, XIII.87 b.
muscipula XI.65.
nutans XI.62.
otites XI.68, 69.
quadridentata XI.117.
rupestris XIV(1)85.
saxifraga XI.128.
vallesiaca XI.76.
viscosa XI.61.
Spergula arvensis XIV(1)77.
Spergularia campestris XIV(1)79.
marginata XVI(2)18.
salina XIV(1)78.
Stellaria graminea XI.110, 111, XIV(1)70.
holostea XI.109.
media XIV(1)71.
nemorum XIV(1)69.
Telephium Imperati XVI(2)5.
Tunica prolifera XI.90, 91.
saxifraga XVI(1)42.
Vaccaria segetalis XI.55.
Velezia rigida XI.74.
Viscaria vulgaris XI.64.

Nymphaeaceae.

Nuphar luteum X.130.
Nymphaea candida X.127.

Ceratophyllaceae.

Ceratophyllum demersum VII(1)80.

Ranunculaceae.

Aconitum anthora X.12.
lycoctonum X.2, 3.
paniculatum X.6—9.
pyrenaicum X.4.
Actaea rubra X.11.
spicata X.10.
Adonis aestivalis IX.96, 98.
autumnalis IX.96.
vernalis X.36.
Anemone apennina IX.67.

Anemone coronaria IX.66, 68, post 68, 69, 70, 72—74, 76, 77.
dichotoma IX.138.
hepatica XVIII(2)61—63.
hortensis IX.60—65, 71, 75.
narcissiflora IX.137.
nemorosa IX.83—86.
ranunculoides IX.99—101.
silvestris IX.78, 79.
trifolia IX.82.
Aquilegia alpina VII(1)108.
vulgaris VII(1)105—107, 109—117.
Batrachium divaricatum VII(1) post 80.
fluitans VII(1)77.
hederaceum IX.120.
paucistamineum IX.121.
peltatum IX.120.
Caltha palustris XV(2)82—83.
Ceratocephalus falcatus XIII.81.
Clematis alpina XVII.39.
flammula XVII.37.
integrifolia XVII.40.
recta XVII.36.
vitalba XVII.35.
viticella XVII.41, 42.
Delphinium Ajacis VII(1)83—88, 90.
consolida VII(1)89.
fissum X.5.
peregrinum VII(1)91.
staphisagria XVIII(1)92.
Eranthis hiemalis X.1.
Ficaria verna XVII.94.
Helleborus foetidus X.30.
niger X.33.
viridis X.31.
Myosurus minimus X.87.
Nigella arvensis VII(1)118, 119.
damascena VII(1)121, 122.
sativa VII(1)123, 124.
Paeonia officinalis XVIII(1)86, 89, 90.
peregrina XVIII(1)87.
spec. XVIII(1)85.
Pulsatilla alpina IX. post 93, 94.
patens IX.93.
vernalis IX.91, 92.
vulgaris IX.87—90.
Ranunculus aconitifolius IX.113, 139.
acris IX.105, 110, 136.
alpestris IX.132—134.
amplexicaulis IX.125.
arvensis IX.114.
asiaticus IX.130.
auricomus IX.102.
bulbosus IX.107, 108.
Ranunculus creticus IX.117.
flabellatus IX.129.
flammula IX.123.
garganicus IX.129.
glacialis IX.131.
gramineus IX.126.
hybridus X.14.
illyricus IX.128.
lanuginosus IX.141, 142.
lingua IX.122.
monspeliacus IX.109.
montanus IX.135.
muricatus IX.116.
parviflorus IX.115.
phthora X.14.
pyrenaeus IX.127.
repens IX.106, 112.
reptans IX.124.
sceleratus IX.118.
thora X.13.
Thalictrum angustifolium XIX.47.
aquilegifolium XIX.39, 40, 42.
dioicum XIX.41.
flavum XIX.44.
foetidum XIX.49.
majus XIX.45.
minus XIX.43, 48.
simplex XIX.46.
Trollius europaeus IX.140.

Berberidaceae.

Berberis vulgaris XXIV.9.
Epimedium alpinum XVIII(1)84.
Leontice leontopetalum XVIII(1)91.

Menispermaceae.

Anamirta cocculus XXV.90.

Myristicaceae.

Myristica fragrans XXII.64, 65.

Lauraceae.

Cinnamomum spec. XXII.66.
zeylanicum XXII.67.
Laurus nobilis XXIV.32, 33.
Sassafras officinale XXIII.29.

Papaveraceae.

Chelidonium majus VII(1)103, 104.
Corydalis cava VII(1)99, 100.
intermedia VII(1)102.
laxa VII(1)101.
Fumaria capreolata VII(1)94, 98.
lutea VII(1)97.
officinalis VII(1)92.

Fumaria parviflora VII(1)93.
spicata VII(1)95, 96.
Glaucium corniculatum IX.49, 50.
flavum IX.47, 48.
Hypecoum pendulum IX.55.
procumbens IX.53, 54.
Meconopsis cambrica IX.45.
Papaver alpinum IX.58.
argemone IX.57.
hybridum IX.56.
rhoeas IX.44, 46.
somniferum IX.34—43.
Roemeria hybrida IX.52.

Capparidaceae.

Capparis spinosa XXV.16, 17.
Pedicellaria pentaphylla XIX.113.

Cruciferae.

Aethionema saxatile V(1)43.
Alyssum calycinum V(1)47.
campestre V(1)48.
incanum V(1)58.
montanum V(1)42.
saxatile XI.31.
spinosum V(1)57.
Anastatica hierochuntica XXV.36.
Arabidopsis Thaliana V(1)67.
Arabis alpestris IV.100.
alpina V(1)77.
arenosa IV.77.
bellidifolia V(1)21.
cebennensis XI.41.
Halleri V(1)27.
hirsuta IV.99.
verna IV.47.
Armoracia rusticana IV.53.
Barbarea vulgaris IV.75.
Biscutella auriculata V(1)52.
didyma V(1)50.
Brassica nigra IV.42, 82.
spec. IV.1, 2.
Bunias erucago IV.79, 80.
Cakile maritima IV.78.
Calepina Corvini V(1)73.
Capsella bursa pastoris V(1)60.
Cardamine amara V(1)10.
bellidifolia V(1)22.
graeca IV. post 65.
hirsuta V(1)13.
resedifolia V(1)15.
trifolia V(1)14.
Cheiranthus cheiri XI.33.
spec.? IV.81.
Clypeola jonthlaspi V(1)54.
Cochlearia saxatilis V(1)40.
Coronopus procumbens VII.49.
Dentaria bulbifera XVIII(1)82.
digitata XVIII(1)80.
enneaphyllos XVII(1)83.
pinnata XVIII(1)81.
Diplotaxis muralis IV.64.
tenuifolia IV.62, 63.
Draba aizoides XVI(1)78.
hirta V(1)66.
muralis V(1)64.
nemorosa V(1)66.
Zahlbruckneri XVI(1)78.
Eruca sativa IV.61.
Erucastrum obtusangulum IV.66, 69.
Erysimum hieracifolium XI.36.
longifolium XI.35.
repandum XI.32.
Farsetia clypeata XI.29.
Hesperis laciniata XI.42.
matronalis XI.37—39.
tristis XI.40.
Hirschfeldia adpressa IV.73.
Hutchinsia alpina V(1)18.
petraea V(1)20.
Iberia amara V(1)35.
pinnata V(1)37.
saxatilis V(1)45.
Kernera saxatilis V(1)41.
Koniga maritima V(1)49.
Lepidium graminifolium IV.58.
latifolium IV.56.
Lunaria annua XI.43.
rediviva XI.44.
Malcolmia parviflora XI.28.
Matthiola glabrata XI.27.
incana XI.15—24.
littorea XI.26.
sinuata XI.25.
Myagrum perfoliatum V(1)72.
Nasturtium amphibium × palustre IV.84.
asperum IV.72.
officinale V(1)9.
palustre IV.54.
pyrenaicum IV.72.
silvestre IV.70, 71.
Peltaria alliacea V(1)38 b.
Raphanus raphanistrum IV.44.
sativus IV.45, 51, 52.
Rapistrum perenne IV.49.
Sinapis alba IV.42, 83.
arvensis IV.43.
cheiranthus IV.67.

Sinapis incana IV.73.
Sisymbrium Columnae IV.48, 74.
irio IV.68, 95.
Loeselii IV.93.
officinale IV.92.
orientale IV.48, 74.
polyceratium IV.94.
Teesdalea nudicaulis V(1)17, 62.
Thlaspi alpestre V(1)30, 34.
montanum V(1)38 b.
perfoliatum V(1)33.
Vesicaria sinuata XI.30.
Vogelia paniculata V(1)73 b.

Resedaceae.

Astrocarpus sesamoides IV.89.
Reseda alba IV.85.
glauca IV.88.
lutea IV.86, 87.
luteola IV.91.
phyteuma IV.90.

Droseraceae.

Drosera anglica XX.24.
rotundifolia XX.23.

Crassulaceae.

Rhodiola rosea XVI(2)1.
Sedum acre XVI(1)61, 63.
album XVI(1)56.
alpestre XVI(1)64.
anacampseros XVI(2)4.
anglicum XVI(1)57.
atratum XVI(1)76.
cepaea XVI(2)11.
dasyphyllum XVI(1)57, 60.
hirsutum XVI(1)67.
hispanicum XVI(1)58.
purpureum XVI(2)2, 3.
reflexum XVI(1)59.
rubens XVI(1)62.
stellatum XVI(1)101, 102.
villosum XVI(1)92.
Sempervivum arachnoideum XVI(1)55.
arboreum XVI(1)52.
hirtum XVI(1)54.
spec. XVI(1)53.
Umbilicus pendulinus XVI(1)93, post 93.

Saxifragaceae.

Mitella diphylla XVII.77.
Parnassia palustris XVII.91.
Philadelphus coronarius XXII.55.
Ribes alpinum XXIV.12—14.
grossularia XXIV.10, 10 b.
Ribes nigrum XXIV.16.
petraeum XXIV.15.
rubrum XVII.33, XXIV.11.
Saxifraga adscendens XVI(1)89.
aizoides XVI(1)74.
aizoon XVI(1)97.
aquatica XVI(1)87.
aspera XVI(1)79.
bryoides XVI(1)69.
Burseriana XVI(1)68.
caesia XVI(1)70.
Clusii XVI(1)99.
cotyledon XVI(1)94.
cuneifolia XVI(1)95.
exarata XVI(1)88, 90.
geranioides XVI(1)86.
granulata XVII.92.
hirculus XXIV. post 61.
hypnoides XVI(1)85.
muscoides XVI(1)83.
mutata XVI(1)98.
nervosa XVI(1)84.
oppositifolia XVI(1)80—82.
rotundifolia XIII.156.
stellaris XVI(1)99.
tridactylites XVI(1)91.
umbrosa XVI(1)96.
Tiarella cordifolia XVII.76.

Platanaceae.

Platanus orientalis XXIII.28.

Rosaceae.

Agrimonia eupatoria XVIII(1)73.
Alchemilla alpina XVIII(2)11.
arvensis VII(2)47.
pentaphyllea XVIII(1)66.
pratensis XVIII(1)65.
Amelanchier vulgaris XXIII.73.
Aruncus silvester VIII.95.
Comarum palustre XVIII(2)9.
Cotoneaster integerrima XXIII.76.
tomentosa XXIII.75.
Crataegus azarolus XXIV.3.
monogyna XXIV.7.
Cydonia vulgaris XXIII.32, 33.
Dryas octopetala XIV(1)45.
Fragaria moschata XVIII(2)12.
vesca XVIII(2) post 12.
Geum montanum XVIII(1)79.
rivale XVIII(1)78.
urbanum XVIII(1)76, 77.
Mespilus germanica XXIV.1—2.
Physocarpus capitata XXIV.6.

Potentilla alba XVIII(1)94, 95.
anserina XVIII(1)75.
argentea XVIII(2)3.
aurea XVIII(1)98.
caulescens XVIII(1)93.
Clusiana XVIII(1)96.
erecta XVIII(2)10.
grandiflora XVIII(2)1.
pilosa XVIII(2)6.
recta XVIII(2)4, 5.
reptans XVIII(1)97.
rupestris XVIII(1)74, post 74.
sterilis XVIII(2)13.
supina XVIII(2)2, 8.
thuringiaca XVIII(1)100, XVIII(2)7.
verna XVIII(1)99.
Poterium spinosum XXI.78.
Prunus armeniaca XXIII.40, post 40.
avium XXIII.60.
cerasifera XXIII. ante 42.
cerasus XXIII.56, 57.
chamaecerasus XXIII.59.
communis XXIII.39, 39 b.
domestica XXIII.41, post 41.
fruticosa XXIII.59.
laurocerasus XXIII.58.
mahaleb XXIII.62, 63.
padus XXIII.61.
persica XXIII.38.
spinosa XXIII.42.
Pyracantha coccinea XXIV.8.
Pyrus communis XXIII.37, post 37.
malus XXIII.31.
Rosa alba XXV.21.
alpina XXV.19, 30.
blanda XXV.26.
centifolia XXV.20.
cinnamomea XXV.27, 28, 32.
eglanteria XXV.29.
Hailstonei XXV.24.
lutea XXV.29.
moschata XXV.22.
pendulina XXV.19, 30.
pimpinellifolia XXV.31, 34.
pomifera XXV.33.
rubiginosa XXV.25.
rufula XXV.23.
sempervirens XXV.35.
spinosissima XXV.31.
Rubus caesius XXV.12.
chamaemorus XXV. post 15.
fruticosus XXV.11.
idaeus XXV.14.
saxatilis XXV.15.
Rubus spec. XXV.13.
Sanguisorba minor VIII.53, 54.
officinalis VIII.52.
Sorbus aria XXIII.72.
aucuparia XXII.83.
chamaemespilus XXIII.74.
domestica XXII.82.
suecica XXIV.5, ante 6.
torminalis XXIV.4.
Spiraea media XVI(2)44.
salicifolia XXIV.123, 124.
Ulmaria filipendula VIII.84.
palustris VIII.96.

Leguminosae.

Abrus precatorius XIX.65.
Acacia nilotica XXII.16.
Adenocarpus complicatus XXII.13.
Anagyris foetida XXII.14.
Anthyllis barba Jovis XIX. post 144, XXII.48.
montana XIX.147.
tetraphylla XVIII(2)83.
vulneraria XVIII(2)84—86.
Argyrolobium Linnaeanum XVIII(2)78.
Astragalus alpinus XIX.145.
baeticus XIX.101 b.
cicer XIX.103.
danicus XIX.104.
frigidus XIX.156.
glaux XIX.139.
glycyphyllos XIX.163.
hamosus XIX.117.
monspessulanus XIX.149.
onobrychis XIX. post 104, ante 105.
pentaglottis XIX.145.
purpureus XIX.148.
tragacantha XXI.76, 77.
Biserrula pelecinus XIX.118.
Bonaveria securidaca XIX.116.
Bonjeania hirsuta XVIII(2)74, 77.
recta XVIII(2)76.
Calycotome spinosa XXII.17.
Cassia lanceolata XXII.47.
sophera XIX.160.
Ceratonia siliqua XXII.62.
Cercis siliquastrum XXII.63.
Cicer arietinum XIX.102.
Colutea arborescens XXII.41.
Coronilla coronata XXII.44.
emerus XXII.43.
glauca XXII.42.
juncea XIX.127.
minima XIX.128, 129.

Coronilla scorpioides XVI(2)6.
vaginalis XXII.45.
valentina XXII.46.
varia XIX.119.
Cytisus austriacus XXII.3.
hirsutus XXII.4, post 8.
monspessulanus XXII.18.
nigricans XXII.11, 12.
sessilifolius XXII.9, 10.
supinus XXII.4, 8.
Dolichos lablab XIX.55.
Dorycnium herbaceum XVIII(2) post 41.
suffruticosum XVIII(2)41.
Ebenus cretica XXII.2.
Ervum ervilia XIX.101.
hirsutum XIX.92.
tetraspermum XIX.93, 94.
Galega officinalis XIX.157, 158.
Genista anglica XXII.28, 30.
germanica XXII.29.
hispanica XXII.31.
monosperma XXII.40.
pilosa XXII.36, 37.
radiata XXII.24.
sagittalis XXII.38.
scorpius XXII.23.
tinctoria XXII.34, 35.
Glycyrrhiza glabra XIX.162.
spec. XIX.161.
Hedysarum coronarium XIX.136.
obscurum XIX.137.
Hippocrepis ciliata XIX.124.
comosa XIX.122, 123.
glauca XIX.125, 126.
unisiliquosa XIX.120, 121.
Hymenocarpus circinatus XVIII(2)57, 87.
Laburnum vulgare XXII.15, 15 b.
Lathyrus amphicarpus XIX.98 b.
angulatus XIX.78.
annuus XIX. post 74 b.
aphaca XIX.89.
articulatus XIX.71 b, 72.
canescens XIX.79.
cicera XIX.77.
latifolius XIX.70, 73.
linifolius XIX.73.
luteus XIX.151, 152.
montanus XIX.150, 155.
niger XIX.164.
nissolia XIX. ante 75.
ochrus XIX.66.
palustris XIX.74, post 74.
pratensis XIX.75.
sativus XIX.67, 68, 71, 98 b.
Lathyrus silvestris XIX.69.
tuberosus XIX.76.
variegatus XIX.154.
vernus XIX.153.
Lens esculenta XIX.99, 100.
Medicago arabica XVIII(2)49, post 68.
arborea XXII.1.
falcata XVIII(2)55.
hispida XVIII(2)47.
lappacea XVIII(2)51.
lupulina XVIII(2)21.
maculata XVIII(2)49, post 68.
marina XVIII(2)48.
minima XVIII(2)52, 53.
orbicularis XVIII(2)43.
polycarpa XVIII(2)47.
sativa XVIII(2)54.
sativa × falcata XVIII(2)54, 56.
scutellata XVIII(2)44.
tribuloides XVIII(2)50.
tuberculata XVIII(2)45, 46.
spec. XVIII(2) post 55.
Melilotus italicus XVIII(2)67.
sulcatus XVIII(2)64.
Onobrychis arenaria XIX.141.
caput galli XIX.135.
saxatilis XIX.142.
viciifolia XIX.138, 140.
Ononis arvensis XXI.81.
minutissima XXI.84.
natrix XXI.83.
repens × spinosa XXI.82.
spinosa XXI.79, 79 b.
spec. XIX.107.
Ornithopus compressus XIX.132.
perpusillus XIX.130—131 b.
Oxytropis campestris XIX.106.
montana XIX.143, 146.
pilosa XIX.105.
pyrenaica XIX.144.
Phaseolus vulgaris XIX.53.
Pisum arvense XIX.60.
sativum XIX.57—59, 61.
umbellatum XIX.58.
Psoralea bituminosa XVIII(2)14, 15.
dentata XVIII(2)17.
Pterocarpus spec. XXII.22.
Sarothamnus scoparius XXII.32, 33.
Scorpiurus subvillosus XVI(2), 8.
Sesbania aegyptiaca XIX.159.
Spartium junceum XXII.39.
Tetragonolobus maritimus XVIII(2)79.
purpureus XVIII(2)80.
siliquosus XVIII(2)75, 79.

Trifolium agrarium XVIII(2)22.
alpestre XVIII(2)25.
alpinum XVIII(2)29.
angustifolium XVIII(2)33, 34.
arvense XVIII(2)35.
Cherleri XVIII(2)39.
fragiferum XVIII(2)40.
hybridum XVIII(2)20.
incarnatum XVIII(2)30, 31.
lappaceum XVIII(2)38.
medium XVIII(2)26.
montanum XVIII(2)27, post 27.
pratense XVIII(2)18, 19.
repens XVIII(2)20.
resupinatum XVIII(2)23, 37.
rubens XVIII(2)24, 31—32.
scabrum XVIII(2)42.
spadiceum XVIII(2)28.
stellatum XVIII(2)36.
subterraneum XVIII(2) post 36, ante 37.
Trigonella caerulea XVIII(2)68.
foenum graecum XIX.114, 115.
Ulex europaeus XXII.26.
nanus XXII.27.
parviflorus XXII.25.
Vicia cracca XIX.86.
dumetorum XIX.63.
faba XIX.50.
hybrida XIX.95.
lathyroides XIX.97.
lutea XIX.88.
narbonensis XIX.51, 52.
nigricans XIX.98.
onobrychioides XIX.85.
orobus XIX.84, 165.
pisiformis XIX.62.
pyrenaica XIX.96.
sativa XIX.80, 91.
sepium XIX.81, 82.
silvatica XIX.83.
tenuifolia XIX.87.
Vigna sinensis XIX.54, 56.

Geraniaceae.

Erodium botrys XVIII(1)57.
ciconium XVIII(1)54—56.
cicutarium XVIII(1)59, 60.
gruinum XVIII(1)63.
malacoides XVIII(1)52.
maritimum XVIII(1)53.
moschatum XVIII(1)58.
romanum XVIII(1)61.
Geranium dissectum XVIII(1)41.
divaricatum XVIII(1)51.
Geranium lucidum XVIII(1)48.
macrorrhizum XVIII(1)37.
nodosum XVIII(1)47.
palustre XVIII(1)35, 46.
phaeum XVIII(1)42.
pratense XVIII(1)39, 40.
pusillum XVIII(1)49.
pyrenaicum XVIII(1)50.
robertianum XVIII(1)62.
sanguineum XVIII(1)38.
silvaticum XVIII(1)45.
striatum XVIII(1)44.
tuberosum XVIII(1)43.

Oxalidaceae.

Oxalis acetosella XVIII(2)58, 59.
corniculata XVIII(2)60.

Tropaeolaceae.

Tropaeolum minus XVII.79.

Linaceae.

Linum alpinum XII.36.
angustifolium XII.45.
austriacum XII.44.
campanulatum XII.38.
catharticum XIV(1)74.
flavum XII.37.
gallicum XII.46.
liburnicum XII.40.
maritimum XII.39.
narbonense XII.34, 35.
salsoloides XII.41, 42.
strictum XIV(2)46.
tenuifolium XII.43.
usitatissimum XII.33.
Radiola linoides XVI(1)50.

Zygophyllaceae.

Guajacum officinale XXIII.55.
Peganum harmala XIX.38.
Tribulus terrestris XIX.134.
Zygophyllum Fabago XXV.18.

Cneoraceae.

Cneorum tricoccon XXIV.38.

Rutaceae.

Citrus aurantium XXIII.35.
medica XXIII.34.
Dictamnus albus XII.134.
Ruta chalepensis XIX.36.
graveolens XIX.34, 35.
montana XIX.37.

Meliaceae.

Melia azedarach XXII.84.

Polygalaceae.

Polygala chamaebuxus XXIV.100.
comosa XII.49—52.
serpyllacea XII.51.
vulgaris XII.48.

Euphorbiaceae.

Chrozophora tinctoria XIV(2)3.
Euphorbia amygdaloides XVI(2)27.
chamaesyce XVI(1)51, XVI(2)63.
characias XVI(2)30.
cyparissias XVI(2)50, 51.
dendroides XVI(2)32, 33.
dulcis XVI(2)58.
esula XVI(2)47, 56.
exigua XVI(2)53—55.
Gerardiana XVI(2)35—37, 41, 52.
helioscopia XVI(2)49.
hyberna XVI(2)45.
lathyris XVI(2)64.
nicaeensis XVI(2)28, 29.
officinarum XXI.75.
palustris XVI(2)57.
paralias XVI(2)39.
peplis XVI(2)62.
peplus XVI(2)60, 61.
pithyusa XVI(2)59.
platyphyllos XVI(2)46.
retusa XVI(2)54.
segetalis XVI(2)52.
serrata XVI(2)31.
spinosa XVI(2)42.
verrucosa XVI(2)38.
Phyllanthus emblica XXIII.47.
Ricinus communis XXIII.30.

Callitrichaceae.

Callitriche stagnalis VII(1)82.
vernalis VII(1)82.

Buxaceae.

Buxus sempervirens XXIV.98.

Coriariaceae.

Coriaria myrtifolia XXII.78.

Anacardiaceae.

Pistacia lentiscus XXII.56.
terebinthus XXII.58.
vera XXII.60.
Rhus coriaria XXII.76.
cotinus XXII.81.
Rhus glabra XXII.77.
Semecarpus anacardium XXV.91.

Aquifoliaceae.

Ilex aquifolium XXII.114.

Celastraceae.

Evonymus europaeus XXIII.16.
verrucosus XXIII.17.

Staphyleaceae.

Staphylea pinnata XXII.61.

Aceraceae.

Acer campestre XXIII.26.
monspessulanum XXIII.27.
platanoides XXIII.25.
pseudoplatanus XXIII.24.

Hippocastanaceae.

Aesculus hippocastanum XXII.91.

Sapindaceae.

Cardiospermum halicacabum XIX.64.

Balsaminaceae.

Impatiens balsamina XVII.81.
noli tangere XVII.82.

Rhamnaceae.

Paliurus australis XXV.5.
Rhamnus alaternus XXIII.15, XXV.1, 2.
alpina XXIII.14.
cathartica XXV.6, 7.
frangula XXIII.11, 12.
infectoria XXV.9.
pumila XXIII.13.
saxatilis XXV.8.
Zizyphus vulgaris XXIII.49, 50, XXV. post 5.

Vitaceae.

Parthenocissus quinquefolia XVII. post 34.
Vitis vinifera XVII.30—32, 34.

Tiliaceae.

Corchorus olitorius XVIII(1)34.
Tilia cordata XXIII.1.

Malvaceae.

Abutilon Avicennae XVIII(1)22.
Althaea cannabina XVIII(1)26, 27.
hirsuta XVIII(1)30.
officinalis XVIII(1)15.
rosea XVIII(1)7—13.
Gossypium spec. XXIII.22, 23.

Hibiscus abelmoschus XVIII(1)33.
moschatus XVIII(1)21.
syriacus XVIII(1)28.
trionum XVIII(1)29.
Lavatera arborea XVIII(1)5, 14.
maritima XVIII(1)19.
olbia XVIII(1)20.
thuringiaca XVIII(1)16, 18.
trimestris XVIII(1)3, 4 b, 6 b.
Malva alcea XVIII(1)23, 24.
crispa XVIII(1)6.
moschata XVIII(1)25.
neglecta XVIII(1)1.
silvestris XVIII(1)2.

Guttiferae.

Androsaemum hircinum XVI(1)28.
officinale XVI(1)27.
Hypericum Burseri XVI(1)25.
coris XVI(1)29.
hirsutum XVI(1)26.
humifusum XVI(1)22.
nummularium XVI(1)20.
quadrangulum XVI(1)18, 24.
tetrapterum XVI(1)19.
veronense XVI(1)21.

Frankeniaceae.

Frankenia hirsuta XVI(1)46, 47.
laevis XVI(1)46.

Tamaricaceae.

Myricaria germanica XXV.37.
Tamarix gallica XXV.38.

Cistaceae.

Cistus albidus XXIV.49—51.
crispus XXIV.53.
laurifolius XXIV.76.
monspeliensis XXIV.79, 80.
populifolius XXIV.77, 78.
salvifolius XXIV.54.
Fumana ericoides XXIV.59.
laevipes XXIV.75.
procumbens XXIV.66 b.
viscida XXIV.58, 66.
Helianthemum alpestre XXIV.72—74.
apenninum XXIV.57.
chamaecistus XXIV.64, 65.
glabratum XXIV.72.
guttatum XXIV.61.
italicum XXIV.69.
marifolium XXIV. post 57.
salicifolium XXIV.60.
Helianthemum tuberaria XXIV.55.
umbellatum XXIV.56.
vineale XXIV.67, 68.

Violaceae.

Viola biflora XI.7.
calcarata XI.6.
canadensis XI.8.
cornuta XI.14.
elatior XI.9.
grandiflora XI.13.
hirta XI.3.
hortensis XI.10, 11.
odorata XI.1, 4, 5.
palustris XI. post 3.
rupestris XI.3.
saxatilis XI.13.
silvestris XI.2.
tricolor XI.10—12.

Passifloraceae.

Passiflora incarnata XVII. post 97.
spec. XVII.42 b.

Datiscaceae.

Datisca cannabina IV. post 91.

Cactaceae.

Opuntia ficus indica XXIV.26, 27.

Thymelaeaceae.

Daphne cneorum XXIV.45.
gnidium XXIV.40.
laureola XXIV.35.
mezereum XXIV.36, 37.
sericea XXIV.39.
Thymelaea elliptica XXIV.42.
hirsuta XXIV.44.
passerina XIV(2)45.
tartonraira XXIV.43.

Elaeagnaceae.

Elaeagnus angustifolia XXIV.103.
Hippophaë rhamnoides XXV.4.

Lythraceae.

Lythrum hyssopifolia XII.92—94.
salicaria XIV(1)13, 17.
Peplis portula XIV(1)82.

Punicaceae.

Punica granatum XXIII.36.

Combretaceae.

Terminalia bellerica XXIII.45.
chebula XXIII.43, 44, 46.

Myrtaceae.

Caryophyllus aromaticus XXII.68.
Myrtus communis XXIV.87—90.

Oenotheraceae.

Circaea alpina IX.24 b.
lutetiana IX.24 a.
Epilobium angustifolium XIV(1)10.
collinum XIV(1)8.
Dodonaei XIV(1)11, 12.
hirsutum XIV(1)5.
palustre XIV(1)9.
roseum XIV(1)6, 7.
Oenothera spec. XIV(1)4.

Halorhagaceae.

Myriophyllum spicatum VII(1)79.
verticillatum VII(1)73.

Araliaceae.

Aralia nudicaulis VIII.8.
Hedera helix XVII.71, 72.

Umbelliferae.

Aegopodium podagraria VIII.5.
Aethusa cynapium VIII.59.
Ammi copticum VIII.43.
majus VIII.41, 42.
visnaga VII(2)41, 42.
Anethum graveolens VII(2)4.
Angelica archangelica VIII.4.
Razulii VIII.9.
silvestris VIII.7, 10.
verticillaris VIII.14, 15.
Anthriscus cerefolium VII(2)44.
silvestris VIII.57.
vulgaris VII(2)46.
Apium graveolens VII(2) post 64, 65, 69, 70.
Astrantia major X.34.
minor X.35.
Athamanta cretensis VII(2)22, 24, 25.
macedonica VII(2)71.
Matthioli VII(2)16.
Bifora testiculata VIII.39.
Bunium bulbocastanum VIII.78.
Bupleurum angulosum XVI(1)4.
aristatum XVI(1)7.
Burserianum XVI(1)6.
falcatum XVI(1)10.
fruticosum VIII.70.
longifolium XVI(1)2, 3.
odontites XVI(1)7.
ranunculoides XVI(1)6.
rigidum XVI(1)9.
Bupleurum rotundifolium XVI(1)1.
stellatum XVI(1)5.
Cachrys laevigata VIII.30.
Carum carvi VIII.35.
verticillatum VII(2)35.
Caucalis daucoides VII(2)55.
Chaerophyllum aromaticum VIII.6.
aureum VIII.56.
bulbosum VIII.64, 65.
temulum VII(2)45.
Cicuta virosa VII(2)77.
Conium maculatum VIII.58, 62.
Conopodium majus VIII.79, 80.
Coriandrum sativum VIII.38.
Crithmum maritimum XVI(2)12.
Cuminum cyminum VII(2)1.
Daucus carota VII(2)37—40.
gingidium VII(2)43.
Echinophora spinosa XVI(2)14.
Elaeoselinum asclepium VIII.31.
Eryngium Bourgati XXI.67.
campestre XXI.66.
maritimum XXI.65.
planum XXI.69.
Falcaria vulgaris XXI.70.
Ferula communis VII(2)9.
ferulago VII(2)10, 11.
spec. VII(2)12, 13.
Heracleum alpinum VIII.22.
austriacum VIII.21.
pyrenaicum VIII.23.
sibiricum VIII.20.
sphondylium VIII.19.
spec. VIII.17, 18, 22 b.
Hydrocotyle vulgaris IX.119.
Imperatoria ostruthium VIII.11.
Laserpitium gallicum VIII.12, 13.
latifolium VIII.24—26.
panax VII(2)8.
siler VIII.75, 76.
Levisticum officinale VIII.29.
Libanotis montana VII(2)32, 33.
sibirica VII(2)31.
Ligusticum ferulaceum VII(2)17.
Meum athamanticum VII(2)5.
mutellina VII(2)6.
Molopospermum cicutarium VIII.60.
Myrrhis odorata VIII.55.
Oenanthe aquatica VIII.63.
fistulosa VIII.83.
globulosa VIII.63.
Opopanax chironium VIII.16.
Orlaya grandiflora VII(2)54.
maritima VII(2)59.

Osmorrhiza Claytoni VII(2)57.
Pastinaca sativa VIII.1, 2.
Petroselinum sativum VII(2)64.
segetum VII(2)3, 74.
Peucedanum alsaticum VII(2)34.
cervaria VII(2)30.
officinale VII(2)20, 21.
oreoselinum VII(2)66.
palustre VII(2)67.
Physospermum aquilegifolium VIII.67.
Pimpinella anisum VIII.40.
magna VIII.46.
peregrina VII(2)68.
saxifraga VIII.47—50.
Pleurospermum austriacum VIII.61, 66.
Ptychotis saxifraga VIII.51.
Sanicula europaea XVIII(1)64.
Scandix australis VII(2)49, 50.
pecten Veneris VII(2)48.
Selinum carvifolia VIII.37, post 58, 74.
pyrenaeum VIII.36.
Seseli annuum VIII.33, 34.
austriacum VIII.77.
elatum VIII.45.
glaucum VII(2)26, VIII.77.
Gouani VIII.45.
montanum VII(2)60—62.
nanum VII(2)63.
tortuosum VIII.72.
Silaus flavescens VIII.73.
Siler trilobum VIII.27, 28.
Sium angustifolium VII(2)75.
latifolium VII(2)76.
sisarum VIII.3.
Smyrnium olusatrum VII(2)72.
perfoliatum VII(2)73.
Thapsia villosa VII(2)14.
Tordylium apulum VII(2)53, VIII.69.
maximum VII(2)51.
syriacum VIII.68.
Torilis anthriscus VII(2)56.
nodosa VII(2)58.
Trinia glauca VII(2)28.
Turgenia latifolia VII(2)52.

Cornaceae.

Cornus canadensis X.106.
mas XXIII.51.
sanguinea XXIII.52.
suecica XVII.49, 49 b.

Pyrolaceae.

Monotropa hypopitys III.156.
Pyrola asarifolia X.100.
Pyrola minor X.99.
rotundifolia X.99.
secunda X.102—104.
umbellata X.108.
uniflora X.101.

Ericaceae.

Andromeda polifolia XXIV.82.
Arbutus unedo XXIV.31.
Arctostaphylos uva ursi XXIV.86.
Calluna vulgaris XXV.40, 41.
Erica arborea XXV.42.
carnea XXV.44, 51, 52, 54.
cinerea XXV.50.
multiflora XXV.46, 47.
scoparia XXV.48.
tetralix XXV.43.
vagans XXV.45.
Ledum palustre XXIV.81.
Loiseleuria procumbens XXIV.70.
Oxycoccus palustris XXIV.97.
Phyllodoce caerulea XXV.53 b.
Rhododendron ferrugineum XXIV.84, 85.
hirsutum XXIV.83.
Rhodothamnus chamaecistus XXIV.71.
Vaccinium myrtillus XXIV.92.
uliginosum XXIV.93, 94.
vitis idaea XXIV.95, 96.

Empetraceae.

Empetrum nigrum XXV.53.

Primulaceae

Anagallis arvensis XIV(1)94, 95.
caerulea XIV(1)95.
tenella XVII.96.
Androsace carnea XVI(1)75.
chamaejasme XVI(1)72.
elongata XIV(1)75.
lactea XVI(1)73.
maxima XIV(1)76.
obtusifolia XIV(1)87.
septentrionalis XIV(1)75.
Aretia alpina XVI(1)77.
imbricata XVI(1)71.
Asterolinum linum stellatum XII.47.
Centunculus minimus XIV(2)47.
Coris monspeliensis XVI(1)30.
Cortusa Matthioli XIII.155.
Cyclamen europaeum XVII.89.
neapolitanum XVII.90.
Douglasia vitaliana XIII.154.
Glaux maritima XII.56—58.
Hottonia palustris VII(1)75.

Lysimachia nemorum XIV(1)96.
nummularia XVII.95.
punctata XIV(1)2.
thyrsiflora XIV(1)3.
vulgaris XIV(1)1.
Primula acaulis XIII.139, 140.
auricula XIII.149.
farinosa XIII.145—148.
hirsuta XIII.151.
minima XIII.152.
officinalis XII.137, 138, 141, 144.
pubescens XIII.150.
Samolus Valerandi XIV(1)100.
Soldanella alpina XVII.15, 16.
montana XVII.16.
Trientalis americana X.107.
europaea X.105.

Plumbaginaceae.

Armeria alpina XI.120.
maritima XI.123.
plantaginea XI.121.
vulgaris XI.122.
Plumbago europaea IV.57.
Statice bellidifolia X.114.
Girardiana X.113.
limonium X.112.
minuta X.115.
sinuata X.116.
virgata X.114.

Ebenaceae.

Diospyros lotus XXIII.54.

Styracaceae.

Styrax officinale XXIII.71.

Oleaceae.

Fraxinus ornus XXII.86.
oxycarpa XXII.85.
Jasminum fruticans XXII.52.
grandiflorum XXII.51.
humile XXII.50.
officinale XXII.49.
Ligustrum vulgare XXIV.125.
Olea europaea XXIV.101, 102.
Phillyrea angustifolia XXIV.130.
latifolia XXIV. post 125, 126.
Phillyrea media XXIV.127—129.
Syringa vulgaris XXII.54.

Loganiaceae.

Strychnos nux vomica XXV.89.

Gentianaceae.

Chlora perfoliata XVI(1)15.
Erythraea centaurium XVI(1)12, 13.
linariifolia XI.73, XVI(1)13.
spicata XVI(1)14.
Gentiana acaulis X.54.
asclepiadea X.53.
baltica X.65, 66.
bavarica X.60.
Burseri X.50.
campestris X.65, 66.
ciliata X.68.
Clusii X.56.
cruciata X.63.
excisa X.54.
germanica X.64.
lutea X.48, 49.
nivalis X.61.
pneumonanthe X.67.
punctata X.52.
purpurea X.51.
utriculosa X.62.
verna X.57—59.
vulgaris X.56.
Limnanthemum nymphoides X.130, post 131.
Menyanthes trifoliata XVIII(2)16.

Apocynaceae.

Apocynum venetum XVI(2)43.
Nerium oleander XXIV.47, 48.
Vinca major XVII.45.
media XVII.46.
minor XVII.43, 44.

Asclepiadaceae.

Cynanchum acutum XVII.2.
monspeliacum XVII.2.
nigrum XVII.54.
vincetoxicum XVII.52, 53.
Marsdenia erecta XVII.50.
Periploca graeca XVII.51.

Convolvulaceae.

Calystegia sepium XVII.3.
soldanella X.131, XVII.13, 14.
Convolvulus althaeoides XVII.9, 10.
arvensis XVII.4.
cantabrica XVII.11, 12.
cneorum XXIV.46.
scammonia XVII.1.
tricolor XVII.8.
Cressa cretica XIV(1)57.
Cuscuta epithymum XII.104, 106—112.

Cuscuta europaea XII.105.
Trifolii XII.113.
Ipomoea hederacea XVII.6.
purpurea XVII.7.
Quamoclit vulgaris XXII.53.

Polemoniaceae.

Polemonium caeruleum VIII.105.

Borraginaceae.

Alkanna tinctoria XIV(2)24.
Anchusa italica XIV(2)22.
officinalis XIV(2)23, post 23.
sempervirens XIV(2)21.
Asperugo procumbens XIV(2)28.
Borrago officinalis XIV(2)19.
Cerinthe major XIV(2)35, 36.
minor XIV(2)37, 38.
Cordia myxa XXIII.48.
Cynoglossum cherifolium XIV(2)32, 33.
germanicum XIV(2)31.
officinale XIV(2)29.
pictum XIV(2)30.
Echinospermum lappula XIV(2)34.
Echium creticum XIV(2)13.
italicum XIV(2)9, 18.
plantagineum XIV(2)12, 14.
pustulatum XIV(2)12.
vulgare XIV(2)10, 11.
Heliotropium europaeum XIV(2)1.
supinum XIV(2)2.
Lithospermum apulum XIV(2)15.
arvense XIV.43.
fruticosum XIV(2)17.
officinale XIV(2)40.
purpureo-caeruleum XIV(2)41, 42.
Lycopsis arvensis XIV(2)26.
Myosotis alpestris XIV(2)5.
collina XIV(2)4.
palustris XIV(2)7, 8.
versicolor XIV(2)6.
Nonnea pulla XIV(2)25.
Omphalodes verna XIV(2) post 50.
Onosma echioides XIV(2)16.
Pulmonaria angustifolia XIV(2)53.
mollis XIV(2)52.
tuberosa XIV(2)51.
Symphytum officinale XIV(2)48, 49.
tuberosum XIV(2)50.

Verbenaceae.

Verbena officinalis XV(2)1.
Vitex agnus castus XXIV.122.

Labiatae.

Ajuga chamaepitys XIV(1)60, 62.
genevensis XIV(2)55.
iva XIV(1)58, 59.
reptans XIV(2)54, 56.
Ballota nigra XIII.32.
pseudodictamnus XII.133.
Calamintha alpina XII.155.
grandiflora XIII.21.
nepeta XIII.17—19.
officinalis XIII.20.
Clinopodium vulgare XII.152.
Dracocephalum austriacum XIV(1)61.
moldavica XIII.24.
ruyschiana XIV(1)61 b.
Galeopsis dubia XIII.57.
ladanum XIII.65.
speciosa XIII. post 43.
tetrahit XIII.56.
Glechoma hederacea XVII.73.
Hyssopus officinalis XII.89—91.
Lamium album XIII.42.
amplexicaule XIII.46.
galeobdolon XIII.44.
maculatum XIII.41.
purpureum XIII.40.
Lavandula dentata XII. post 62.
multifida XII.65.
stoechas XII.60, 61.
vera XII.63, 64.
Leonurus cardiaca XIII.28.
marrubiastrum XIII.29.
Lycopus europaeus XIII.30.
exaltatus XIII.31.
Marrubium alysson XIII.58.
candidissimum XIII.38.
lanatum XIII.36.
peregrinum XIII.39.
vulgare XIII.35—37.
Melissa officinalis XIII.23.
Melittis melissophyllum XIII.49.
Mentha aquatica XIII.12.
arvensis XIII.22.
arvensis × viridis XIII.2, 3.
crispa XIII.4.
piperita XIII.4.
pulegium XII.130.
rotundifolia XIII.5.
rotundifolia × viridis XIII.8.
silvestris XIII.9.
viridis XIII.6.
spec. XIII.7.
Moluccella laevis XIII.26.

Moluccella spinosa XIII.27.
Nepeta cataria XIII.13—15.
nuda XIII. post 7, 10, 11.
nepetella XIII.14, 16.
pannonica XIII.10.
Ocymum basilicum XII.157, 158.
minimum XII.161.
spec. XII.156, 159—160 b.
Origanum creticum XII.138, 139, 143, 144.
majorana XII.149, 150.
maru XII.148.
onites XII.140.
vulgare XII.135—139, 143, 144.
Phlomis fruticosa XIII.131.
herba venti XIII.34.
lychnitis XIII.132.
Prasium majus XIV(1)47.
Prunella alba XIV(2)59.
grandiflora XIV(2)61.
hyssopifolia XIV(2)60.
vulgaris XIV(2)57, 58.
Rosmarinus officinalis XII.66—68.
Salvia aethiopis XIII.136.
glutinosa XIII.109.
horminum XIII.106, 106 b.
officinalis XIII.101, 102, 104.
pratensis XIII.111—113.
sclarea XIII.108.
silvestris XIII.117, 118.
spinosa XIII.107.
triloba XIII.103—105.
verticillata XIII.110, 116.
Satureja acinos XII.153.
hortensis XII.95.
juliana XII.97—99.
montana XII.96.
thymbra XII.103.
Scutellaria alpina XIV(1)35.
Columnae XIII.51.
galericulata XIV(1)18.
peregrina XIII.50, 51.
Sideritis hirsuta XIII.59.
hyssopifolia XIII.62.
romana XIII.60.
sicula XIII.97.
syriaca XIII.97.
Stachys alopecuros XIII.119, 121.
alpina XIII.96.
annua XIII.64.
arvensis XIII.63.
germanica XIII.95, 120.
glutinosa XIII.99.
officinalis XIII.83.
palustris XIII.100.
Stachys recta XIII.61.
silvatica XIII.48.
spinosa XIII.98.
Teucrium aureum XII.122.
botrys XII(1)51.
chamaedrys XIV(1)41, 42.
flavum XIV(1)32, 33.
fruticans XIV(1)34.
montanum XII.121, 123, 127.
polium XII.125, 126.
pyrenaicum XIII.45.
scordium XIV(1)37—39.
scorodonia XIV(1)40.
spinosum XIV(1)44.
Thymbra spicata XII. post 99.
Thymus capitatus XII.102.
chamaedrys XII.116.
mastichina XII.147.
serpyllum XII.114, 115, 117—120.
vulgaris XII.100, 101.

Solanaceae.

Atropa belladonna IX.5, 6.
Capsicum annuum IV.105.
Datura metel IX.21.
stramonium IX.22.
Hyoscyamus albus IX.29, 30.
niger IX.28.
Lycium europaeum XXV.3.
Mandragora autumnalis IX.27.
officinarum IX.26.
Nicotiana rustica IX.33.
tabacum IX.31, 32.
Physalis alkekengi IX.3.
Solanum aethiopicum IX.17.
cerasiforme IX.15.
dulcamara IX.13.
lycopersicum IX.15, 16.
melongena IX.18, 19.
nigrum IX.1.
pseudocapsicum IX.8.
sanctum IX.20.
tuberosum IX.14.
Withania somnifera IX.7.

Scrophulariaceae

Anarrhinum bellidifolium XII.13.
Antirrhinum asarina XVII.75.
latifolium XII.5.
majus XII.1—4.
orontium XII.6.
Bartsia alpina XIV(1)36.
latifolia XIII.69, 70.
trixago XIV(1)49.

Bartsia viscosa VIII.94.
Castilleja coccinea XIII.82.
Celsia arcturus XIII.130.
Digitalis ambigua XIII.161, 162.
ferruginea XIII.164.
lutea XIII.163.
purpurea XIII.159, 160.
Erinus alpinus XII.129.
Euphrasia brevipila XIII.66.
minima XIII.67.
tricuspidata XIII.71.
Gratiola officinalis XVI(1)16, 17.
Lathraea clandestina III.155.
squamaria III.158.
Limosella aquatica X.81.
Linaria alpina XII.30.
arvensis XII.26, 28.
chalepensis XII.23.
cymbalaria XVII.78.
dalmatica XII.10.
elatine XIV(1)103.
genistifolia XII.11, 20.
italica XII.17.
linifolia XII.11.
minor XII.7.
origanifolia XII.8, 9.
Pelisseriana XII.31.
petraea XII.32.
purpurea XII.22.
repens XII.24, 25.
spuria XIV(1)102.
supina XII.29.
triphylla XII.12.
vulgaris XII.16.
Melampyrum arvense XIII.75, 76.
barbatum XIII.79.
cristatum XIII.80.
nemorosum XIII.77.
pratense XIII.78.
Odontites lutea XIII.72.
rubra XIII.68.
Paederota bonarota XIV(1)46.
Pedicularis foliosa VIII.85.
incarnata VIII.88.
palustris VIII.91, 92.
pyrenaica VIII.86.
recutita VIII.87.
silvatica VIII.90.
verticillata VIII.89.
Rhinanthus major VIII.93.
Scrophularia aquatica XIII.89.
canina XIII.94.
nodosa XIII.88.
peregrina XIII.90.
Scrophularia sambucifolia XIII.92, 93.
vernalis XIII.91.
Tozzia alpina XIII.73, 74.
Verbascum blattaria XIII.129, 133, 134.
lychnitis XIII.124, 126.
majale XIII.123.
nigrum XIII.128.
phlomoides XIII.125.
phoeniceum XIII.135.
sinuatum XIII.127.
thapsus XIII.122.
Veronica acinifolia XIV(1)66.
alpina XIV(1)29, 30.
anagallis aquatica XIV(1)99.
apennina XIV(1)31.
aphylla XIV(1)28, 48.
arvensis XIV(1)64.
beccabunga XIV(1)97, 98.
bellidioides XIV(1)27.
chamaedrys XIV(1)54.
fruticulosa XIV(1)26.
hederifolia XIV(1)63.
longifolia XIV(1)15, 16.
officinalis XIV(1)19—21.
polita XIV(1)65.
prostrata XIV(1)43, 55, 56.
scutellata XIV(1)101.
serpyllifolia XIV(1)25.
spicata XIV(1)22—24.
teucrium XIV(1)52, 53.
triphyllos XIV(1)67.
urticifolia XIV(1)51.

Orobanchaceae.

Orobanche caryophyllacea III.154.
Phelipaea ramosa III.157.

Utriculariaceae.

Pinguicula grandiflora XIII.158.
vulgaris XIII.157.
Utricularia vulgaris VII(1)81.

Globulariaceae.

Globularia alypum XXIV.41.
cordifolia XIV(2)77, 78.
nudicaulis XIV(2)75.
vulgaris XIV(2)76.

Acanthaceae.

Acanthus mollis XXI.47.
spinosus XXI.48.

Plantaginaceae.

Littorella uniflora XI.124.
Plantago albicans X.82.

Plantago alpina X.77.
arenaria X.97, 98.
Bellardi X.84.
carinata X.85.
Cornuti X.69.
coronopus X.88—91.
crassifolia X.93.
cynops X.96.
lagopus X.76.
lanceolata X.74, 75.
major X.70, 72, 73.
maritima X.92, 94, 95.
media X.71.
subulata X.86.
spec. X.83.

Rubiaceae.

Asperula arvensis XIX.25, 26.
cynanchica XIX.7, 8.
galioides XIX.6.
odorata XIX.24.
pyrenaica XIX.9.
taurina XIX.12.
tinctoria XIX.9.
Crucianella angustifolia XIX.15.
latifolia XIX.14.
maritima XIX.10.
Galium aparine XIX.22.
boreale XIX.5.
cruciatum XIX.32.
lucidum XIX.28.
maritimum XIX.4.
mollugo XIX.3.
palustre XIX.31.
pusillum XIX.17.
rotundifolium XIX.13.
rubrum XIX.30.
saccharatum XIX.23.
setaceum XIX.19.
silvaticum XIX.27.
silvestre XIX.20.
vernum XIX.33.
verum XIX.29.
Rubia peregrina XIX.2.
tinctorum XIX.1, 2.
Sheradia arvensis XIX.16.
Vaillantia muralis XIX.18.

Caprifoliaceae.

Linnaea borealis IV.29.
Lonicera alpigena XXIII.69, 70.
caerulea XXIII.67, 68.
caprifolium XVII.48.
nigra XXIII.66.
periclymenum XVII.47.
xylosteum XXIII.64, 65.
Sambucus ebulus XXIV.21.
nigra XXIV.17, 18.
racemosa XXIV.19, 20.
Viburnum lantana XXIII.18.
opulus XXIV.22, 23.
tinus XXIV.34.

Adoxaceae.

Adoxa moschatellina IX.104.

Valerianaceae.

Centranthus angustifolius VIII.115.
calcitrapa VIII. post 106, 118.
ruber VIII.114, 115, XIII.87 c.
Fedia cornucopiae VIII.98.
Valeriana angustifolia VIII.101.
celtica VIII.120, 121.
dioica VIII.107.
elongata VIII.123.
globulariifolia VIII.113.
montana VIII.111, 112.
officinalis VIII.100, 101.
phu VIII.97.
pyrenaica VIII.104.
rotundifolia VIII.112.
sambucifolia VIII.103, 108.
saxatilis VIII.122.
tripteris VIII.109, 110.
tuberosa VIII.119.
Valerianella discoidea VIII.117.
spec. VIII.116.

Dipsacaceae.

Cephalaria alpina XV(2)12.
leucantha XV(2)11.
Dipsacus fullonum XXI.61.
laciniatus XXI.62.
pilosus XXI.64.
silvestris XXI.63.
Knautia arvensis XV(2)5, 6.
silvatica XV(2)14.
Scabiosa columbaria XV(2)10, 13, 18, 20, 21.
cretica XV(2)24.
graminifolia XV(2)15.
maritima XV(2)17, 19.
stellata XV(2)22, 23.
Succisa pratensis XV(2)2—4.

Cucurbitaceae.

Bryonia alba XVII.22, 24.
dioica XVII.23.

Citrullus colocynthis XVII.101.
vulgaris XVII.99.
Cucumis melo XVII.98.
sativus XVII.97.
Cucurbita pepo XVII.100, 103, 106.
Ecballium elaterium XVII.107.
Lagenaria vulgaris XVII.102, 104, 105.
Momordica balsamina XVII.80.

Campanulaceae.

Campanula Allionii IV.36.
barbata IV.39.
bononiensis IV.41.
cervicaria IV.35.
erinus IV.5.
glomerata IV.40.
Jacobaea IV.34 b.
latifolia IV.29 b.
medium IV.30.
patula IV.26.
persicifolia IV.14—18.
pulla IV.21, 22.
pusilla IV.23, 27, 40.
pyramidalis IV.19.
rapunculoides IV.34.
rapunculus IV.4.
rhomboidalis IV.31.
rotundifolia IV.24, 25.
speculum XII.54.
spicata IV.37.
trachelium IV.32, 33.
Jasione montana IV.9.
Phyteuma betonicifolium IV.7, 8.
comosum IV.20.
hemisphaericum IV.13.
orbiculare IV.10, 12.
spicatum IV.6.
Wahlenbergia hederacea IV.28.

Compositae.

Achillea ageratum XII.128.
atrata VII(1)16.
cretica VII(1)71.
macrophylla VII(1)6.
millefolium VII(1)67—70.
moschata VII(1)17.
nana VII(1) post 6.
nobilis VII(1)3.
odorata VII(1)4, 5.
ptarmica IV.60.
tomentosa VII(1)72.
Adenostyles alpina X.156—158.
spec. X.155.
Aetheorrhiza bulbosa VI.52.
Ambrosia maritima VII(1)48.
Anacyclus pyrethrum VII(2)7.
radiatus VII(1)25, 26, ante 29.
Anaphalis margaritacea XV(1)7.
Andryala integrifolia VI.56 b.
Antennaria dioica XV(1)15—17.
Anthemis arvensis VII(1)31.
cotula VII(1)30.
maritima VII(1)18.
montana VII(1)66.
nobilis VII(1)28, 29, post 29.
tinctoria VII(1)24.
spec. VII(1) post 28.
Aposeris foetida VI.39.
Arnica montana X.20.
Arnoseris minima VI.55.
Aronicum Clusii X.22.
glaciale X.26.
scorpioides X.23, 25.
Artemisia abrotanum VII(1)34.
absinthium VII(1)52.
caerulescens VII(1)57.
campestris VII(1)36—38.
cina XXV.39.
Clavennae VII(1)65.
dracunculus IV.59.
gallica VII(1)59, 61.
glacialis VII(1)64.
maritima VII(1)58—59.
mutellina VII(1)63.
pontica VII(1)53, 54.
procera VII(1)35.
scoparia VII(1)39, 40.
valesiaca VII(1)62.
vulgaris VII(1)46, 47.
Aster acris XV(1)62.
alpinus XV(1)61.
amellus XV(1)59, 60.
ericoides XV(1)70 b.
linosyris XII.18, 19.
sedifolius XV(1)62.
tripolium XV(1)63, 64.
Asteriscus aquaticus XV(1)44.
maritimus XV(1)58.
spinosus XV(1)43.
Balsamita vulgaris XIII.1.
Bellidiastrum Michelii XIV(2)68.
Bellis perennis XIV(2)69, 71—74.
Bidens cernua XVIII(1)71.
tripartita XVIII(1)70, 72.
Buphthalmum grandiflorum XV(1)52.
salicifolium XV(1)55, 57.
Calendula arvensis XV(2)81.
officinalis XV(2)76—80.

Carduncellus mitissimus XXI.68.
Carduus acanthoides XXI.57—59.
carlinoides XXI.43.
crispus XXI.46, 57.
defloratus XXI.7, 18.
nutans XXI.45, 54—56.
personata XXI.13.
Carlina acanthifolia XXI.28.
acaulis XXI.29, 30.
corymbosa XXI.25.
lanata XXI.24.
vulgaris XXI.22.
Carthamus lanatus XXI.23.
tinctorius XXI.20.
Catananche caerulea VI.110.
Centaurea amara XV(2)26.
aspera XV(2)38, 40.
axillaris XV(2)29.
behen XIII.87 b.
calcitrapa XXI.71, 72.
cineraria XV(2)43.
collina XV(2)35—37.
cyanus XV(2)57—62.
decipiens XV(2)27.
jacea XV(2)25, 53.
maculosa XV(2)51.
melitensis XXI.74.
montana XV(2)56.
nigra XV(2)33.
paniculata XV(2) post 40, 51, 52.
pectinata XV(2)41, 42.
pseudophrygia XV(2)30—32.
pullata XV(2)34.
scabiosa XV(2)7—9.
solstitialis XXI.73.
spinosa XV(2)54.
Chrysanthemum alpinum VII(1)33.
atratum XIV(2)65.
coronarium VII(1)19, 20.
corymbosum VII(1)7.
flosculosum XIV(2)81.
leucanthemum XIV(2)62, 63.
maximum XIV(2)64.
myconis XIV(2)80.
parthenium VII(1)14, 15.
segetum XIV(2)79.
Cichorium endivia VI.26—29.
intybus VI.31, 32.
spinosum VI.33.
Cirsium acaule XXI.31.
arvense XXI.9, 10.
canum XXI.16, 17.
Casabonae XXI.27.
chamaepeuce XV(2)28.
Cirsium eriophorum XXI.38, 40.
erisithales XXI.3.
ferox XXI.39.
heterophyllum XXI.11, 12.
lanceolatum XXI.60.
monspessulanum XXI.19.
oleraceum XXI.1.
palustre XXI.8.
rivulare XXI.2, 15.
spinosissimum XXI.32.
tuberosum XXI.4—6.
Cnicus benedictus XXI.21.
Crepis aurea VI.43.
biennis VI.42.
blattarioides VI.74, 76.
bulbosa VI.100.
chondrilloides VI.87.
Jacquinii VI.87.
neglecta VI.45.
paludosa VI.82, 83.
praemorsa VI.94.
prisca VI.74.
pulchra VI.49.
rapaefolia VI.70.
rubra VI.54, 109.
Suffreniana VI.67.
taraxacifolia VI.60, 61.
tectorum VI.59.
vesicaria VI.70.
virens VI.62.
Crupina vulgaris VI.107, 108.
Cynara scolymus XXI.49, 50.
Diotis maritima XV(1)6.
Doronicum austriacum X.27.
pardalianches X.27.
plantagineum X.19.
spec. X.28.
Echinops ritro XXI.36, 37.
sphaerocephalus XXI.35.
strigosus XXI.41.
Erigeron acris XV(1)32.
alpinus XV(1)33.
uniflorus XV(1)34.
Eupatorium cannabinum XVIII(1)69.
Evax pygmaea XV(1)12.
Filago germanica XV(1)8.
minima XV(1)11.
spathulata XV(1)10.
Galactites tomentosa XXI.42.
Gnaphalium luteo-album XV(1)13.
silvaticum XV(1)14.
supinum XV(1)9.
uliginosum XV(1)9.
Hedypnois cretica VI.35.

Helianthus annuus XV(2)85, 87.
tuberosus XV(2)88.
spec. XV(2)86, 87 b.
Helichrysum angustifolium XV(1)20.
arenarium XV(1)24.
orientale XV(1)23, post 23.
serotinum XV(1)21.
stoechas XV(1)22.
Helminthia echioides VI.68, 69.
Hieracium albidum VI.77.
amplexicaule VI.73.
aurantiacum VI.78, 79.
auricula XV(1)2.
boreale VI.95.
bupleuroides VI.84.
caesium VI.91.
collinum XV(1)4.
glabratum VI.84.
glomeratum VI.92.
intybaceum VI.77.
macrocephalum VI.75.
murorum VI.91.
neocerinthe VI.75.
nigrescens VI. post 74.
pilosella XV(1)1.
porrifolium VI.88.
praealtum VI.93.
pratense XV(1)3.
saxifragum VI.80.
silvaticum VI.90.
staticifolium VI.85, 86.
stoloniflorum XV(1)5.
umbellatum VI.96, 97.
villosum XV(1)35.
Homogyne alpina X.146, 148.
Hyoseris radiata VI.41.
Hypochoeris glabra VI.52, 53.
maculata VI.72.
radicata VI.50, 51.
uniflora VI.71.
Inula britannica XV(1)36, 41, 47, 54.
conyza XV(1)30.
crithmoides XVI(2)13.
ensifolia XV(1)53.
germanica XV(1)42.
graveolens XV(1)29.
helenium XV(2)84.
hirta XV(1)48, 49.
montana XV(1)56.
oculus Christi XV(1)31.
salicina XV(1)50, 51.
viscosa XV(1)28.
Jasonia tuberosa VI.101.
Jurinea humilis XV(2)16.
Lactuca muralis VI.19.
perennis VI.104—106.
ramosissima VI.99.
saligna VI.11.
sativa VI.1—8.
scariola VI.9.
viminea VI.98, 99.
virosa VI.10.
Lampsana communis VI.25.
Lappa minor X.159.
tomentosa X.160.
Leontodon autumnalis VI.63.
crispus VI.47, 58.
hispidus VI.44.
incanus VI.81.
Leontopodium alpinum XV(1)18.
Leuzea conifera XV(2)44.
Matricaria chamomilla VII(1)27.
Microlonchus salmanticus XV(2)48, 49.
Mulgedium alpinum VI.23.
Notobasis syriaca XXI.34.
Onopordon acanthium XXI.44.
illyricum XXI.51.
Petasites albus X.153.
niveus X.154.
officinalis X.150—152.
Phagnalon saxatile XV(1)27.
sordidum XV(1)25.
Picnomon acarna XXI.26.
Picris hieracioides VI.34.
Plagius ageratifolius XIV(2)81.
Podospermum Jacquinianum XV(2)66.
laciniatum XV(2)64, 67.
Prenanthes purpurea VI.12.
Pulicaria dysenterica XV(1)37.
odora XV(1)45, 46.
vulgaris XV(1)38.
Reichardia picroides VI.48.
Rhagadiolus stellatus VI.65.
Santolina chamaecyparissus VII(1)41—45.
Saussurea discolor XXI.14.
Scolymus hispanicus XXI.52.
maculatus XXI.53.
Scorzonera austriaca XV(2)72.
hirsuta XV(2)74.
hispanica XV(2)70.
humilis XV(2)71, 73.
purpurea XV(2)75.
Senecio abrotanifolius VII(1)22.
adonidifolius VII(1)23.
alpestris VI.119, 120.
cineraria VI.116, 117.
cordatus VI.118, 121.
doria XV(1)65.

Senecio doronicum X.29.
erucifolius VI.114, 115.
Fuchsii XV(1)68.
gallicus VI.113.
Gerardi VI.123.
incanus VII(1)21.
jacobaea VI.114.
paludosus XV(1)40.
palustris XV(1)39.
provincialis VI.123.
Tournefortii XIV(2)67.
viscosus VI.112.
vulgaris VI.111.
Serratula tinctoria XIII.84—87.
Silybum marianum XXI.33.
Solidago caesia XV(1) post 66.
virgaurea XV(1)66, 70.
Sonchus angustifolius VI.21.
arvensis VI.21.
asper VI.13—post 14, 20.
oleraceus VI.16.
Sonchus tenerrimus VI.17, 18.
Staehelina dubia XV(1)26.
Tagetes erectus VII(1)9.
patulus VII(1)10—13.
Tanacetum annuum XV(1)19, post 19.
vulgare VII(1)1, 2.
Taraxacum leptocephalum VI.40 b.
obliquum VI.40.
obovatum VI.38.
officinale VI.37.
Tolpis barbata VI.66.
Tragopogon porrifolius XV(2)69.
pratensis XV(2)63.
Tussilago farfara X.147.
Urospermum Dalechampii VI.46.
picroides VI.15, 24.
Xanthium strumarium X.161.
Xeranthemum cylindraceum XV(2)46, 47.
inapertum XV(2)46.
Zacintha verrucosa VI.102.

CORRIGENDA.

Seite	11	Reihe	22	von	unten	steht	*Anthocanthum*	lies	*Anthoxanthum*
»	13	»	21	»	oben	»	*alb*	»	*alba*
»	52	»	11	»	unten	»	*Pyrenaica*	»	*pyrenaica*
»	70	»	22	»	oben	»	*urbrum*	»	*rubrum*
»	71	»	11	»	»	»	*valesia*	»	*vallesia*
»	92	»	5	»	unten	»	*Echidium*	»	*Echium*
»	97	»	17	»	»	»	*acre*	»	*acris*
»	98	»	26	»	oben	»	*Puphthalmum*	»	*Buphthalmum*
»	99	»	20	»	»	»	XV(1)70	»	XV(1)70 bis
»	109	»	11	»	»	»	*nicaeebsis*	»	*nicaeensis*
»	116	»	5	»	unten	»	*moscheutos*	»	*Moscheutos*
»	123	»	12	»	»	»	*italica*	»	*italicus*
»	126	»	6	»	oben	»	*cruciata*	»	*cruciatum*
»	135	»	18	»	»	»	*quadratus*	»	*quadratum*
»	143	»	21	»	unten	»	*nana*	»	*nanus*
»	157	»	5 u. 8	»	»	»	*catharticus*	»	*cathartica*
»	176	»	2	»	oben	»	*moschatus*	»	*Moscheutos*

Vol.	I	Seite	9
»	II	»	15
»	III	»	16
»	IV	»	24
»	V	»	30
»	VI	»	32
»	VII	»	38
»	VIII	»	47
»	IX	»	53
»	X	»	60
»	XI	»	67
»	XII	»	74
»	XIII	»	80
»	XIV	»	87
»	XV	»	96
»	XVI	»	103
»	XVII	»	110
»	XVIII	»	115
»	XIX	»	124
»	XX	»	132
»	XXI	»	138
»	XXII	»	142
»	XXIII	»	147
»	XXIV	»	151
»	XXV	»	157
Index		»	162



Taf. I. J. Burser's »Hortus Siccus» im Botanischen Museum, Uppsala. Die 23 erhaltenen Bände.

Ca. 1/8 nat. Gr.


HORTI SICCI
SIVE
STIRPIVM,
studio et labore D. IOACHIMI BVRSERI
Camertio-Lusati, in Regiâ Nobilium Academiâ Serenâ Medici, et Physices Professoris publici,
per diversas regiones et loca collectarum
et iuxta seriem Pinacis Bauhiniani (sic 1623. Basilea dati) digestarum,
VOLVMEN I.
continens
SECTIONEM PRIMAM LIBRI primi illius Pinacis.

Taf. II. Titelblatt zu Vol. I mit Burser's eigenhändiger Anschrift. Vgl. S. 9!

Ca. 1/2 nat. Gr.

Taf. III. *Linaria origanifolia* (L.) DC. Vol. XII, 9. Originalexemplar zu LINNÉS *Antirrhinum origanifolium*. Vgl. S. 74!

Ca. 1/2 nat. Gr.

Taf. IV. *Viola canadensis* L. Vol. XI, 8. LINNÉS Originalexemplar aus Nordamerika. Vgl. S. 4 u. 68!

Ca. 1/2 nat. Gr.

BINDING LIST MAY 15 1941



Bot
J
Juel, Hans Oscar
Joachim Burser's Hortus Siccus

BioMed.

391910